



- Legende**
- FFH-Gebiet "Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorflämig"

 - Bodenformen**
 - Erdniedermoor aus Niedermoorort (über fluvilimnogenen Sand)
 - Moorgley aus fluvilimnogenen Sand
 - Anmoorgley aus fluvilimnogenen Sand
 - Humusgley aus fluvialtem Lehmsand aus fluvilimnogenem Lehm über fluvilimnogenen Sand aus fluvilimnogenem Sand aus holozän umgelagertem Sand über fluvilimnogenen Sand
 - Gley aus fluvilimnogenen Sand aus holozän umgelagertem Lehmsand über fluvilimnogenen Sand über Niedermoor aus fluvilimnogenem Lehm über Niedermoorort
 - Gley-Braunerde aus kiesführendem, periglazialtem Lehmsand (Geschiebedecksand) über glazifluviatilen Sand (Schmelzwassersand) aus kiesführendem, periglazialtem Sand (Geschiebedecksand) über fluvilimnogenen Sand aus periglazialtem Sand (Geschiebedecksand) über fluvilimnogenen Sand
 - Gley-Podsol aus periglazialtem Sand (Geschiebedecksand) über glazifluviatilen Sand (Schmelzwassersand)
 - Braunerde aus kiesführendem, periglazialtem Lehmsand (Geschiebedecksand) über glazifluviatilen Sand (Schmelzwassersand) über kiesführenden, glazigenen Lehm (Geschieblehm) aus kiesführendem, periglazialtem Sand (Geschiebedecksand) über fluvilimnogenen Sand/über glazifluviatilen Sand (Schmelzwassersand)

Managementplan für das FFH-Gebiet "Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorflämig"
 FFH_0055 (DE 3738 301)

Textkarte 1: Böden
 Maßstab 1 : 50.000 Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 50.000; Erlaubnis-Nr.: LVerGeo/P/086/1995