




10 Anhang

10.1 Karten

Verbreitungskarten – Punkt- und Rasterverbreitung der Rotbauchunke in Sachsen-Anhalt 1990-2002

- | | | | |
|----------|--|------------|--|
| Karte 1: | Verbreitung der Rotbauchunke in den Westlichen und Östlichen Altmarkplatten | Karte 8: | Verbreitung der Rotbauchunke im Dessauer Elbetal |
| Karte 2: | Verbreitung der Rotbauchunke im Roßlau-Wittenberger Vorfläming und Hochfläming | Karte 8.1: | Verbreitung der Rotbauchunke im Dessauer Elbetal (Punktverbreitung) |
| Karte 3: | Verbreitung der Rotbauchunke im Burger Vorfläming und Zerbster Ackerland | Karte 8.2: | Verbreitung der Rotbauchunke im Dessauer Elbetal (Rasterverbreitung) |
| Karte 4: | Verbreitung der Rotbauchunke in der Dübener Heide | Karte 9: | Verbreitung der Rotbauchunke in der Ohreniederung |
| Karte 5: | Verbreitung der Rotbauchunke im Schwarze-Elster-Tal | Karte 10: | Verbreitung der Rotbauchunke im Unteren Saaletal und in der Magdeburger Börde |
| Karte 6: | Verbreitung der Rotbauchunke im Werbener Elbetal und Rhin-Havel-Luch | Karte 11: | Verbreitung der Rotbauchunke im Halle-Naumburger Saaletal und Weiße-Elster-Tal |
| Karte 7: | Verbreitung der Rotbauchunke im Tangermünder Elbetal | Karte 12: | Verbreitung der Rotbauchunke im Muldetal |
| | | Karte 13: | Verbreitung der Rotbauchunke im Köthener Ackerland und in der Mösiskauer Heide |
| | | Karte 14: | Verbreitung der Rotbauchunke im Halleschen Ackerland |



Karte 1:
Verbreitung der Rotbauchunke
in den Westlichen und Östlichen Altmarkplatten

(Punktverbreitung)

● Nachweis 1990-95



Maßstab: 1: 500.000

○ Nachweis ab 1996


10 0 10 Kilometers




Bearbeitet/GIS-Umsetzung: T. Sy









Karte 4: Verbreitung der Rotbauchhuhn in der Dübener Heide

- 1 km² - Raster**
- Punktverbreitung**
- Nachweis 1990-95
 - Nachweis ab 1996
- 1 km² - Raster**
- Nachweis vor 1990
 - Nachweis 1990-95
 - Nachweis ab 1996

Maßstab: 1: 300.000

5 0 5 Kilometers

Bearbeitet/GIS-Umsetzung: T.Sy





Karte 5:

Verbreitung der Rotbauchhünke im Schwarze-Elster-Tal


(Punktverbreitung) ● Nachweis 1990-95
● Nachweis ab 1996

5 0 5 Kilometers

Bearbeitet/GIS-Umsetzung: T. Sy

Maßstab: 1: 300.000





Karte 6: Verbreitung der Rotbauchunke im Werbener Elbetal (2.1.1.) und Rhin-Havel-Luch (2.9.)

Punktverbreitung

- Nachweis 1990-95
- Nachweis ab 1996

Maßstab: 1: 300.000


5 0 5 Kilometers


1 km² - Raster


- Nachweis vor 1990
- Nachweis 1990-95
- Nachweis ab 1996

Bearbeitet/GIS-Umsetzung: T.Sy









Karte 8.1:
Verbreitung der Rotbauchunke
im Dessauer Ebetal
(Punktverbreitung)

● Nachweis 1990-95


○ Nachweis ab 1996

Maßstab: 1:300.000

5000 0 5000 Meters

Rechenweg: 1:300.000


Rechenweg: 1:300.000





Karte 8.2:
Verbreitung der Rotbauchunke
im Dessauer Elbetal
 (1 km² - Raster)

- Nachweis vor 1980
- Nachweis 1980-95
- Nachweis ab 1996

Maßstab: 1:300.000
 5000 0 5000 Meters
 Nordrichtung





Karte 9: Verbreitung der Rotbauchunke in der Ohreniederung

Punktverbreitung

- Nachweis 1990-95
- Nachweis ab 1996

Maßstab: 1: 300.000

1 km² - Raster

- Nachweis vor 1990
- Nachweis 1990-95
- Nachweis ab 1996

5 0 5 Kilometers



Bearbeitet/GIS-Umsetzung: T. Sy

10.2 Gelände-Erfassungsbogen (Muster)

Nr. in WINART oder Karte:	Datum:
Ort:	MTB-Nr./Quadrant:
Bezeichnung des Gewässers:	Bearbeiter:
Art des Nachweises und Zahl der beobachteten/rufenden Tiere	
	gezählt geschätzt
Rufende Tiere	
Sichtbeobachtung	
gesamt	
Männchen	
Weibchen	
Jungtiere	
Neumetamorphosierte	
Laich	
Larven	

Habitattypisierung siehe Rückseite

Gefährdungen/Beeinträchtigungen/Rückgangs- u. Aussterbeursachen

Gewässer nicht mehr existent	
Gewässervernichtung	
Verfüllung, Müll, Deponie o.ä.	
Melioration/Dränage, Austrocknen, Trockenlegung	
Eutrophierung, Düngemiteleintrag, Schadstoffeintrag o.ä.	
Sukzessive Verlandung, Zuwachsen	
Beschattung	
Fischbesatz, Fischintensivzucht, Angelbetrieb	
Entenzucht	
Uferbefestigung, Versiegelung	
Beseitigung uferbegleitender Vegetation/Röhrichte	
Nutzungsauflassung, Ausbleiben extensiver Beweidung	
Intensivlandwirtschaft, Intensivbeweidung	
Bebauung des Umlandes (Siedlung, Straßen, ...)	
Straßenverkehr	
vermeintliche Isolation	
Wegfang	
.....	
.....	

Nutzungsverhältnisse im Umland des Gewässers:

(z.B. Kiefernforst, Laubmischwald, Acker [Frucht?], Brache [Typ?], Grünland [Weide, Mahd, ...], Siedlung, Kleingärten etc.)

Sind im Umkreis von 1000 m weitere Rotbauchunken-Vorkommen bekannt?

ja

nein

10.3 Flächensteckbriefe

Erläuterungen zu den Flächensteckbriefen

Der Kopf der Steckbriefe beinhaltet Bezeichnung, Nummer, Lage, einen Kartenausschnitt sowie (so weit vorhanden) ein Foto des Fundortes. Da zahlreiche Fundorte aus Zeitgründen nur während der Dämmerung aufgesucht werden konnten, liegt nicht für jedes Vorkommen ein Foto vor.

¹Feldsoll westlich „Friedemanns Teich“		²WB – 362
³Lage	MTBQ 4042-24 GK-R 4555093 GK-H 5758113	<i>Kartenausschnitt</i>
<i>Abbildung</i>		

¹ Bezeichnung des Fundortes

² Kürzel Landkreis und laufende Nummer (hier wird die laufende Nummer der Fundortdatei angegeben, nicht des Steckbriefes, weshalb keine regelmäßige Durchnummerierung der Steckbriefe zu erwarten ist. AZE = Landkreis Anhalt-Zerbst; BTF = Landkreis Bitterfeld; DE = Stadt Dessau; JL = Landkreis Jerichower Land; MD = Stadt Magdeburg; MQ = Landkreis Merseburg-Querfurt; OK = Landkreis Ohrekreis; SDL = Landkreis Stendal; WB = Landkreis Wittenberg)

³ MTBQ = Messtischblattquadrant, es wird hier der Viertelquadrant angegeben.

GK-R = Rechtswert der Gauß-Krüger-Koordinaten

GK-H = Hochwert der Gauß-Krüger-Koordinaten

Im Falle von Vorkommen mit mehreren Fundpunkten werden i.d.R. die Werte eines zentral gelegenen Fundpunktes angegeben.

zu 4. Lebensraum:

Strukturtypen: siehe Kap. 5.1.2; S. 69 ff.

Biotoptypen:

A	Biotope außerhalb von Flussauen
AN	Gewässer natürlichen Ursprungs
AN1	Dystrophe stehende Gewässer, Moorgew.
AN2	Seen
AN3	Weiher
AN4	Temporäre Klein- und Kleinstgewässer (Tümpel etc.)
AA	Gewässer anthropogenen Ursprungs
AA1	Teiche
AA2	Grubengewässer/Bergbaufolgegewässer
AA21	Tagebaurestloch
AA22	Kiesgrube
AA23	Sandgrube
AA24	Tongrube
AA3	Sonstige temporäre Klein- und Kleinstgew.
AA4	Gräben, Kanäle
AA41	überwiegend Standgewässercharakter
AA42	überwiegend Fließgewässercharakter
AA5	sonstige stehende Gew. techn. Art

F	Biotope in der Elbaue und sonstigen Flussauen
FN	Gewässer natürlichen Ursprungs
FN1	Altwässer/Altarme
FN2	Seen
FN3	Weiher
FN31	Wiesenweiher
FN32	Auwald-/Bruchwaldweiher
FN33	permanente Quallengewässer
FN4	Temporärgewässer (Tümpel, Überschwemmungsflächen, Druckwasserstellen etc.)
FN5	Flutrinnen
FA	Gewässer anthropogenen Ursprungs
FA1	Grubengewässer
FA2	Teiche
FA3	sonstige stehende Gew. techn. Art
FA4	Gräben
FA41	überwiegend Standgewässercharakter
FA42	überwiegend Fließgewässercharakter

Bezeichnung:

Feldsoll westlich „Friedemanns Teich“


WB – 362

Lage

MTBQ 4042-24

GK-R 4555003

GK-H 5758113



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	1,3 km NE Rahnsdorf	Aktuell	Nicht bestätigt
NH/E/Naturraum:	D11 / Hochflämling	x	2002
Landkreis:	Wittenberg		

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rüfer	Reproduktions-Nachweis
I	2-3	-
- in enger Beziehung zu FND „Friedemanns Teich“		

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	C
Biototyp:	AN4
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
x	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	-
Nutzungen Umland:	Ackerbau, schmaler Grünlandstreifen

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession		Deichtbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	x	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§ 30-Biotop
		x			x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
x				x

- Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahnsdorf-Klebitzer Feldsölle“ (Prüfen);
- Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	x	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	xx	Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung		Weitere Kartierungen
punktuell Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Erhöhter Monitoring-Bedarf
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.
- Grünlandstreifen, der den Feldsoll mit „Friedemanns Teich“ verbindet, ist unbedingt zu erhalten und extensiv durch ein- bis zweischürige Mahd zu nutzen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Hinsichtlich Naturraum und Biototyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasserhaushalt (unregelmäßig wasserführend).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

2. Feldsoll westlich „Friedemanns Teich“ WB – 364

Lage
MTBQ 4042-24
GK4R 4555093
GK-H 5738113



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	1,3 km nordöstl. Rahnisdorf	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D11 / Hochfläming	x	2002
Landkreis:	Wittenberg		

3. Aktueller Bestand		Bemerkungen	
Häufigkeitsklasse	Reproduktions-Nachweis	- in enger Beziehung zu FND „Friedemanns Teich“	
1	2-3		

4. Lebensraum		C	
Strukturtyp:			
Biotoptyp:	AN4		

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	Ackerbau, schmaler Grünlandstreifen
Nutzungen Umland:	

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession		Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	x	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung; Laubeintrag		Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop
					x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
x				x

- Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahnisdorf-Kiebitzer Feldsölle“ (Prüfen);
- Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung	xx
punktuell Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf
	xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich;
- Grünlandstreifen, der den Feldsoll mit „Friedemanns Teich“ verbindet, ist unbedingt zu erhalten und extensiv durch ein- bis zweischürige Mahd zu nutzen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt;
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasseraushalt (unregelmäßig wasserführend).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
FND „Friedemanns Teich“

WB – 363

Lage

MTBQ 4042-24
GK-R 4555224
GK-H 5758103

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Überweitung

xx
x

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☒ GLB ☐ FFH ☐ § 30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

- Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahnsdorf-Klebitzer Feldsölle“ (Prüfen);
- Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzteilung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneisen

Entkrautung/Entschlammung

punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

x

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.
- Grünlandstreifen, der das Gewässer mit benachbarten (westlichen) Söllen verbindet, ist unbedingt zu erhalten und extensiv durch ein- bis zweischürige Mahd zu nutzen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasserhaushalt (unregelmäßig wasserführend).


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
FND „Friedemanns Teich“

WB – 363

Lage

MTBQ 4042-24
GK-R 4555224
GK-H 5758103



1. Allgemeine Angaben

2. Vorkommen

Lage:

NHE/Naturraum:

Landkreis:

1,3 km NE Rahnsdorf

D11 / Hochfläming

Wittenberg

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenils

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufe

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

I

5

Juv

4. Lebensraum

Strukturtyp:

C

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

AN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:


Ackerbau, schmaler Grünlandstreifen

Nutzungen Umland:

Bezeichnung:

Klebitz – Gewässer am Silo

WB – 228



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	1,5 km W Klebitz	Aktuell	Letztes
NHE/Naturraum:	D11 / Hochfläming	Nicht bestätigt	Nachweisjahr
Landkreis:	Wittenberg	x	2002

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies	
Häufigkeits- klasse	Reproduktions- Nachweis
I	2

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	C
Biotoptyp:	AN4
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
Beschnittung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Ackerbau

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx
Verlandung, Sukzession	
Vermüllung, Verfüllen	
Gestörter Wasseraustausch, Trockenfallen	x
Beschattung, Laubeintrag	
Überweidung	
Weitere Anmerkungen:	

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG
FND	FND
GLB	GLB
FFH	§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
FND	FND
GLB	GLB
FFH	FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzzustellung	xx
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	xx
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	xx
Entkrautung/Entschlammung	
Punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:	
Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.	

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasseraustausch (unregelmäßig wasserführend).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Wiesenweiher westlich Klebitz

WB – 229

Lage

4042-42
4557008
5757251

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

x

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

x

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

x

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubentrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§ 30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

(x)

LSG

FND

GLB

FFH

x

Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahnsdorf-Klebitzer Feldsölle“ (Prüfen);

Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzteilung

xx

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

xx

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschönstreifen

xx

Sicherung von Wanderwegen

Entkrautung/Entschlammung

Weitere Kartierungen

punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

x

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Hinsichtlich Naturraum und Biototyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.

Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasserhaushalt (unregelmäßig wasserführend).


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Wiesenweiher westlich Klebitz

WB – 229

Lage

4042-42
4557008
5757251



1. Allgemeine Angaben

Lage: 0,5 km W Klebitz

NHE/Naturraum: D11 / Roßlau-Wittenberger Vorflämng

Landkreis: Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Larve; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

1

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

C

Biotoptyp:

AN3

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:


Mahdgrünland

Bezeichnung:
Weier am Stall Klebitz

WB – 227

Lage

MTBO
4043-13
GK-R
4558258
GK-H
5757571



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	östl. Ortsrand Klebitz D11 / Roßlau-Wittenberger Vorfläming		Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:			x	
Landkreis:	Wittenberg			2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- nachweis	Bemerkungen
II	10	-	-

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biotoptyp:	AN3
Gewässerfläche:	< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² x
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 % x
Beschattung:	0 % ≤ 50 % > 50 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Ackerbau, Brache, Ställeanlagen

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

- Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Überweidung
- xx
Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanieierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

- Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahmsdorf-Klebitzer Feldsölle“ (Prüfen);
- Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	xx	Uferbepflanzung	x
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonschuttreifen	xx	Sicherung von Wanderwegen	
Entkrautungs/Entschlammung		Weitere Kartierungen	
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Erhöhter Monitoring-Bedarf	xx
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz			

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich;
- punktueller Bepflanzung der Ufer, Anlage eines Gehölzriegels/Heckenstreifens in Richtung der Ställeanlage;
- Unbedingt Einleitungen in das Gewässer abstellen!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt;
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und Ställeanlagen;


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Feldsoll südlich Klebitz

WB – 230

Lage

4043-31
4558137
5756572



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	0,9 km S Klebitz D11 / Roßlau-Wittenberger Vorfläming	Aktuell	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:		x	2001
Landkreis:	Wittenberg		

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenes	
Häufigkeits- klasse	Bemerkungen
Anzahl Rüfer	Reproduktions- Nachweis
1	3

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biotoptyp:	AN3
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
x	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Vegetation (DG):	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
Beschattung:	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Ackerbau, keine Gewässerrandstreifen

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx
Verlandung, Sukzession	x
Vermüllung, Verfüllen	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	x
Beschattung, Laubeintrag	
Überweidung	
Weitere Anmerkungen:	
Fischbesatz/Angeln	
Deichbau/Deichsanierung	
Uferverbau	
Zerschneidung von Wanderwegen	
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	
mechan. Zerstörung der Ufervegetation	

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG
FND	GLB
FFH	§-30-Biotop
	x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
FND	GLB
FFH	FFH
	x
Ausweisung eines (ggf. disjunkten) NSG „Rahnsdorf-Klebitzer Feldsoll“ (Prüfen):	
Nachmeldung eines (ggf. disjunkten) FFH-Gebietes.	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschützstellung	xx
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferbepflanzung
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen	Uferrenaturierung (Profil)
Entkrautung/Entschlammung	xx
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Sicherung von Wanderwegen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Weitere Kartierungen
	Erhöhter Monitoring-Bedarf
	xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:	
Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.	

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.	
Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasserhaushalt (unregelmäßig wasserführend).	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	
---------------------------------------	--

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

AN-HANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Feldsoll nordöstlich Naundorf

WB – 266

Lage

4043-41
4563677
5756251

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,7 km NE Naundorf

NHE/Naturraum: D11 / Roßlau-Wittenberger Vorflämung

Landkreis: Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Liegende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeits-klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

I

3

4. Lebensraum

Strukturtyp: C

Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Biotoptyp: AN3

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Ackerbau

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

AN-HANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubeintrag

Überweidung

xx

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Uferverbau

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG FND GLB FFH §-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH (x)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Entkrautung/Entschlammung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

xx

Sicherung von Wanderwegen

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Hinsichtlich Naturraum und Biotoptyp bedeutendes Vorkommen in Sachsen-Anhalt.

• Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wasserhaushalt (unregelmäßig wasserführend).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

171

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Rötlache südwestlich Listerfehrda

WB – 247

Lage

MTBQ

4143-33

GK-R

4637779

GK-H

5742163

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,5 km SW Listerfehrda

NHE/Naturraum:

D10 / Annaburger Heide und Schwarze-Elster-Tal

Landkreis:

Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larve; Ju = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
II	6	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A	Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
			x		
Biotoptyp:	FN3	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
			x		
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
			x		

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Grünland

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	(X) Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Uferverdüdung	mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

kaum anthropogen beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

x

LSG

FND

GLB

FFH

x

\$-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung	Weitere Kartierungen
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Erhöhter Monitoring-Bedarf
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen
- Bedeutendes Vorkommen wegen Seltenheit im Naturraum

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubentrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☒

LSG ☐

FND ☐

GLB ☐

FFH ☒

§-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐

LSG ☐

FND ☐

GLB ☐

FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Entkrautung/Entschlammung

Weitere Kartierungen

punktuell Besatigung v. Rohricht/Ufervegetation

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Bedeutendes Vorkommen wegen Seltenheit im Naturraum

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Mahd-Grünland

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse	Anzahl Rüter	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
I	3		

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Biotoptyp: FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

Bezeichnung:
Elsterwiesen Gorsdorf

Lage

4143-33
4358659
5742014

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung; Laubentrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☒

LSG ☐

FND ☐

GLB ☐

FFH ☒

§-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐

LSG ☐

FND ☐

GLB ☐

FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzeileung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Entkrautung/Entschlammung

Weitere Kartierungen

punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Möglicherweise zeitweises Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
WB – 415

Lage

4143-33
4358659
5742014

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

1997

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,6 km NW Gorsdorf

NHE/Naturraum:

D10 / Annaburger Heide und Schwarze-Elster-Tal

Landkreis:

Wittenberg

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larvch; Juv = Juvenes

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rüfer

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

1 000 - 5 000 m²

> 5 000 m²

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

x

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Mahd-Grünland

Nutzungen Umland:


174

Bezeichnung:

Weier an der Stellanlage Schützberg

WB – 421

Lage	
MTBQ	4242-22
GK-R	4556892
GK-H	5740418



1. Allgemeine Angaben	2.	Vorkommen
Lage:	0,5 km nördl. Schützberg	Aktuell
NHE/Naturraum:	D10 / Dessauer Elbetal	Nicht bestätigt
Landkreis:	Wittenberg	Letztes Nachweisjahr
		2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Laich = Laich; L = Larven; Juvs = Juvenils

Häufigkeits-	Anzahl	Rufer	Reproduktions-	Bemerkungen
Klasse		Nachweis		

I	5			
---	---	--	--	--

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A	Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
			x		
Biotoptyp:	FN3	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
					x
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
				x	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Ackerbau

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession		Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockentallen	x	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung; Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§ 30-Siotop
					x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
		x	(x)	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzuteilung	x	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschreife	xx	Sicherung von Wanderwegen
Enkrautung/Entschlammung		Weitere Kartierungen
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Erhöhter Monitoring-Bedarf
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Waldtümpel Schützberg u. Privatgewässer WB – 420

Lage

4242-22
GK-R
4556787
5739750

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung

Fischbesatz/Angen
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☒ GLB ☒ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung ☒ Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Entkrautung/Entschlammung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

☒ Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres bedeutendes Vorkommen im südöstlichen Elbetal

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

176

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

1. Allgemeine Angaben

Lage:

Westl. Ortsrand Schützberg
D10 / Dessauer Elbetal
Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

☒

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-6; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; La1 = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

II

6

4. Lebensraum

Strukturtyp:

C

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

☒

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

☒

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

☒

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Gärten

Bezeichnung:


Waldtümpel und Wiesenweiher Schützberg

Lage

MTBQ 4242-22
GK-R 4556952
GK-H 5739375

ANHANG
Flächensteckbriefe

WB – 418



1. Allgemeine Angaben

Lage:	Südl. Ortsrand Schützberg	2. Vorkommen	
NHE/Naturraum:	D10 / Dessauer Elbetal	Aktuell	Nicht bestätigt
Landkreis:	Wittenberg		Letztes Nachweisjahr
		x	2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles	
Häufigkeitsklasse	Reproduktionsnachweis
Anzahl Rufe	
II	20

4. Lebensraum

Strukturtyp:	E
Biotoptyp:	FN31
Gewässerfläche:	< 1 000 m ² x
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung:	0 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Mahd-Grünland

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln	Flächensteckbriefe
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung	
Vermüllung, Verfüllen	Uferverbau	x?
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung; Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überweidung	mechan. Zerstörung der Ufervegetation	

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop
				x	x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
		x	(x)	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen	Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung	Weitere Kartierungen
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Erhöhter Monitoring-Bedarf
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutendes Vorkommen am Rand des südöstlichen Elbetales

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Großer Wiesenkolb Schützberg

Lage

4242-22
MTBQ
4557012
GK-R
5738710
GK-H

WB – 416



1. Allgemeine Angaben

Lage:	1,0 km süd. Schützberg	Letztes Nachweisjahr	2001
NHE/Naturraum:	D10 / Dessauer Elbetal	Aktuell	x
Landkreis:	Wittenberg	Nicht bestätigt	

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles	
Häufigkeitsklasse	II
Anzahl Rufer	15
Reproduktionsnachweis	
Bemerkungen	

4. Lebensraum

Strukturtyp:	E	Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
			0-25 %	26-75 %	76-100 %
Biotoptyp:	FN3	Vegetation (DG):	0 %	≤ 50 %	> 50 %
		Beschattung:	x		

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:	Mand-Grünland
Nutzungen Umland:	

2. Vorkommen

Aktuell	x	Letztes Nachweisjahr	2001
---------	---	----------------------	------

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln	
Verlandung, Sukzession		Deichbau/Deichsanierung	
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau	
Gestörter Wassernaushalt, Trockenfallen	x	Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung; Laubeintrag		Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überweidung		mechan. Zerstörung der Ufervegetation	

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§ 30-Biotop
					x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
		x	(x)	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	x	Uferbepflanzung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	xx	Sicherung von Wanderwegen	
Entkrautung/Entschlammung		Weitere Kartierungen	xx
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation		Erhöhter Monitoring-Bedarf	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz			

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen zwingend erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Sehr bedeutendes Vorkommen im südöstlichen Elbetal;
- Stark gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung und (wahrscheinlich) gestörten Wassernaushalt (unregelmäßig wasserführend).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe


Bezeichnung:

Pumpstation Merschwitz

Lage

4242-42
GK-R
4555422
5734061

WB – 277



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,5 km nordöstl. Merschwitz

NHE/Naturraum: D10 / Dessauer Elbetal

Landkreis: Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

I

5

-

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Gewässersfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Biotoptyp: FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Mahd-Grünland, Weide

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Uferverbau

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

FND

GLB

GLB

FFH

§ 30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

FND

GLB

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneifen

Entkrautung/Entschlammung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Weiterhin keine Nutzung, kein Fischbesatz

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

• Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen

180

Bezeichnung:
Abgrabungen Bösewig

WB – 072

Lage

MTBQ
4242/23

GK-R
4554295

GK-H
5737136

1. Allgemeine Angaben

Lage: NNE Bösewig innerdeichs
NHE/Maturraum: D10 / Dessauer Elbetal
Landkreis: Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell: x
Nicht bestätigt:
Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse: IV
Anzahl Rufer: ~ 80
Reproduktions-Nachweis: Juv

Bemerkungen

- eines der individuenreichsten Vorkommen im Kreis Wittenberg

4. Lebensraum

Strukturtyp: C / D
Biototyp: FA1

Gewässerfläche: x
Vegetation (DG): x
Beschattung: x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

z.T. Fischaufzuchtgewässer/Angelnutzung
Mand-Grünland, Siedlung, Gärten, Acker

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Überweidung

(x)

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

• Erweiterung des NSG „Alte Elbe bei Bösewig“ auf innerdeichs gelegene Qualmgewässer;
• Erweiterung des FFH-Gebietes „Eibaue zwischen Grieco und Pretlin“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung: xx Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze: xx Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen: x Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung: Sicherung der Wassererhaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation: Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz: xx Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Regelung der fischereilichen/Angelnutzung erforderlich, kein Besatz, keine Fischaufzucht

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Bedeutendes, individuenreiches Vorkommen im Landkreis und in der Region

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Kammolch
Knoblauchkröte
Wechselkröte
Laubfrosch
Moorfrosch

(*Triturus cristatus*)
(*Pelobates fuscus*)
(*Bufo viridis*)
(*Hyla arborea*)
(*Rana arvalis*)

FFH-Anh. II


182

Bezeichnung:

Feldweiher nördlich Bleddin

WB – 056

Lage
MTBQ 4242-21
GK-R 4554473
GK-H 5739801



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	0,3 km nördl. Bleddin	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D10 / Dessauer Elbetal	x	
Landkreis:	Wittenberg		2000

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larve; Lar = Larven; Juv = Juveniles	
Häufigkeits- Klasse	Reproduktions- Nachweis
II	6

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	D
Biotoptyp:	FN3
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
x	
26-75 %	
76-100 %	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
x	
> 50 %	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	Mahd-Gründland, Weide
Nutzungen Umland:	

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x	Fischbesatz/Angehn
Verlandung, Sukzession		Deichtbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung; Laubeintrag	(x)	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:
• im Acker gelegen, mit Gehölzstreifen

7. Schutz
Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	x	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop
						x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
				x

• Erweiterung des FFH-Gebietes „Elbaue zwischen Griebö und Prettin“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	xx	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	x	Sicherung von Wanderwegen
Entkrautung/Entschlammung		Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Einrichtung von Gewässerrandstreifen erforderlich

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- kleineres, bedeutendes Vorkommen

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Laubfrosch	(Hyla arborea)
------------	----------------


Bezeichnung:

Dorfeich Dorna

WB – 127

Lage

MTBQ 4242-11
GK-R 4548925
GK-H 5738926



1. Allgemeine Angaben

Lage: Westlicher Ortsrand Dorna
NHE/Naturraum: D 09 / Dessauer Elbetal
Landkreis: Wittenberg

2. Vorkommen

Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x		2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
I	3		

4. Lebensraum

Strukturtyp:	F	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
				x	
Biotoptyp:	AA1	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
			x		
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
				x	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:
Siedlung, Ruderalfluren, Verkehrswege

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln	x?
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsaniierung	
Vermüllung, Verfüllen	Uferverbau	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung, Laubeintrag	Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)	(x)
Überweidung	mechan. Zerstörung der Ufervegetation	

Weitere Anmerkungen:

- frisch entschlammt, mit Initialpflanzungen

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop
					x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung	Uferbepflanzung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen	x
Entkrautung/Entschlammung	Sicherung der Wasserhaltung	
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:


8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres bedeutendes Vorkommen am Rand des Dessauer Elbetals.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*)

Bezeichnung: **Wartenburg – Kleiner Streng und Rötolk** **WB – 448**



Lage
MTBQ 4142-43
GK-R 4553928
GK-H 5741753

1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	SE Ortsrand Wartenburg	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
NH/E/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x		2001
Landkreis:	Wittenberg			

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Bemerkungen
II	12	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	C / D
Biotoptyp:	FN3
Gewässerfläche:	< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung:	0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen
Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Siedlung, Gärten, Verkehrswege

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x
Verlandung, Sukzession	Fischbesatz/Angeln
Vermüllung, Verfüllen	Deichbau/Deichsanierung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Uferverbau
Beschattung; Laubentrag	Zerschneidung von Wanderwegen
Überweidung	Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Weitere Anmerkungen:	mechan. Zerstörung der Ufervegetation

- Abwassereinleitung vom Ort
- Verkehrsverluste möglich (Straße Wartenburg – Bleddin)

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒	

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒	
• Erweiterung des FFH-Gebietes „Eibau zwischen Griebö und Prettin“.	

Prioritäre Schutz- und Pfleßmaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	x
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferbepflanzung
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen	Uferrenaturierung (Profil)
Entkrautung/Entschlammung	Sicherung von Wanderwegen
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Sicherung der Wasserhaltung
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Weitere Kartierungen
	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- 8. Gesamtbewertung/Bemerkungen**
- Regional bedeutendes Vorkommen, da eibwärts große Verbreitungslücke!
- 9. Wertgebende Begleitarten Amphibien**

Bezeichnung:
Weier am Ortsrand Wartenburg

WB – 447

Lage

MTBQ 4142-43
GK-R 4554313
GK-H 5742529

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

x

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung; Laubeintrag

x

Freizeitmutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

• Erweiterung des FFH-Gebietes „Elbaue zwischen Griebö und Pretin“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzsteilung

x

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

x

Sicherung von Wanderwegen

Entkrautung/Entschlammung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Regional bedeutendes Vorkommen, da elbabwärts große Verbreitungslücke!

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Röbbauchhünke Sachsen-Anhalt


ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Weier am Ortsrand Wartenburg

WB – 447

Lage

MTBQ 4142-43
GK-R 4554313
GK-H 5742529



1. Allgemeine Angaben

2. Vorkommen

Lage:

Nördl. Ortsrand Wartenburg

Aktuell

x

Letztes Nachweisjahr

2000

NHE/Naturraum:

D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis:

Wittenberg

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

I

Reproduktions-Nachweis

5

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

D / F

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

5 000 m²

> 5 000 m²

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

x

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

x

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Siedlung, Gärten, Grünland

187

Bezeichnung: Kleindröben – Weiher am Weinberg WB – 232

Lage

MTBQ 4243-31
GK-R 4558990
GK-H 5735290



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	1 km nordöstl. Kleindröben	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x	
Landkreis:	Wittenberg		Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeits- klasse	Reproduktions- Nachweis		Bemerkungen
	Anzahl	Rüfer	
I	5		

4. Lebensraum				
Strukturtyp:	D			
Biotoptyp:	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
		x		
	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
			x	
	Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
			x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Acker, Laubwald

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Uferverbau
Gestörter Wasseraustausch, Trockenfallen	Freizeitnutzung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung	mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

- kaum anthropogen beeinträchtigt

7. Schutz						
Aktueller Schutzstatus:						
NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop	x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):					
NSG	LSG	FND	GLB (x)	FFH	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen					
Unterschutzstellung	x	Uferbepflanzung			
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)			
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen		Sicherung von Wanderwegen			
Entkrautung/Entschlammung		Sicherung der Wasserhaltung			
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen			
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf			

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres Vorkommen im Randbereich des Dessauer Elbetals.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	
Kreuzkröte (Bufo calamita)	(in einmündendem Graben)
Moorfrosch (Rana arvalis)	

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchfische Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Riesigk – Weiher am Schönlitzer See

AZE – 371

Lage

MTBO
4140-42

GK-R
4531608

GK-H
5744681

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1 km nördl. Riesigk

NHE/Naturraum:

D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis:

Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

1996

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Mand-Grünland, Weide

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchfische Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

x

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung; Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

xx

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

x

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

x

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

x

Sicherung von Wanderwegen

Auskoppeln bei Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

xx

Weitere Kantierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Möglicherweise auch aktuell kleineres, durch landwirtschaftliche Intensivnutzung gefährdetes Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

190

Bezeichnung:
Brennickel Buro

Lage
MTBQ 4140-21
GK-R 4528765
GK-H 5749558

6. Beeinträchtigung/Gefährdung
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung (x) Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession (x) Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung mechan. Zerstörung der Ufervegetation
Weitere Anmerkungen:

7. Schutz
Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐
• geplantes NSG „Brennickel“

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen
Unterschutzstellung xx Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen (x) Sicherung von Wanderwegen
Auskoppeln bei Beweidung Sicherung der Wasserhaltung x
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf


Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
• Am Nordrand gegen die Ackerfläche abpuffern (Randstreifen!);
• Langfristig Beobachtung der Sukzession, ggf. Freistellen von Gewässern im Bedarfsfall.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen
• Regional sehr bedeutendes rechtseisbisches Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien
Moorfrosch (Rana arvalis)

Bezeichnung:
AZE – 088

Lage
MTBQ 4140-21
GK-R 4528765
GK-H 5749558



1. Allgemeine Angaben
Lage: 2 km westl. Coswig
NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal
Landkreis: Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen
Aktuell x
Nicht bestätigt
Letztes Nachweisjahr 2000

3. Aktueller Bestand
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larven; Juv = Juveniles
Häufigkeitsklasse Anzahl Rüfer Reproduktionsnachweis
III 40
Bemerkungen

4. Lebensraum
Strukturtyp: E / G
Biototyp: FN3
Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²
Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen
Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland, Acker im Norden

Bezeichnung:
Deichvorland bei Wörlitz

Lage
MTBQ 4140-14
GK-R 4528450
GK-H 5747172

AZE – 467



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	1,5 km nördl. Wörlitz		Aktuell	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal		x	2002
Landkreis:	Anhalt-Zerbst			

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (H-K): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis		Bemerkungen
V	~ 220		Lar	

4. Lebensraum		
Strukturtyp:	A	Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² x
Biotoptyp:	FN4	Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 % x
		Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Mahd-Grünland

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasseraushalt, Trockenfallen

Beschattung: Laubeintrag

Intensivmäh

(x) mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Uferverbau

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

- Einbindung in geplantes NSG „Wildeberg“ prüfen! Als bedeutendste Vorkommen der Region sollten sie dringend in einem NSG gesichert werden!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen		
Unterschutzzstellung	x	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x ¹	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	(x)	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mahd	x	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- ¹ geplantes NSG „Wildeberg“
- Schonung der Gewässerränder, Flutrinnen, temporären Wasserstellen etc. bei Mahd

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Regional eines der bedeutendsten und individuenreichsten Vorkommen!

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moortfrosch (Rana arvalis)

Bezeichnung:
Wörlitz – Deich am Krägen-Riss

Lage


4140-32
4527240
5745730

MTBQ
GK-R
GK-H

4140-32
4527240
5745730

Wörlitz – Deich am Krägen-Riss

AZE – 469





6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Intensivmahd

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation
(x)

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☒ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §30-Biotop ☒
1, 2, 3 im NSG „Krägen-Riss“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerschonung bei Mahd
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
(x) Sicherung von Wanderwegen
x Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Schonung der Gewässerränder, Flutrinnen, temporären Wasserstellen etc. bei Mahd
- Es sind Möglichkeiten zu prüfen, die Wasserhaltung im Deichvorland zu optimieren (Verschluss von Entwässerungsgräben, Instandsetzung eines alten Graben-Stauwerkes am Riss).

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Ausstrahlung der nördlichen Vorkommen, Reproduktion im Gebiet wahrscheinlich unregelmäßig und stark von Hochwasserverläufen abhängig.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch
(*Rana arvalis*)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Wörlitz – Deich am Krägen-Riss

Lage


4140-32
4527240
5745730

MTBQ
GK-R
GK-H

4140-32
4527240
5745730

Wörlitz – Deich am Krägen-Riss

AZE – 469





1. Allgemeine Angaben

Lage: 1.5 km westl. Wörlitz
NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal
Landkreis: Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen
Aktuell: x
Letztes Nachweisjahr: 2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse: II
Anzahl Rufer: 10
Reproduktionsnachweis: -

Bemerkungen:
- in enger Beziehung zu nördlichen Vorkommen

4. Lebensraum

Strukturtyp: A
Biototyp: FN4

Gewässerfläche: ☒ < 1 000 m² ☒ 1 000 m² - 5 000 m² ☒ > 5 000 m²
Vegetation (DG): 0-25 % ☒ 26-75 % ☒ 76-100 %
Beschattung: 0 % ☒ ≤ 50 % ☒ > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Mahd-Grünland, Elbdeich

193

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunkte Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

Alte Elbe Klieken

Lage

4140-11

4523634

5750136

AN-HANG

Flächensteckbriefe


4140-11

4523634

5750136

Alte Elbe Klieken

AZE – 240



1. Allgemeine Angaben

Lage:

NHE/Naturraum:

Landkreis:

2 km westl. Klieken

D 10 / Dessauer Elbetal

Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-

klasse

Anzahl

Reproduktions-

Nachweis

Bemerkungen

I

2-3

4. Lebensraum

Strukturtyp:

C

Biotoptyp:

FN33

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

teils Grünland, sonst Wald

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunkte Sachsen-Anhalt

AN-HANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockentallen

Beschattung; Laubeintrag

Intensivmäh

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanie rung

Uferverbau

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Priorität Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerschö nung bei Mäh

punktu elle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


194

Bezeichnung:
Dessau-Waldersee – Leiner Berg

Lage

MTBQ 4139-24
GK-R 4521602
GK-H 5748065

AZE – 121



Bezeichnung:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschränkung, Laubeintrag
Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeleinnutzung (Baden, Campen u.a.)
(x) mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

wenig anthropogen beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ § 30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonschutzeifen
Gewässerschonung bei Mäh
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Keine vorordentlichen Maßnahmen erforderlich. Sicherung der Überflutungsdynamik

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Regional bedeutsames Vorkommen, schutzwürdig zur Ausweisung als NSG.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt


ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Dessau-Waldersee – Leiner Berg

Lage

MTBQ 4139-24
GK-R 4521602
GK-H 5748065

AZE – 121



Bezeichnung:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,6 km NE DE-Waldersee
NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal
Landkreis: Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Lärch; Lar = Larven; Juv = Juvenas

Häufigkeits- Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions- Nachweis

Bemerkungen

II

20

Lai

4. Lebensraum

Strukturtyp: A / G

Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

teils Mahd-Grünland, sonst Auwald

195

Bezeichnung:
Dessau-Waldersee – Luisium
AZE – 257

Lage

4139-23
GK-R
4518743
5746309
GK-H



1. Allgemeine Angaben

Lage:

DE-Waldersee, Park Luisium

NIE/Naturraum:

D 10 / Muldetal

Landkreis:

Anhalt-Zerbst

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

III

Anzahl Rufer

50

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

C

Biotoptyp:

FN4

Gewässerfläche:

< 1 000 m² x 5 000 m² > 5 000 m²

Vegetation (DG):

0-25 % x 26-75 % 76-100 %

Beschattung:

0 % x 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Parkanlagen, Grünland (Rasen)

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung: Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Intensivmäh

mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

1 Parkbetrieb, Tourismus, Erholung

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☐

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

Novellerungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschonung bei Mäh

x Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Regional bedeutsames Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Laubfrosch (Hyla arborea)

Moorfrosch (Rana arvalis)

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Intensivmahd

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

- Keine äußeren Gefährdungen erkennbar.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

x

LSG

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

x

z.T. NSG „Untere Mulde“, z.T. geplantes NSG „Stillinge bei Niesau“, z.T. FFH-Gebiet „Untere Muldeau“.

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzeinstellung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen
Gewässersanierung bei Mahd
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erörterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- weitere Überprüfungen v.a. nach Hochwasser sinnvoll

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Moorfrosch

(*Rana anallis*)

Bezeichnung:

Muldeau bei Möst

BTF – 282



1. Allgemeine Angaben

Lage: Muldeau W und N Möst

NHE/Naturraum: D 10 / Muldetal

Landkreis: Bitterfeld

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

1996

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-6; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

-

-

-

- Aktuelles Vorkommen möglich (2002?)

4. Lebensraum

Strukturtyp: C

Biotoptyp: FN1/FN3

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

x

0-25 %

x

0 %

< 5 000 m²

26-75 %

≤ 50 %

> 5 000 m²

76-100 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:


Nutzungen Umland:

Grünland, Wald, (Siedlung)

Bezeichnung:
Unterluch Roßlau

Lage
4139-14
4514914
5747652
GK-H

AZE – 383



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	2 km südl. Roßlau	Aktuell	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x	2000
Landkreis:	Anhalt-Zerbst		

3. Aktueller Bestand		
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rüfer	Reproduktions-Nachweis
II	15	-

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biotoptyp:	FN4

Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
	x		
Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
	x		
Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
	x		

Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Mahd-Grünland

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung: Laubeintrag
Intensivmahd
Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
(x) Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

Unzureichende Wasserhaltung der Kleingewässer → Gebietswasserhaushalt ist zu prüfen und ggf. zu verbessern.

7. Schutz						
Aktueller Schutzstatus:						
NSG		LSG	x	FND		GLB
						FFH
					x	§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):						
NSG	x	LSG		FND		GLB
						FFH

Ausweisung des geplanten NSG „Unterluch „Roßlau“

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen				
Unterschutzstellung		x	Uferbepflanzung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze			Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonschuttreifen			Sicherung von Wanderwegen	
Gewässerschonung bei Mahd		xx	Sicherung der Wasserhaltung	x
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation			Weitere Kartierungen	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz			Erhöhter Monitoring-Bedarf	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Keine vordringlichen Maßnahmen erforderlich, Sicherung der Überflutungsdynamik.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Gegenwärtig kleinere, aber bedeutende Vorkommen im Landschaftsraum.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Großkühnau – Unterbruch

Lage
MTBQ 4139-13
GK-R 4512427
GK-H 5747442

AZE – 157



Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Besetzter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Intensivmäh

Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
(x) Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:
• Vermutlich starke Entwässerung durch abführenden Graben => Gebietswasserhaushalt ist zu prüfen und ggf. zu verbessern, z.B. durch Stauhaltung.

7. Schutz
Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐
• Dringend Ausweisung der geplanten Erweiterung des NSG „Saalberghau“!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen
Unterschutzstellung **xx** Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mahd Sicherung der Wasserenthaltung **xx**
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf
Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
• Unbedingt Sicherung einer optimalen Wasserenthaltung im Gebiet! Prüfung des nordwärts entwässernden Grabens (Stauhaltung?).

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen
• Regional sehr bedeutendes, individuenreiches Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Großkühnau – Unterbruch

Lage
MTBQ 4139-13
GK-R 4512427
GK-H 5747442

AZE – 157



Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Besetzter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Intensivmäh

Deichbau/Deichsanierung
Uferverbau
(x) Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:
• Vermutlich starke Entwässerung durch abführenden Graben => Gebietswasserhaushalt ist zu prüfen und ggf. zu verbessern, z.B. durch Stauhaltung.

7. Schutz
Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐
• Dringend Ausweisung der geplanten Erweiterung des NSG „Saalberghau“!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen
Unterschutzstellung **xx** Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mahd Sicherung der Wasserenthaltung **xx**
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf
Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
• Unbedingt Sicherung einer optimalen Wasserenthaltung im Gebiet! Prüfung des nordwärts entwässernden Grabens (Stauhaltung?).


8. Gesamtbewertung/Bemerkungen
• Regional sehr bedeutendes, individuenreiches Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Großkühnau – Dorfteich

AZE – 155

Lage
MTBQ 4139-13
GK-R 4512230
GK-H 5746570



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	Ort Großkühnau	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x	
Landkreis:	Anhalt-Zerbst		Letztes Nachweisjahr 1999

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles	
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer
II	10

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	H
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Siedlung, Verkehrswege

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung x Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung: Laubeintrag Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Intensivmäh mechan. Zerstörung der Ufervegetation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG
FND	GLB
FFH	§-30-Biotop
x	
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
FND	GLB
FFH	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mähd	Sicherung der Wassererhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Eräuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Langfristig ist ein Schutz vor anthropogenen Eingriffen (z.B. intensive Dorfteichsanierung, Uferverbau etc.) dringend erforderlich!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Bedeutendes Vorkommen im Siedlungsbereich.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

x

Fischbesatz/Angeln

x

Verlandung, Sukzession

x

Deichbau/Deichsanierung

x

Vermüllung, Verfüllen

Uferverbau

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

(x)

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Intensivmahd

Isolation

x

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

(x)

GLB

(x)

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzstellung

x

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschonung bei Mahd

Sicherung der Wasserhaltung

x

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

x

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


Zwischenzeitlich wahrscheinlich isoliertes Restvorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

Mosigkau – Sommerwiesen

DE – 117





Bezeichnung: **Aken – Olberg I**

Bezeichnung: **KÖT – 590**

Lage

MTBQ 4138-24
GK-R 4508925
GK-H 5747665



1. Allgemeine Angaben

Lage: 5 km nordöstl. Aken

NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis: Köthen

2. Vorkommen

Aktuell x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr 2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenas

Häufigkeitsklasse

Arzahl / Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

IV

~ 100

4. Lebensraum

Strukturtyp: D / G

Biotoptyp: FN4/FN32

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

x

x

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland (genutzt?), Auwald

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rothauchtunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Uferverbau

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

Kaum anthropogen beeinträchtigt.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FFH

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

Dringend Ausweisung des geplanten NSG „Olberg“!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerschonung bei Mäh

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Regional bedeutendes, individuenreiches Vorkommen. Seltener Habitattyp (Laichgewässer z.T. im lichten Auwald).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

202

Bezeichnung: **Fähre Aken**

Lage: **KÖT – 020**

MTBQ 4138-23
GK-R 4507169
GK-H 5747618



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	NE Aken, Anleger Fähre	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x		2000
Landkreis:	Köthen			

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeits-klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis
V	~ 140	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Biotoptyp:	FN4/FN31
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Grünland, Siedlung, z.T. Gärten

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x
Verlandung, Sukzession	x
Vermüllung, Verfüllen	
Gestörter Wasserschuhalt, Trockenfallen	
Beschattung: Laubeintrag	
Intensivmäh	
Weitere Anmerkungen:	Fischbesatz/Angeln Deichbau/Deichsanierung Uferverbau Zerschneidung von Wanderwegen Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) Isolation

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG x FND GLB FFH §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG x LSG FND GLB FFH	
Erweiterungsmöglichkeiten des geplanten NSG „Obergr“ nach Westen prüfen!	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzzstellung	x Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x ¹ Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschreitren	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mäh	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf


Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:	
¹ betrifft geplantes NSG „Obergr“	
Sicherung der natürlichen Überflutungsdynamik, möglichst lange Wasserrückhaltung nach Hochwassern.	

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
Eines der bedeutendsten, individuenreichsten Vorkommen der Region, mindestens teilweise schutzwürdig als NSG.	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	
---------------------------------------	--

Bezeichnung:
Aken – Lorf

Lage
MTBQ 4138-13
GK-R 4501977
GK-H 5747175



KÖT – 027

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x	Deichtbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag		Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmahd		Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG		LSG	x	FND		GLB		FFH		§30-Biotop	x
-----	--	-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG		LSG		FND		GLB		FFH	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung		Uferbepflanzung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen		Sicherung von Wanderwegen	
Gewässerschönung bei Mahd		Sicherung der Wassernutzung	x
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der natürlichen Überflutungsdynamik, möglichst lange Wasserrückhaltung nach Hochwassern.


8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutendes Vorkommen in der Region.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Aken – Lorf

Lage
MTBQ 4138-13
GK-R 4501977
GK-H 5747175



KÖT – 027

1. Allgemeine Angaben

Lage: NW Aken, Ortsteil Lorf

NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis: Köthen

2. Vorkommen

Aktuell	x	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr	2000
---------	---	-----------------	----------------------	------

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lat = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
III	30		

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A
Biototyp:	FN4

Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
		x	
Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		x	
Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
		x	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Industriebrache


Bezeichnung:

Aken-Lorf – Preußens Sumpfe

KÖT – 028

Lage

MTBQ 4138-13
GK-R 4500647
GK-H 5747567



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	2 km nordwestl. Aken	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x		2000
Landkreis:	Köthen			

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenos		
Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis
III	40	-

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
	x
Biototyp:	AN4
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
	x
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
	x

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Acker, Ackerbrache

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x
Verlandung, Sukzession	x
Vermüllung, Verfüllen	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	
Beschattung: Laubeintrag	
Intensivmäh	
Weitere Anmerkungen:	
Fischbesatz/Angeln	
Deichbau/Deichsanierung	
Uferverbau	
Zerschneidung von Wanderwegen	
Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Isolation	

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG x
FND	GLB
FFH	§-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
FND	GLB x
FFH	FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschützstellung	x
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	x
Gewässerschonung bei Mähd	x
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	(x)
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf
Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:	
Uferbepflanzung	
Uferrenaturierung (Profil)	
Sicherung von Wanderwegen	
Sicherung der Wasserhaltung	
Weitere Kartierungen	

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
Bedeutendes Vorkommen in der Region aber offensichtlich starker Rückgang in den vergangenen Jahren.	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	
Knoblauchkröte	(Pelobates fuscus)

Bezeichnung:


Susigke – Karpfenteich

KÖT – 431

Lage

MTBQ 4138.32
GK-R 4504636
GK-H 5743979





1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	0.5 km südwestl. Susigke	Aktuell	Letztes
NHIE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	x	Nachweisjahr
Landkreis:	Köthen		2000

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larven; Juu = Juvenes	
Häufigkeits-klasse	Anzahl Rufer
I	5
Bemerkungen	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	C
Biotoptyp:	AN3
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	Mahd-Grünland, Grünland-Brache, Gehölz
Nutzungen Umland:	

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Uferverbau
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung: Laubeintrag	Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmahd	Isolation
Weitere Anmerkungen:	x?

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG
FND	FND
GLB	GLB
FFH	§-30-Biotop
x	
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
FND	FND
GLB	GLB
FFH	FFH
x	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	x Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mahd	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	x Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf
xx	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Vorsichtige teilweise Entkrautung/Entschlammung des Gewässers.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
Vermutlich ± isoliertes Restvorkommen in der Region.	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Elsnigk – Erlenteich

Lage

MTBO

4238-12

GK-R

4503260

GK-H

5739780

KÖT – 325

1. Allgemeine Angaben

Lage:

Nördl. Straße n. Osternienburg

NHE/Naturraum:

D 20 / Mosigkauer Heide

Landkreis:

Köthen

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
I	5		

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Biototyp:

AN4

Vegetation (DG):

0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung:

0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Siedlung, Verkehrswege

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

x

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung: Laubeintrag

Intensivmäh

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

x

GLB

x

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

x

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschonung bei Mähd

Sicherung der Wasserschaltung

punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation

(x)

Weitere Kartierungen

Baselierung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Restvorkommen mit regionaler Bedeutung im Randbereich des Köthener Ackerlandes.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

210

Bezeichnung: **Mennewitz I**

Lage

MTBQ 4137-42

GK-R 4498961

GK-H 5745477

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Intensivmäh

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

(x)

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschreife

Gewässerschonung bei Mäh

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

x

x

x

x

xx

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Restvorkommen mit regionaler Bedeutung im Randbereich des Köthener Ackerlandes.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung: **KÖT – 271**

Lage

MTBQ 4137-42

GK-R 4498961

GK-H 5745477

1. Allgemeine Angaben

Lage: Südwestl. Ortsrand Mennewitz

NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis: Köthen

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

II

12

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Biototyp: AN3

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

0-25 %

26-75 %

76-100 %

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

x

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:


Grünland, Acker, Siedlung

211

Bezeichnung:
Mennewitz II

KÖT – 270

Lage
MTBQ 413742
GK-R 4498796
GK-H 5745814



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	NW Ortsrand Mennewitz	Letztes Nachweijahr	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D 10 / Dessauer Elbetal	2000	x	
Landkreis:	Köthen			

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
I	5	-	

4. Lebensraum	C
Strukturtyp:	
Biotoptyp:	AN3
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Acker, Brache, Siedlung

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

(x)

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG FND GLB FFH §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB x FFH x

Naturschutzrechtliche Sicherung zusammen mit südlicheren Vorkommen (KÖT – 271)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzzsteilung	x Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	x Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mäh	Sicherung der Wasserschaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf
xx	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Restvorkommen mit regionaler Bedeutung im Randbereich des Köthener Ackerlandes.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: **Wulfener Bruch**

Lage: 4137-41
4496580
5745153

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmäh	Isolation

Weitere Anmerkungen: (x)

- Alter Stauteich stark verschliff (Foto), wenige Rufer in Restwasserzonen.
- Östliches Seggenried ebenfalls ohne freie Wasserfläche, wenige Rufer.

Bezeichnung: **KÖT – 125**

Lage: 4137-41
4496580
5745153

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmäh	Isolation

Weitere Anmerkungen: (x)

- Alter Stauteich stark verschliff (Foto), wenige Rufer in Restwasserzonen.
- Östliches Seggenried ebenfalls ohne freie Wasserfläche, wenige Rufer.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	x	LSG	x	FND		GLB		FFH	x	§ 30-Biotop	x
-----	---	-----	---	-----	--	-----	--	-----	---	-------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG		LSG		FND		GLB		FFH	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,5 km nordöstl. Wulfen

NHE/Naturraum: D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis: Köthen

2. Vorkommen

Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x		2002

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
II	8		

4. Lebensraum

Strukturtyp: A / B

Biotoptyp: AN4/FN4

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Grünland, Mahd-Grünland, Brache

Nutzungen Umland:

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Gebietswasserhaushalt ist dringend zu prüfen und ggf. zu optimieren (Abflussverzögerung!)
- Teilweise Entkrautung / Schilfmahd im alten Stauteich dringend notwendig.
- Auf östlicher Fläche (Seggenried/Nasswiese) ist die Anlage kleinerer Tümpel zu erwägen, hier aber Abgleich mit Belangen des Wiesenbrüterschutzes erforderlich!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres Restvorkommen mit sehr hoher regionaler Bedeutung im Randbereich des Köthener Ackerlandes.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Gewässerfläche: < 1 000 m² : x
1 000 m² - 5 000 m² : x
> 5 000 m² : x

Vegetation (DG): 0-25 % : 26-75 % : 76-100 % : x

Beschattung: 0 % : ≤ 50 % : > 50 % : x


Bezeichnung:

Saaletal zwischen Calbe und Trabit

SBK - 583

Lage	MTBQ	GK-R	GK-H
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

4036-44
4487215
5752574



1. Allgemeine Angaben

Lage: 2 km östl. Calbe (Saale)
NHE/Naturraum: D 10 / Unteres Saaletal
Landkreis: Schönebeck

2. Vorkommen

Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x		2002

3. Aktueller Bestand

Legend: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp: B

	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Gewässerfläche:		x	
Vegetation (pG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
	x		x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Saale-Deich, Bahnlinie

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung		Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	(x)	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	(x)	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitmutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmäh		Isolation

Weitere Anmerkungen:

- Möglicherweise unzureichender Wasserrückhalt im Jahresverlauf, Gefahr vorzeitiger Austrocknung.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	\$-30-Biotop	x
-----	-----	-----	-----	-----	--------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG (x)	LSG	FND	GLB	FFH	x

- Erweiterung des FFH-Gebietes DE4037303 „Saaleaue bei Groß-Rosenburg“:

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	xx
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x ¹
Ausgliederung von Gewässerschutstreifen	xx
Gewässerschonung bei Mahd	xx
punktueller Beseitigung v. Rohrkriech/Unkräutern	x
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	x
Uferbepflanzung	xx
Uferrenaturierung (Profil)	xx
Sicherung von Wanderwegen	xx
Sicherung der Wasserrhaltung	xx
Weitere Kartierungen	xx
Erhöhter Monitoring-Bedarf	x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- ¹ betrifft FFH-Gebiet DE4037303 „Saaleaue bei Groß-Rosenburg“;
- Sicherstellung der regelmäßigen Überflutung über vorhandenen Siel des Saaledeiches, Gewährleistung einer ausreichenden Wasserrückhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Eines der bedeutendsten Vorkommen im Naturraum Unteres Saaletal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: Calbe – Gottesgnaden

Lage: 403643
MTBO 4485448
GKR 5752111

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung x Fischbesatz/Angeln x?

Verlandung, Sukzession Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Intensivmäh Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus: NSG LSG FND GLB FFH §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung): NSG (x) LSG FND GLB FFH x

• Erweiterung des FFH-Gebietes DE4037303 „Saaleue bei Groß-Rosenburg“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung xx Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze x¹ Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonsstreifen x Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschonung bei Mähd x Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• ¹ betrifft FFH-Gebiet DE4037303 „Saaleue bei Groß-Rosenburg“;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Eines der bedeutendsten Vorkommen im Naturraum Unteres Saaletal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: Calbe – Gottesgnaden

Lage: 403643
MTBO 4485448
GKR 5752111

SBK – 584



1. Allgemeine Angaben

Lage: Weiher an der Kirche

NHE/Naturraum: D 10 / Unteres Saaletal

Landkreis: Schönebeck

2. Vorkommen

Aktuell x Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr 2002

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse II Anzahl Rüfer 20 Reproduktionsnachweis Lai

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

4. Lebensraum

Strukturtyp: C

Gewässerfläche: < 1 000 m² x 5 000 m² > 5 000 m²

Biototyp: AN3

Vegetation (DG): 0-25 % x 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen


Nutzungen Gewässer: Fischbesatz ?

Nutzungen Umland: Siedlung, Streuobst Grünland

Bezeichnung:

Calbe – Zenser Teich

Lage	
MTBQ	4036-41
GK-R	4482967
GK-H	5754870

**SBK - 485**

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,5 km NW Calbe (Saale)
NHE/Naturraum: D 20 / Magdeburger Börde
Landkreis: Schönebeck

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	3	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	D	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	AN3	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Angelgewässer (Zenser Teich), Weiher in Gartenanlage (Foto)

ohne Nutzung
Acker, Gartenanlage

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffreichtum, Hypertrophierung	x	Fischbesatz/Angeln	x
Verlandung, Sukzession	xx	Deichbau/Deichsaniierung	xx
Vermüllung, Vertüfen		Bebauung	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung, Laubentrag	xx	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	(x)
Intensivmäh		Isolation	

Weitere Anmerkungen:

- ¹ betrifft kleinen Weiher in Gartenanlage (Foto)

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop	x
-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND (x)	GLB (x)	FFH
-----	-----	---------	---------	-----

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung	(x)	Uferbepflanzung Uferrenaturierung (Profil) Sicherung von Wanderwegen Sicherung der Wasserhaltung Weitere Kartierungen Erhöhter Monitoring-Bedarf
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze Ausgliederung von Gewässerschutzstreifen Gewässerschonung bei Mahd punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		x¹

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- ¹ betrifft Zenser Teich;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres, stark gefährdetes Randvorkommen am Südrand der Magdeburger Börde im Übergang zum Unteren Saaletal.


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Elbenau – Alte Fähre

SBK – 131

Lage

393641
4485455
5767363



1. Allgemeine Angaben

Lage:
1,7 km östl. Elbenau

NHE/Naturraum:
D 10 / Dessauer Elbetal

Landkreis:
Schönebeck

2. Vorkommen

Aktuell
x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr
2000

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweise:
Paar = Paarung; Lai = Lach; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl	Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	5	-	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:
E

Biotoptyp:
FA1

Gewässerfläche:
< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Vegetation (DG):
0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung:
0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Acker, Straße

Nutzungen Umland:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasseraustausch, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln

x Deichbau/Deichsanierung

x Bebauung

x Zerschneidung von Wanderwegen

x Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☒ GLB ☒ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneifen

Gewässerschonung bei Mähd

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserehaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Partielle Zurückdrängung des Schiffs mittelfristig erforderlich, ggf. auch Gehölzrück-

schnitt.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres, stark gefährdetes und ± isoliertes Restvorkommen im Elbetal bei Schönebeck.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)


Moorfrosch (Rana arvalis)

220

Bezeichnung:
Magdeburg – Cracauer Anger
MD – 589

Lage

MTBQ
4476713
GK-R
5776409



3836-31
4476713
GK-R
5776409

Nährstoffentfräse, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln
x
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
(x)
Zerschneidung von Wanderwegen
(x)
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

x?

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ § 30-Biotop ☐ x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☒ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung	(x)	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschneifen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mähd		Sicherung der Wassererhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	x	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Partielle Zurückdrängung des Schiffs und Gehölzrückschnitt mittelfristig erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres, stark gefährdetes und ± isoliertes Restvorkommen im Elbeta bei Magdeburg.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Magdeburg – Cracauer Anger
MD – 589

Lage

3836-31
4476713
GK-R
5776409



3836-31
4476713
GK-R
5776409

Nährstoffentfräse, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln
x
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
(x)
Zerschneidung von Wanderwegen
(x)
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

x?

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ § 30-Biotop ☐ x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☒ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung	(x)	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschneifen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mähd		Sicherung der Wassererhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	x	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Partielle Zurückdrängung des Schiffs und Gehölzrückschnitt mittelfristig erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres, stark gefährdetes und ± isoliertes Restvorkommen im Elbeta bei Magdeburg.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Laubwald, Siedlung

221

Bezeichnung:
Hohenwarthe – Taufwiesenberge

JL – 585

Lage

3736-32
4481766
5789895



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	2 km nordöstl. Hohenwarthe	Aktuell	Letztes
NHE/Naturraum:	D 09 / Burger Vorflämng	x	Nachweisjahr
Landkreis:	Jerichower Land		2002

3. Aktueller Bestand
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- Klasse	Anzahl	Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
IV	75			Lar

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	D
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Biotoptyp:	AA2
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	illegale Badegewässer, Angeln
Nutzungen Umland:	Kiefernforst, Grünland, Siedlung

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	(x) Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubenintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Intensivmäh	Isolation
Weitere Anmerkungen:	x?

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	x
LSG	x
FND	
GLB	
FFH	x
§-30-Biolog	x
• z.T. im NSG „Taufwiesenberge“, z.T. im FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohrenmündung“ (nordwestliche Gewässer).	

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	x
LSG	
FND	
GLB	
FFH	x

- Erweiterung des NSG und des FFH-Gebietes nach Südosten (weitere Abrabungsgewässer mit aktuellen Vorkommen) wird vorgeschlagen.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mäh	Weitere Kartierungen
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Erhöhter Monitoring-Bedarf
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	

- Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
- Schutzvertragliche Regelung der Freizeitnutzung (Baden, Campieren, Angeln) erforderlich, kein Fischbesatz!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
• Eines der bedeutendsten, individuenreichsten Vorkommen im Raum Magdeburg.	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchfünke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Heinrichsberg – Großer Synder

Lage

MTBQ 3736-14
GK-R 4480687
GK-H 5793346



OK – 204

1. Allgemeine Angaben

Lage: 1 km westl. Heinrichsberg
D 09 / Ohreniederung
Ohrekreis

2. Vorkommen

Aktuell x
Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lei = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-Klasse II

Anzahl Rufer 6

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp: E

Gewässerfläche: < 1 000 m² x 5 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Biotoptyp: AN3

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschatung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Acker, Grünland, Gehölz

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchfünke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung x
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag x
Intensivmäh

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

x?

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG x FND x GLB FFH § 30-Biotop x

FND00300K_ „Großer Synder“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützstellung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerschonung bei Mähd
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Partieller Gehölzrückschnitt und teilweise Zurückdrängung des Schilfs macht sich mittel-
fristig erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleines, hinsichtlich Lage und Naturraum bedeutendes Vorkommen im Ohrekreis.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

223

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:


Zielitz – Fauler See

OK – 489

Lage

MTBQ 3736 11
GK-R 4478540
GK-H 5794189





1. Allgemeine Angaben

Lage: 1 km südlich Zielitz

NHE/Naturraum: D 09 / Ohreniederung

Landkreis: Ohrekreis

2. Vorkommen

Aktuell: x

Nicht bestätigt:

Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse: 1

Anzahl Rüfer: 5

Reproduktions-Nachweis:

Bemerkungen:

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Gewässerfläche: < 1 000 m² x

Biotoptyp: FN1

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 % x

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Rindenweide, Acker, Grünland

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung x Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung: Laubeintrag Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung x Isolation x?

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG FND x GLB FFF §-30-Biotop x

z.T. FND0048OK_„Altwasser Fauler See“ (5 ha)

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFF

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen x Sicherung von Wanderwegen

Gewässerauskopplung bei Beweidung xx Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Auskoppeln der Gewässer und flach überstauten Wiesen bei Beweidung dringend erforderlich;

Einrichtung von Pufferzonen gegen die Ackerflächen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleines, hinsichtlich Lage und Naturraum bedeutendes Vorkommen im Ohrekreis.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Moorfrosch (Rana arvalis)

224


Bezeichnung:

Schartau – Gösselwahl

JL - 393

Lage	MTBO	GK-R	GK-H
------	------	------	------

3736-21
4484691
5793907



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,2 km südwestl. Schartau
NHE/Naturraum: D 09 / Tängermünder Elbetal
Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x		2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	5	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	C	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	x	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	FA1	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %	
		Beschattung:	0 %	< 50 %	> 50 %	
				x	x	

5. Nutzungen

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffentzüge, Hypertrophierung		Fischbesatz/Angeln	
Verlandung, Sukzession	x	Deichbau/Deichsanierung	
Vermüllung, Vorfüllen		Bebauung	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung, Laubentrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überbeladung		Isolation	x?

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☐	FND	☐	GLB	☐	FFH	☐	\$-30-Biotop	☐	x
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	--------------	--------------------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSC	FND	GLB	FFH
			x	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschwellung		
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen		
Gewässerauskopplung bei Beweidung		
punktielle Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	(x)	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		x
Uferbepflanzung	x	
Uferrenaturierung (Profil)		
Sicherung von Wandenwegen		
Sicherung der Wassernahrung		
Weitere Kartierungen		
Erhöhter Monitoring-Bedarf		x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Zurückdrängung des Schilfs mittel- bis langfristig erforderlich.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleines, hinsichtlich der Lage bedeutendes Vorkommen im Kreis Jerichower Land.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Elbdeich bei Schartau I

Bezeichnung:
JL – 060

Lage
MTBQ 3636-44
GK-R 4485918
GK-H 5798390



1. Allgemeine Angaben

Lage: 3 km nördl. Schartau
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermündener Elbetal
Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell: x
Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- nachweis	Bemerkungen
I	5		

4. Lebensraum

Strukturtyp: D
Biototyp: FN31

Gewässerfläche: x
< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²
Vegetation (DG): x
0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschatung: x
0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland, Elbdeich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschatung: Laubeintrag
Überweidung
Weitere Anmerkungen:
• gegenwärtig kaum beeinträchtigt

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐
• Ausweisung des geplanten NSG „Eibauen von Ringfurth“

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung x Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze x Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung Sicherung der Wasserhaltung x
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
• Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Kleines Vorkommen im südlichen Kreis Jerichower Land mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Bezeichnung:

Elbdeich bei Schartau II

JL – 061

Lage

MTBQ 3636-44
GK-R 4486382
GK-H 5798922



1. Allgemeine Angaben

Lage:	3,5 km nördl. Schartau	Vorkommen	
NHE/Naturraum:	D 09 / Tangermünder Elbetal	Aktuell	Nicht bestätigt
Landkreis:	Jerichower Land	x	2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Reproduktions- Nachweis		Bemerkungen
	Anzahl	Rüfer	
I	5		

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	FN31		x		
		Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
			x		
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
			x		

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Grünland, Elbdeich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung	Isolation

Weitere Anmerkungen:

- gegenwärtig kaum beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	x	FND	GLB	FFH	x	§-30-Biotop	x
-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	x	LSG	FND	GLB	FFH
-----	---	-----	-----	-----	-----

- Ausweisung des geplanten NSG „Elbauen von Ringfurth“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	x	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschneisen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung		Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleines Vorkommen im südlichen Kreis Jerichower Land mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:


Blumenthal – Überflutungsau

JL – 059

Lage

3636-42
4487911
5799676





1. Allgemeine Angaben

Lage:1.2 km nordwestl. Blumenthal

NHE/Naturraum:D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis:Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenas

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

II

10

4. Lebensraum

Strukturtyp:

Biotoptyp:

A

FN31

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Weide-Grünland (Rinder), Elbdeich

6. Lebensraum

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

0-25 %

0 %

≤ 5 000 m²

26-75 %

≤ 50 %

> 5 000 m²

76-100 %

> 50 %

x

x

x

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:


Blumenthal – Überflutungsau

JL – 059

Lage

3636-42
4487911
5799676





1. Allgemeine Angaben

Lage:1.2 km nordwestl. Blumenthal

NHE/Naturraum:D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis:Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenas

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

II

10

4. Lebensraum

Strukturtyp:

Biotoptyp:

A

FN31

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Weide-Grünland (Rinder), Elbdeich

6. Lebensraum

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

0-25 %

0 %

≤ 5 000 m²

26-75 %

≤ 50 %

> 5 000 m²

76-100 %

> 50 %

x

x

x

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

Blumenthal – Überflutungsau

JL – 059

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

xx

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

• Ausweisung des geplanten NSG „Elbauen von Ringfurth“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktuale Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

xx

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Gewässer bei Beweidung künftig unbedingt auskoppeln!

• Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Kleinere Vorkommen in der Überflutungsau mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Kreuzkröte

(Bufo calamita)

228

Bezeichnung:
Blumenthal – Ehemalige Ziegleiteiche
JL – 062

Lage

MTBQ 3637-31

GK-R 4480065

GK-H 5799185



6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Vertüfen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

(x) Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

•

Unbedingt Erweiterung des geplanten NSG gNSG0167M_ „Elbauen von Ringfurth“ und Erweiterung des FFH-Gebietes DE3637301 „Elbaue bei Bertlingen“!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzteilung

xx

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

x

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonschneisen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

(x)

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

•

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (ehemalige Ziegleiteiche in der Quallwasserzone).

•

Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

•

Eines der bedeutendsten und individuenreichsten Vorkommen im Kreis Jerichower Land.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)

Bezeichnung:
Blumenthal – Ehemalige Ziegleiteiche
JL – 062

Lage

MTBQ 3637-31

GK-R 4480065

GK-H 5799185



1. Allgemeine Angaben

Lage:

Nördl. OT Blumenthal

NHIE/Naturraum:

D 09 / Tangermünde/Elbetal

Landkreis:

Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-3; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionschweise: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeitsklasse

III

Anzahl Rufer

50

Reproduktions-Nachweis

Lai

Bemerkungen

-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

E

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

FA1

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Siedlung, Grünland, Elbdeich

229

Bezeichnung:

Parchauer Überflutungsau

JL - 327

Lage

MTBQ	3637-31
GK-R	4490435
GK-H	5799748



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,5 km nordwestl. Parchau
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbe
Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x		2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

[illegible]

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
				x	
Biotoptyp:	FN4	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
				x	
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
			x		

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:
 Grünland, Elbdeich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wandervegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☒	FND	☐	GLB	☐	FFH	☒	§-30-Biotop	☒
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ x LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ x

- Ausweisung des geplanten NSG gNSG0167M: „Elbauen von Ringfurth“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzatzelung	Uferbefanzung
Novellierungbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktuell Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Weiterer Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungs- und Deichbaudynamik der Elbe;
Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

3. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleinere Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund. Sehr elbnahe Ruf-/Laichgewässer in der Überflutungsau.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Elbdeich Parchau I

Lage

MTBQ 3637-31
GK-R 4490833
GK-H 5798809

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung

xx

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

• Erweiterung des geplanten NSG gNSG0167M „Elbauen von Ringfurth“ und Erweiterung des FFH-Gebietes DE3637301 „Elbaue bei Beringen“ auch auf innerdeichs gelegene Gewässer!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützteilung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx

x

xx

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Die Umwandlung der gewässernahen Ackerflächen in Grünland ist unbedingt anzustreben;

• Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Relativ individuenreiches, innerdeichs gelegenes Vorkommen mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund. Gefährdet durch landwirtschaftliche Intensivnutzung (Ackerbau).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt


ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Elbdeich Parchau I

Lage

MTBQ 3637-31
GK-R 4490833
GK-H 5798809

JL – 328



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,3 km nordwestl. Parchau

NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larv; Ju = Juvenies

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rüfer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

II

15

-

4. Lebensraum

Strukturtyp: B

Biototyp: FN3

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:


Acker, schmaler Grünlandstreifen

231

Bezeichnung:
Elbdeich Parchau II

JL – 330

Lage
MTBQ 363731
GK-R 4491380
GK-H 5800098



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,2 km nordwestl. Parchau
NHE/Maturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal
Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell: x
Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse: II
Anzahl Rufer: 20
Reproduktions-Nachweis: -
Bemerkungen: -

4. Lebensraum

Strukturtyp: A
Biotoptyp: FN3
Gewässerfläche: < 1 000 m² x
Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Acker, Gehölz
Nutzungen Umland: -

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung: Laubeintrag
Überweidung

xx
x

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ § 30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

• Erweiterung des geplanten NSG qNSG0167M „Elbauen von Ringfurh“ und Erweiterung des FFH-Gebietes DE3637301 „Ebaue bei Bertingen“ auch auf innerdeichs gelegene Gewässer!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützstellung
Novellerungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerauskopplung bei Beweidung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx
x
xx
xx
x
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes in der Qualmwasserzone);

• Die Umwandlung der gewässernahen Ackerflächen in Grünland ist unbedingt anzustreben!

• Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Relativ individuenreiches, innerdeichs gelegenes Vorkommen mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund. Gefährdet durch landwirtschaftliche Intensivnutzung (Ackerbau).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (*Rana arvalis*)

232

Bezeichnung:

Elbdeich Parchau III

JL - 214

Lage	MTBQ	GK-R	GK-H
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

3637-32
4492048
5800375



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,5 km nördl. Parchau
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder
Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
x			2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
III	45		

4. Lebensraum

Strukturtyp:	B
Gewässerfläche:	< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² x
Biotoptyp:	FN3
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 % x
Beschattung:	0 % ≤ 50 % > 50 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

Acker (2001: Getreide, Raps)

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☒	END	☐	GLB	☐	FFH	☐	& 30-Biotop	☒
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	x	LSG		FND		GLB		FFH	x
-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	---

- Erweiterung des geplanten NSG gNSG0167M_ „Elbauen von Ringfurth“ und Erweiterung des FFH-Gebietes DE3637301 „Elbaue bei Beringen“ auch auf innerdeichs gelegene Gewässer!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen:

Unterschutzstellung	xx	Uferbepflanzung	xx
Novellerungsbedarf der Schutzbietsgrenze	x	Uferrenaturierung (Profil)	
Ausgliederung von Gewässerschonsreifen	xx	Sicherung von Wanderwegen	x
Gewässerausklöpfung bei Beweidung		Sicherung der Wassernutzung	
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes in der Qualmwasserzone);
- Die Umwandlung der gewässernahen Ackerflächen in Grünland ist unbedingt anzustreben!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Relativ individuenreiches, innerdeichs gelegenes Vorkommen mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund. Gefährdet durch landwirtschaftliche Intensivnutzung (Ackerbau).



9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Kreuzkröte
(*Bufo calamita*)

Elbdeich Zerben

Lage

MTBO 3637-23
GK-R 4494922
GK-H 5803502



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	2 km nordwestl. Zerben	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 09 / Tangermündler Elbetal	x		2001
Landkreis:	Jerichower Land			

3. Aktueller Bestand		
Häufigkeits-	Anzahl Rufer	Reproduktions-
klasse	I	Nachweis
	2	

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung, Lai = Laich, Lar = Larven, Juv = Juveniles

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biototyp:	FN4
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
x	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Rinderweide

Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschädigte Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

• ¹ Gewässer war 2001 ausgekoppelt.

xx

Fischbesatz/Angeln

x

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

(x)¹

Isolation

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☐
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐
• Erweiterung des geplanten NSG gNSG0167M „Elbauen von Ringfurth“:	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	xx
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferbepflanzung
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Uferrenaturierung (Profil)
Gewässerauskopplung bei Beweidung	x
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	x
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Weitere Kartierungen
	Erhöhter Monitoring-Bedarf

- Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
 - Weiterhin Auskoppeln des Gewässers bei Beweidung und Einrichtung mind. 10 m breiter Gewässerrandstreifen zu Weideflächen!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleines Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund. Potentiell gefährdet durch landwirtschaftliche Intensivnutzung (Überweidung, Hypertrophierung).

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	xx	Deichbau/Deichsanierung
Vernullung, Verfüllen		Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	(x)	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG		LSG	x	FND		GLB		FFH		§-30-Biotop	x
-----	--	-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	-------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	x	LSG		FND		GLB		FFH	x
-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	---

- Erweiterung des geplanten NSG gNSG0167M „Elbauen von Ringfurth“ und Erweiterung des FFH-Gebietes DE3637301 „Elbaue bei Bertingen“ auch auf innerdeichs gelegene Gewässer!

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	xx	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschreinen	xx	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung		Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

- Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes in der Qualmwasserzone);
 - Die Umwandlung der gewässernahen Ackerflächen in Grünland ist unbedingt anzustreben!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


- Relativ individuenreiches, innerdeichs gelegenes Vorkommen mit hoher Bedeutung für den Populationsverbund. Gefährdet durch landwirtschaftliche Intensivnutzung und zunehmende Verlandung und Sukzession.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Unkenwäldchen Parey

3637-22
4497209
5605821

JL – 332



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,5 km nordwestl. Parey

NH-Naturraum: D 09 / Tangernieder Elbetal

Landkreis: Jernichower Land

2. Vorkommen

Aktuell	x	Nicht bestätigt	2001
---------	---	-----------------	------

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktionsnachweis	Bemerkungen
II	10	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	G
Biotoptyp:	FN32

Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
		x	
Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		x	
Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
			x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:


Acker, Gehölz

Bezeichnung:
Kehnert – Bertinger See

MTBQ 3637-31
GK-R 4490168
GK-H 5600190

Lage





1. Allgemeine Angaben

Lage: Westl. und südl. Kehnert

NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
I	5	-	

4. Lebensraum

Strukturtyp: B

Gewässerfläche: < 1 000 m² < 5 000 m² > 5 000 m²

x

Biotoptyp: FN1/FN3

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

x

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung: Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG x FND GLB FFH x §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG x LSG FND GLB FFH

Ausweisung des geplanten NSG gNSG0167M „Elbauen von Ringfurth“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschützstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wassernutzung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes).

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Offenbar kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

236


Bezeichnung:

Sandfurth Haken

SDL - 577

Lage	MTBQ	GK-R	GK-H
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

3637-14
4493444
5803591



1. Allgemeine Angaben

Lage: 0,5 km östl. Sandfurth
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünde
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

[illegible]

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	5	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	B	Gewässersfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
Biotyptyp:	FN1	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: 1. **Nutzungen Umland:** 2. **Grünland**

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung	Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG		LSG		FND		GLB		FFH	x	§-30-Biotop	x
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	---	-------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ x ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

- Ausweisung des geplanten NSG gNSG0167M_„Elbauen von Ringfurth“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	xx	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung		Sicherung der Wassernutzung
punktuell Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Reculierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:


- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes).

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Offenbar kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: **Klietznick/Jerichow – Alte Elbe** **JL – 241**



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1 km nordöstl. Klietznick

NHE/Naturraum: D 09 / Tangermündener Elbetal

Landkreis: Jerichower Land

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

1999

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp: B

Biotoptyp: FN1

Gewässerfläche:

Vegetation (DG):

Beschattung:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Badegewässer, Fischbesatz?

Grünland, Kiefernforst

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubentrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

x?

(x)

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☒ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbeplantzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes).

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Offenbar kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund. Nachweis erfolgte 1999 an einem Krötenzaun entlang der L54.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Moorfrosch (Rana arvalis)

238

Bezeichnung:
Elbdeich Schönhausen I

Lage

MTBQ 3437-24
GK-R 4499801
GK-H 5825746

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ § 30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzsteilung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerauskopplung bei Beweidung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbefestigung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes);


Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
SDL – 139



1. Allgemeine Angaben

Lage: 3 km südwestl. Schönhausen
NHE/Naturraum: D 09 / Tangernmünder Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell ☒ Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

II

10

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Biotoptyp: FN4

Gewässerfläche: ☒ < 1 000 m² ☒ 1 000 - 5 000 m² ☒ > 5 000 m²

Vegetation (DG): ☒ 0-25 % ☒ 26-75 % ☒ 76-100 %

Beschattung: ☒ 0 % ☒ ≤ 50 % ☒ > 50 %


5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland

Bezeichnung:
Elbdeich Schönhausen II

Lage
MTBQ 3438-11
GK-R 4500324
GKH 5827145

SDL – 409



1. Allgemeine Angaben

2. Vorkommen

Lage: 2 km westl. Schönhausen

NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis: Stendal

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung, Lai = Laich, Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl	Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
II	10	-	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Gewässerfläche: < 1 000 m² x 5 000 m² > 5 000 m²

Biotoptyp: FN4

Vegetation (DG): 0-25 % x 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % x ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Grünland

Nutzungen Umland:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Sicherung eines hohen Grundwasserstandes);
- Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

Park Schönhofen

Lage

3438-11	MTBQ
4502380	GK-R
5827850	GK-H



6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung Verlandung, Sukzession Vermüllung, Verfüllen Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen Beschattung; Laubeintrag Überweidung	Fischbesatz/Angeln Deichbau/Deichsanierung Bebauung Zerschneidung von Wanderwegen Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) Isolation
--	---

x?

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☐

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
-----	-----	-----	-----	-----

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellerungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktuell Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf
	xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Möglicherweise kleines, nicht regelmäßig nachzuweisendes Vorkommen, weitere Überprüfungen sind erforderlich.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

Park Schönhofen

Lage

3438-11	MTBQ
4502380	GK-R
5827850	GK-H



1. Allgemeine Angaben

Lage: Westl. Ortslage Schönhausen
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
	X	1999

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufe	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
100	100		

4. Lebensraum

Strukturtyp:

[illegible]

Biotyp:

Vegetation (DG):

Beschattung:

[illegible]

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Parkanlage, Siedlung


Bezeichnung:

Hämerten

SDL - 529

Lage

MTBQ	3437-22
GK-R	4498879
GK-H	5827675



1. Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	0,9 km süd. Hamerten	Aktuell	Nicht bestätigt
NHE/Naturraum:	D 09 / Tangermünder Elbetal	x	2001
Landkreis:	Stendal		

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rüfer	Reproduktions-Nachwels	Bemerkungen
I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100			
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100			
Paar = Paarung; Lal = Lach; Lar = Larven; Juv = Juveniles			

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A			
		Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²
			x	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	FN3	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %
			x	76-100 %
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %
			x	> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wandervegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung	Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☐	FND	☐	GLB	☐	FFH	☒	§-30-Biotop	☒
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	FND	GLB	FFH
-----	-----	-----	-----	-----

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Überbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschutzstreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerausokkuplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Hohengöhren I

Lage

3338-33

4501357

5831704

SDL – 210

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,2 km WNW Hohengöhren

NHE/Naturraum:

D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Lach; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis	Bemerkungen
II	10	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

Biotoptyp:

FN4

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Deich

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§ 30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

(x)

GLB

(x)

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung

x

Novellierungsbedarf der Schutzbietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonsreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktuale Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

x

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

243

Bezeichnung:
Hohengöhren II

Bezeichnung:
SDL – 211

Lage
MTBQ 3338-31
GK-R 4501042
GK-H 5832655



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen	
Lage:	1,9 km NW Hohengöhren	Aktuell	Letztes
NHE/Naturraum:	D 09 / Tangemünder Elbetal	x	Nachweisjahr
Landkreis:	Stendal		2001

3. Aktueller Bestand	
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles	
Häufigkeitsklasse	Bemerkungen
Anzahl Rufer	
I	5

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biotoptyp:	FN4
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
< 5 000 m²	
> 5 000 m²	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
Beschattung:	
0 %	
< 50 %	
> 50 %	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Deich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG x FND GLB FFH x § 30-Biotop x
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG FND GLB FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonsreifen	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktuale Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres Vorkommen mit Bedeutung für den Populationsverbund.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

Neuermark-Lübars I



SDL – 290

Lage

33336-31

4501400

5833630



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	NHZ/Naturraum:	Landkreis:	Aktuell	Letztes
				Nachweisjahr
	D 09 / Tangermünder Elbetal	Stendal	x	2001

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larve; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeits- klasse	Anzahl Rüfer	Bemerkungen
III	30	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A / C
Biotoptyp:	FN4/FN32
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Grünland, Deich, z.T. Garten, Siedlung

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x
Vermüllung, Verfüllen	Deichbau/Deichsanierung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Bebauung
Beschattung, Laubeintrag	x
Überweidung	Zerschneidung von Wanderwegen
	Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)
	Isolation
Weitere Anmerkungen:	

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG
x	FND
	GLB
	FFH
	(x)
	§ 30-Biotop
	x
• nur außerhalb gelegene Flächen im FFH-Gebiet	
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG
	FND
	GLB
	FFH
	x
• Erweiterung des FFH-Gebietes DE338302 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ auf innerorts gelegene Vorkommensbereiche.	

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschutzstellung	x
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x
Ausgliederung von Gewässerschonschreife	Uferbepflanzung
Gewässerausklöpfung bei Beweidung	Uferrenaturierung (Profil)
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	Sicherung von Wanderwegen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Sicherung der Wasserhaltung
	Weitere Kartierungen
	x
	Erhöhter Monitoring-Bedarf
	(x)

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:	
• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;	
• Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;	

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
• Individuenreiches und bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal.	

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robbauchunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Neuermark-Lübars II

3338-31

4501360

5834380

Lage

MTBQ

GK-R

GK-H





1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,3 km W Neuermark-Lübars

NHE/Naturraum:

D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-

Anzahl

Rufer

Reproduktions-

Nachweis

II

20

-

-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / D

Biotoptyp:

FN4/FN32

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Angelgewässer ?

Nutzungen Umland:

Grünland, Deich, z.T. Garten, Siedlung

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robbauchunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

nur außerhalb gelegene Flächen im FFH-Gebiet

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Erweiterung des FFH-Gebietes DE3238302 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ auf innerdeichs gelegene Vorkommensbereiche.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Relativ individuenreiches und bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


246

Bezeichnung:

Neuermark-Lübars III

Lage

MTBQ 3338-13
GK-R 4501433
GK-H 5836385



SDL – 289



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,6 km NW Neuermark-Lübars
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell Nicht bestätigt Letztes
x Nachweisjahr
2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5, II = 6-20, III = 21-50, IV = 51-100, V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- nachweis		Bemerkungen
		Nachweis	Nachweis	
II	10			

4. Lebensraum

Strukturtyp:	A	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	FN4	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland, Deich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung		Fischbesatz/Angeln	
Verlandung, Sukzession	x	Deichbau/Deichsanierung	(x)
Vermüllung, Verfüllen		Bebauung	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	x	Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung; Laubeintrag		Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überweidung		Isolation	

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ § 30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschreife	Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


- Relativ individuenreiches und bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Bezeichnung:
Scharlibbe

Lage

3338-11
GK-R
4501993
5840265
GK-H



SDL – 391



1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,8 km westl. Scharlibbe

NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell: x

Nicht bestätigt: -

Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Jüvones

Häufigkeitsklasse: II

Anzahl Rufer: 10

Bemerkungen: -

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Biotoptyp: FN31

Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Grünland, Deich

Nutzungen Umland: -

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG x FND GLB FFH §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH x

• ggf. Erweiterung FFH-Gebietes DE3238302 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ auf innerdeichs gelegene Vorkommensbereiche.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

(x) Uferbepflanzung

(x) Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wassererhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Langfristig unbedingte Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

-

248

Bezeichnung:

Schönfeld

Lage

MTBQ	3238-32
GK-R	4503595
GK-H	5845369



1. Allgemeine Angaben

Label:

1,8 km NNW Schönfeld

Lage:
NHE/Naturraum:
Landkreis:
D 09 / Tat:
Stendal

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Paar = Paarung; Lal = Lailah, Lal - Lavetl, Juv - Juvenes

Häufigkeits- : Anzahl Rufer

Reproduktions-
Bemerkungen

11

၈

4. Lebensraum

Strukturtyp: A / D

A / D

Biotoptyp:

4/FN31

Gewässerfläche:	< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²		
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 %		
Beschattung:	0 % ≤ 50 % > 50 %		

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Rindenweide, Deich, innerdeichs Gehölz und Kiefernforst

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession		Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen		Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	x	Zerschneidung von Wäldern
Beschattung; Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Camping)
Überweidung	xx	Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG		LSG	x	FND		GLB		FFH	x	SS-30-Biotop	x
-----	--	-----	---	-----	--	-----	--	-----	---	--------------	---

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSG	END	GLB	FFH
-----	-----	-----	-----	-----

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	Überbepflanzung
Novallierungsbadar der Schutzgebietsgrenze	Uferrenauration (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	x Sicherung von Wandenwege
Gewässerausokuplung bei Beweidung	xx Sicherung der Wassermatten
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Requirung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Unbedingt Auskoppeln bei Beweidung und Einrichtung mind. 10 m breiter Pufferzonen zu Weideflächen (Gewässer außerhalb);
- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleinere, für den Populationsverbund bedeutende Vorkommen im Tangermünder Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Elbdeich Wulkau I

SDL – 478

Lage

MTBQ


3238-14

GK-R

4503554

GK-H

5846800

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,4 km südwestl. Wulkau

NHE/Naturraum:

D 09 / Tangermünder Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeitsklasse

II

Anzahl Rufer

10

Reproduktions-Nachweis

-

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

D

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

x

Beschattung:

0 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Laubwald, Deich

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

(x)

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung: Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

(x)

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

• gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

x

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung;

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal. Durch Gehölzgürtel relativ gut geschützt.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

250


Bezeichnung:

Elbdeich Wulkau II

SDL - 479

Lage

MTBQ	3238-14
GK-R	4502867
GK-H	5847783



1. Allgemeine Angaben		2. Vorkommen		Letztes Nachweisjahr	
Lage:	NHE/Naturraum:	Aktuell	Nicht bestätigt	Aktuell	2001
1,7 km WNW Wulkau	D 09 / Werbener Eibetal				
Stendal					

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rur	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
II	15	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	C				
Gewässerfläche:	<table><tr><td>< 1 000 m²</td><td>x</td><td>≤ 5 000 m²</td><td>> 5 000 m²</td></tr></table>	< 1 000 m ²	x	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
< 1 000 m ²	x	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²		
Biotoptyp:	FN4				
Vegetation (DG):	<table><tr><td>0-25 %</td><td>26-75 %</td><td>76-100 %</td></tr></table>	0-25 %	26-75 %	76-100 %	
0-25 %	26-75 %	76-100 %			
Beschattung:	<table><tr><td>0 %</td><td>≤ 50 %</td><td>> 50 %</td></tr></table>	0 %	≤ 50 %	> 50 %	
0 %	≤ 50 %	> 50 %			

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	x	Fischbesatz/Angeln	(x)
Verlandung, Sukzession	x	Deichbau/Deichsanierung	
Vermüllung, Verfüllen		Bebauung	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überverbildung		Isolation	

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☒	FND	☐	GLB	☐	FFH	☒	\$-30-Biotop	☒
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	LSC	FND	GLB	FFH
-----	-----	-----	-----	-----

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen	xx
Gewässerausklöpfung bei Beweidung	
punktuellte Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	
Erhöhter Monitoring-Bedarf	x
Uferbepflanzung	
Uferrenaturierung (Profil)	
Sicherung von Wanderwegen	
Sicherung der Wasserhaltung	
Weitere Kartierungen	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Einrichtung von mind. 10 m breiten Pufferzonen (Grünland/Stauden/Gehölzstreifen) gegen die Ackerflächen dringend erforderlich, ggf. Anlage von Gehölzriegeln;
- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!


8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleinere, für den Populationsverbund bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal. Gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung (Ackerbau)

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: **AltENZAUN**

Lage: 3238-31
GK-R 4502178
GK-H 5845741



1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	Nordöstl. Ortslage AltENZAUN	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 09 / Tangermünder Elbetal	x		2001
Landkreis:	Stendal			

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Reproduktions-Nachweis
II	20	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Gewässerfläche:	< 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²
Biotoptyp:	FN4
Vegetation (DG):	0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung:	0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Acker, Elbdeich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung	
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Verfüllen	Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen	Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag	Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung	Isolation
Weitere Anmerkungen:	

7. Schutz	
Aktueller Schutzstatus:	
NSG	LSG x FND GLB x §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):	
NSG	LSG FND GLB FFH
Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen	
Unterschützstellung	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonschreiftren	xx Sicherung von Wanderwegen
Gewässerauskopplung bei Beweidung	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation	Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz	Erhöhter Monitoring-Bedarf

- Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
- Einrichtung von mind. 10 m breiten Pufferzonen (Grünland-/Stauden-/Gehölzstreifen) gegen die Ackerflächen dringend erforderlich, ggf. Anlage von Gehölzriegeln;
 - Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
 - Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen	
	Für den Populationsverbund bedeutende Vorkommen im Tangermünder Elbetal. Gefährdet durch angrenzende landwirtschaftliche Intensivnutzung (Ackerbau)

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien	

Bezeichnung:
Osterholz

Lage

MTBQ 3238-13
GK-R 4501888
GK-H 5846908

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

(x)

(x)

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Babauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

- aktuell wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

- geplantes LSG „Atmürkische Wische“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

x

Sicherung der Wassererhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Langfristig unbedingte Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen/Deichunterhaltung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
SDL – 318

Lage

MTBQ 3238-13
GK-R 4501888
GK-H 5846908

1. Allgemeine Angaben

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

x

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; La = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeitsklasse

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

IV

60

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / C

Biototyp:

FN4/FN32

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Mähd-Grünland, Gehölze, Siedlung, Elbdeich

Nutzungen Umland:

Gewässerfläche:	< 1 000 m²	≤ 5 000 m²	> 5 000 m²
	x		
Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
	x		
Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
	x		

253


Bezeichnung:

Feldweiher Osterholz

Lage

MTBQ	3238-31
GK-R	4501704
GK-H	5845986

SDL - 320



1. Allgemeine Angaben

Lage: 0,5 km SSW Osterholz
NHE/Naturraum: D 09 / Tangermünder Elbetal
Landkreis: Stendal

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenes

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
5	1		
6	1		
7	1		
8	1		
9	1		
10	1		
11	1		
12	1		
13	1		
14	1		
15	1		
16	1		
17	1		
18	1		
19	1		
20	1		
21	1		
22	1		
23	1		
24	1		
25	1		
26	1		
27	1		
28	1		
29	1		
30	1		
31	1		
32	1		
33	1		
34	1		
35	1		
36	1		
37	1		
38	1		
39	1		
40	1		
41	1		
42	1		
43	1		
44	1		
45	1		
46	1		
47	1		
48	1		
49	1		
50	1		
51	1		
52	1		
53	1		
54	1		
55	1		
56	1		
57	1		
58	1		
59	1		
60	1		
61	1		
62	1		
63	1		
64	1		
65	1		
66	1		
67	1		
68	1		
69	1		
70	1		
71	1		
72	1		
73	1		
74	1		
75	1		
76	1		
77	1		
78	1		
79	1		
80	1		
81	1		
82	1		
83	1		
84	1		
85	1		
86	1		
87	1		
88	1		
89	1		
90	1		
91	1		
92	1		
93	1		
94	1		
95	1		
96	1		
97	1		
98	1		
99	1		
100	1		

4. Lebensraum

Strukturtyp:	B	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
			x		
Biotoptyp:	FN3	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
				x	
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %
				x	

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	xx	Fischbesatz/Angeln
Verlandung, Sukzession	x	Deichbau/Deichsanierung
Vermüllung, Vüllen		Bebauung
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Überweidung		Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	LSG	FND	GLB	FFH	§-30-Biotop	x
-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---

- geplantes LSG „Altmärkische Wische“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH x

- Erweiterung des FFH-Gebietes DE3238302 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ auf innerdeichs gelegene Vorkommensbereiche.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzstellung	
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze	x
Ausgliederung von Gewässerschonsreifen	
Gewässerakouplung bei Beweidung	x
punktuellc Bcsctigung v. Röhricht/Ufervegetation	
Bcsctigung/Regulierung von Fischbesatz	x
Uferbeflanzung	xx
Ufernaturierung (Profil)	x
Sicherung von Wanderwegen	
Sicherung der Wasserhaltung	x
Weitere Kartierungen	
Erhöhter Monitoring-Bedarf	

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Einrichtung von mind. 10 m breiten Pufferzonen (Grünland-/Stauden-/Gebölzstreifen) gegen die Ackerflächen dringend erforderlich, ggf. Anlage von Gehölzriegeln, v.a. am Westrand der Gewässersenke (Hanglage).
- Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Gewährleistung hoher Grundwasserstände).

3. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Individuenreiches, bedeutendes Vorkommen im Tangermünder Elbetal. Stark gefährdet durch intensiven Ackerbau.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe


Bezeichnung:
Elbdeich Sandauer Wald I

Lage

MTBQ 3138-32
GK-R 4503109
GK-H 5855106



SDL – 175



1. Allgemeine Angaben

Lage: 2 km westl. Havelberg
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell x
Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larve; Juv = Juveniles

Häufigkeits-
klasse

III

Anzahl Rufer

30

Reproduktions-
nachweis

-

4. Lebensraum

Strukturtyp: A / G

Biotoptyp: FN4/FN32

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Grünland, Laubwald, Deich

Nutzungen Umland:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung (x)
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung (x)
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Gesamtes Vorkommensgebiet nördlich Sandau bis zum Schleusenkanal Havelberg im Norden ist schutzwürdig als NSG. Ggf. auch Nord- und West-Erweiterung des geplanten NSG „Tonabgraben Havelberg-Sandau“ (gNSG0192M.)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzstellung x
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonschreife
Gewässerauskopplung bei Beweidung
punktierte Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Raum Havelberg.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


255

Bezeichnung:
Qualmwasser Rosenhof

Lage
3238-11
4501780
5849077



SDL – 375



1. Allgemeine Angaben

Lage:
1,3 km nördl. OT Rosenhof

NHE/Naturraum:
D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:
Stendal

2. Vorkommen

Aktuell
x

Nicht bestätigt

Letztes
Nachweisjahr
2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenes

Häufigkeits-
klasse
III

Anzahl Rufer
50

Reproduktions-
nachweis
-

Bemerkungen
- ca. 1,3 km lange Gewässerkette

4. Lebensraum

Strukturtyp:
C

Biotoptyp:
FN4

Gewässerfläche:
x

Vegetation (DG):
0-25 %
x

Beschattung:
0 %
x

< 1 000 m²
x

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Grünland, Deich, Gehölz

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Überweidung

(x)

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG
x

LSG
x

FND
x

GLB
x

FFH
x

§-30-Biotop
x

geplantes LSG „Altmärkische Wische“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG
x

LSG
x

FND
x

GLB
x

FFH
x

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerauskopplung bei Beweidung
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung der Überflutungsdynamik der Elbe (Gewährleistung hoher Grundwasserstände);

Deichrückverlegung möglich ?

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Tangermünder Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Moorfrosch
(Rana arvalis)

256

Bezeichnung:
Elbdeich Sandauer Wald II

MTBQ 3138-33
GK-R 4502235
GK-H 5852534



SDL – 181


1. Allgemeine Angaben

Lage: 2 km NNW Sandau
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

2001

3. Aktueller Bestand

Häufigkeits-klasse

Anzahl

Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

V

120

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A/B/G

Biotoptyp:

FN4/FN32

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Laubwald, Deich

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robbauchunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

• gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

x

LSG

FND

GLB

FFH

• Gesamtes Vorkommensgebiet nördlich Sandau bis zum Schleusenkanal Havelberg im Norden ist schutzwürdig als NSG. Ggf. auch Nord- und West-Erweiterung des geplanten NSG „Tonabgrabungen Havelberg-Sandau“ (gNSG0192M.)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Gewässerauskopplung bei Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

xx

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Maximale Schonung der Biotope bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Raum Havelberg mit naturnahen, wenig beeinträchtigten Quellwasserbiotopen und Vorkommen in der Überflutungsau.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)


Bezeichnung:

Elbdeich Sandauer Wald III

SDL - 183

Laque

MTBQ	3138-33
GK-R	4502384
GK-H	5853212



1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,5 km nördl. Sandau
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

tuell	Nicht bestätigt	Leztes Nachweisjahr
x		2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Ruter	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
III	25	-	-

4. Lebensraum

Strukturtyp:	D/G	Gewässerfläche:	
		< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²
			> 5 000 m ²
			x
Biotoptyp:	FN32	Vegetation (DG):	
		0-25 %	26-75 %
			76-100 %
			x
		Beschattung:	
		0 %	≤ 50 %
			> 50 %
			x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
S. 171-172 und 180-181

Nutzungen Umland:
S. 171-172 und 180-181

Nutzungen Grünland, Laubwald, Deich
S. 171-172 und 180-181

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung	(x)	Fischbesatz/Angeln	(x)
Verdünnung, Sukzession		Deichbau/Deichsanierung	
Umwelt, Verfüllen		Bebauung	
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen		Zerschneidung von Wanderwegen	
Beschattung, Laubeintrag		Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)	
Überverdünnung		Isolation	

Weitere Anmerkungen:

- gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG	☐	LSG	☒	FND	☐	GLB	☐	FFH	☐	§-30-Biotop	☒
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG	x	LSG		FND		GLB		FFH	x
-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	---

- Gesamtes Vorkommensgebiet nördlich Sandau bis zum Schleusenkanal Havelberg im Norden ist schutzwürdig als NSG, Ggf. auch Nord- und West-Erweiterung des geplanten NSG „Tonabgraben Havelberg-Sandau“ (gNSG0192M.).
- Einbeziehung des nördlichen Sandauer Waldes in FFH-Gebiet 3138301 „Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung	xx	Uferbepflanzung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerausokkuplung bei Beweidung	x	Sicherung der Wasserhaltung
punktueller Beseitigung v. Rohricht/Untervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Maximale Schonung der Biotop bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Raum Havelberg mit naturnahen, wenig beeinträchtigten Quellwasserbiotopen mit angrenzenden Waldlebensräumen und Vorkommen in der Überflutungsau.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch
(*Rana arvalis*)

Bezeichnung:


Deichvorland Sandau – Havelberg

SDL – 187

Lage

MTBQ 3138-33
GK-R 4502712
GK-H 5854339





1. Allgemeine Angaben			2. Vorkommen	
Lage:	2,4 km westl. Havelberg		Aktuell	Letztes Nachweisjahr
NHE/Naturraum:	D 09 / Werbener Elbetal		x	2001
Landkreis:	Stendal			

3. Aktueller Bestand		
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles		
Häufigkeitsklasse	Anzahl Rufer	Bemerkungen
III	25	

4. Lebensraum	
Strukturtyp:	A
Biotoptyp:	FN4
Gewässerfläche:	
< 1 000 m²	
≤ 5 000 m²	
> 5 000 m²	
x	
Vegetation (DG):	
0-25 %	
26-75 %	
76-100 %	
x	
Beschattung:	
0 %	
≤ 50 %	
> 50 %	
x	

5. Nutzungen	
Nutzungen Gewässer:	
Nutzungen Umland:	Grünland

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung; Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

- gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

- Gesamtes Vorkommensgebiet nördlich Sandau bis zum Schleusenkanal Havelberg im Norden ist schutzwürdig als NSG. Ggf. auch Nord- und West-Erweiterung des geplanten NSG „Tonabgrabbungen Havelberg-Sandau“ (GNSG0192IV.)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen		
Unterschutzzustellung		xx
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze		Uferrenaturierung (Profil)
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen		Sicherung von Wanderwegen
Gewässerschonung bei Mähd	x	Sicherung der Wassererhaltung
punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation		Weitere Kartierungen
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz		Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Individuenreiche, bedeutende Vorkommen im Raum Havelberg.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Bezeichnung:

Tonabgrabungen Sandau – Süd-Teil

SDL - 188

Page

MTBQ	3138-34
GK-R	4503354
GK-H	5853349



1. Allgemeine Angaben

	2001	Aktuell	Nicht bestätigt	Letztes Nachweisjahr
Lage:				
NHE/Naturraum:	2,5 km südwestl. Havelberg			
Landkreis:	D 09 / Werbener Elbetal	x		
	Stendal			

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits- klasse	Anzahl Rufer	Reproduktions- Nachweis	Bemerkungen
V	400	Lai	

4. Lebensraum

Strukturtyp:	C	Gewässerfläche:	< 1 000 m ²	≤ 5 000 m ²	> 5 000 m ²
Biotoptyp:	FA1	Vegetation (DG):	0-25 %	26-75 %	76-100 %
		Beschattung:	0 %	≤ 50 %	> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Nutzungen Umland:
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Grundland

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nährstoffentzüge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasseraustausch, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubentrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überwidelung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

- gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| NSG | ☐ | LSG | ☒ | FND | ☐ | GLB | ☐ | FFH | ☒ | \$-30-Biotop | ☒ |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| NSG | x | LSG | FND | GLB | FFH |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|

- Ausweisung des geplanten NSG „Tonabbauungen Havelberg-Sandau“ (qNSG0192M)

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|--|----|-----------------------------|
| Unterschutzstellung | xx | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzbiotopschranke | | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd | | Sicherung der Wassernutzung |
| punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation | | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungs-dynamik der Elbe;
- Langfristig ist die weitere Entwicklung der Sukzession und Verlandung zu beobachten, ggf. müssen partielle Entlandungen vorgenommen werden. Aktuell besteht jedoch kein Handlungsbedarf.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Eines der individuenreichsten und bedeutendsten Vorkommen im Werbener Elbetal und in Sachsen-Anhalt.


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

| | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| Kammolch | (<i>Triturus cristatus</i>) | (FFH-Anh. II) |
| Knoblauchkröte | (<i>Pelobates fuscus</i>) | |
| Moorfrosch | (<i>Rana anaxalis</i>) | |

Bezeichnung:

Tonabgrabungen Sandau – Nord-Teil

SDL – 190



| 1. Allgemeine Angaben | | | 2. Vorkommen | |
|--|----------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Lage: | 1,8 km südwestl. Havelberg | | Aktuell | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | | x | 2001 |
| Landkreis: | Stendal | | | |
| 3. Aktueller Bestand | | | | |
| Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenas | | | | |
| Häufigkeits- | Anzahl Rufer | Reproduktions- | Bemerkungen | |
| klasse | Nachweis | | | |
| III | 30 | | | |

| 4. Lebensraum | |
|--|-----|
| Strukturtyp: | A |
| Gewässerfläche: < 1 000 m² x 5 000 m² > 5 000 m² | |
| Biotoptyp: | FA1 |
| Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 % | |
| Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 % | |

| 5. Nutzungen | |
|---------------------|----------|
| Nutzungen Gewässer: | Grünland |
| Nutzungen Umland: | |

| 6. Beeinträchtigung/Gefährdung | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | (x) Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockentallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubeintrag | Freizeitmutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |
| Weitere Anmerkungen: | |
| • gegenwärtig wenig beeinträchtigt | |

| 7. Schutz | |
|--|--|
| Aktueller Schutzstatus: | |
| NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒ | |
| Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung): | |
| NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ | |
| • Ausweisung des geplanten NSG „Tonabgrabungen Havelberg-Sandau“ (gNSG0192M) | |

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | |
|---|-----------------------------|
| Unterschutzstellung | xx Uferbeplantzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

| Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen: | |
|--|--|
| • Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe; | |
| • Langfristig ist die weitere Entwicklung der Sukzession und Verlandung zu beobachten, ggf. müssen partielle Entlandungen vorgenommen werden. Aktuell besteht jedoch kein Handlungsbedarf. | |

| 8. Gesamtbewertung/Bemerkungen | |
|---|--|
| • Individuenreiches und bedeutendes Vorkommen im Werbener Elbetal, in enger Beziehung zu den südlich anschließenden Vorkommen der ehem. Tonabgrabungen (SDL-188). | |

| 9. Wertgebende Begleitarten Amphibien | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kammolch | (Triturus cristatus) (FFH-Anh. II) |
| Knoblauchkröte | (Pelobates fuscus) |
| Moorfrosch | (Rana arvalis) |


Bezeichnung:
Elbdeich Sandau

Lage

MTBQ 3238-12
GK-R 4502995
GK-H 5643697



SDL – 510



1. Allgemeine Angaben

Lage: 0.8 km SSW Sandau

NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse Anzahl Rüfer

I 5

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Biotoptyp: FN4

Gewässerfläche: < 1 000 m² x 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland, Deich

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Robbauchpunkte Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wassereintrag, Trockenfallen

Beschattung: Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

• gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG x FND GLB FFH x §-30-Biotop x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneisen

Gewässerschneidung bei Mahd

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;

• Maximale Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


• Kleineres Nebenvorkommen in Kontakt zu kopfstarken Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

264

Bezeichnung: **Havelberg – An der Schleuse**
SDL – 177

Lage
MTBQ 3138-32
GK-R 4503639
GK-H 5856729



6. Beeinträchtigung/Gefährdung
Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gasförer, Wasserhaushalt, Trockenfallen
Basthüter, Laubeintrag
Überweidung
Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation
Weitere Anmerkungen:
• gegenwärtig wenig beeinträchtigt

7. Schutz
Aktueller Schutzstatus:
NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ § 30-Biotop ☒
Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen
Unterschulsteilung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonschreife
Gewässerschöpfung bei Mahd
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz
Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf


Erklärungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik von Elbe und Havel.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen
• Relativ individuenreiche, bedeutende Vorkommen.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: **Havelberg – An der Schleuse**
SDL – 177

Lage
MTBQ 3138-32
GK-R 4503639
GK-H 5856729



1. Allgemeine Angaben
Lage: 2 km nordwestl. Havelberg
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal
2. Vorkommen
Aktuell ☒ Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand
Häufigkeitsklasse II Anzahl Rufer 20
Reproduktions-Nachweis
Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

4. Lebensraum
Strukturtyp: A
Biototyp: FN4
Gewässerfläche: ☐ < 1 000 m² ☒ 1 000 - 5 000 m² ☐ > 5 000 m²
Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %
Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %


5. Nutzungen
Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland

Bezeichnung:

Havelberg – Stremel und Pierengraben SDL – 193

Lage

MTBQ 3138-43
GK-R 4506996
GK-H 5653451



| 1. Allgemeine Angaben | | | 2. Vorkommen | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|
| Lage: | 2 km südöstl. Havelberg | | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Rhin-Havel-Luch | | x | | 2001 |
| Landkreis: | Stendal | | | | |

| 3. Aktueller Bestand | | |
|--|--------------|------------------------|
| Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles | | |
| Häufigkeitsklasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-Nachweis |
| IV | 100 | - |
| - ca. 100 Rufer südlich der Straße, am Stremel nur 1 rufendes Expl. (Mai 2001) | | |

| 4. Lebensraum | | |
|---------------|-----|--|
| Strukturtyp: | A | Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² x |
| Biotoptyp: | FN4 | Vegetation (DG): 0-25 % x 26-75 % 76-100 %
Beschatfung: 0 % ≤ 50 % > 50 % x |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland, z.T. Rinderweide

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschatfung, Laubeintrag
Überweidung
Weitere Anmerkungen:
(x)

Fischbesatz/Ängeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

- gegenwärtig wenig beeinträchtigt, zumindest potentiell gefährdet durch zu starke Beweidung

| 7. Schutz | | |
|--|-------|-----------------------------|
| Aktueller Schutzstatus: | | |
| NSG | LSG x | FND GLB FFH x §-30-Biotop x |
| Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung): | | |
| NSG x | LSG | FND GLB FFH |

- Süd-Ausdehnung des geplanten NSG „Untere Havel“ (gNSG0168M_) auf die wichtigsten Wiesenflächen südlich der Straße

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | | |
|---|----|-----------------------------|
| Unterschutzzustellung | xx | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | x | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | x | Sicherung von Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik von Elbe und Havel;
- Unbedingt flach überschwemmte Wiesenbereiche südlich der Straße auskoppeln bei Beweidung bzw. Belassen von Randstreifen bei Mahd!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Im Jahr 2001 das individuenreichste festgestellte Vorkommen im Rhin-Havel-Luch.
Dringend schutzbedürftig als NSG!

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana arvalis)

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☒

LSG ☒

FND ☐

GLB ☐

FFH ☒

§-30-Biotop ☒

• z.T. im NSG „Stramel“

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒

LSG ☐

FND ☐

GLB ☐

FFH ☐

• z.T. im geplanten NSG „Untere Havel“

Prioritäre Schutz- und Pflagemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzteilung

x

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

x

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonschreifen

x

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung

x

Sicherung der Wasserhaltung

punktuale Beseitigung v. Röhricht/UFervegetation

x

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Havel.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Vorkommen möglicherweise auch aktuell.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Vehlgast – Kümmernitz

Lage

MTBQ

3139-33

GK-R

4511530

GK-H

5852990

1. Allgemeine Angaben

Lage:

2 km WNW Vehlgast

NHE/Naturraum:

D 09 / Rhin-Havel-Luch

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

1997

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larv; Juv = Juvenies

Häufigkeits-Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

FN4

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland

Nutzungen Umland:

267

Berge – Nördliche Alte Elbe

SDL - 048

| | |
|------|---------|
| MTBQ | 3138-33 |
| GK-R | 4500702 |
| GK-H | 5853686 |



Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenes

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| II | 10 | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Strukturtyp: | E | Gewässerfläche: | < 1 000 m ² | ≤ 5 000 m ² | > 5 000 m ² |
| | | | x | | |
| Biotoptyp: | FN1 | Vegetation (DG): | 0-25 % | 26-75 % | 76-100 % |
| | | | | x | |
| | | Beschattung: | 0 % | < 50 % | > 50 % |
| | | | | x | |

[illegible]

ANHANG

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubentrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| NSG | ☒ | LSG | ☒ | FND | ☐ | GLB | ☐ | FFH | ☒ | \$ 30-Biotop | ☒ |
|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|

- Nur außerordentlich gelegener Fundpunkt im NSG „Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge“, im LSG „Aland-Elbe-Niederung“ und im FFH-Gebiet „Eibaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“.

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|-----|--|-----|--|-----|---|
| NSG | (x) | LSG | x | FND | | GLB | | FFH | x |
|-----|-----|-----|---|-----|--|-----|--|-----|---|

- z.T. im geplanten LSG „Altmärkische Wische“;
- Dringend Erweiterung des FFH-Gebietes „Elbaue Werben und Alte Elbe Kärnenberg“ auf innerorts gelegene Flächen.

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| Unterschutzzustellung | | x | Uferbeplanzung |
| Novellerungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | | x ¹ | Uferrenauiierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschutzstreifen | | x | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerrennung bei Mand / Beweidung | | | Sicherung der Wassernutzung |
| punktuellte Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | x | Weitere Kartierungen |
| Besetzung/Regulierung von Fischbesatz | | | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3138301 „Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberga“.

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungs-dynamik der Elbe;
- Maximale Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen;
- Ausweisung von Pufferzonen v.a. nord- und westwärts auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Bedeutende Vorkommen im südöstlichen Werbener Elbetal.


Knoblauchkröte
Moorfrosch

Bezeichnung:

Räbel – Qualmwasserzone I

SDL – 353

| | |
|------|---------|
| Lage | |
| MTBQ | 3138-31 |
| GK-R | 4501875 |
| GK-H | 5554899 |



| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1. Allgemeine Angaben | | 2. Vorkommen | |
| Lage: | 0,8 km SSW Räbel | Aktuell | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | 2001 |
| Landkreis: | Stendal | | |

| | |
|--|--------------|
| 3. Aktueller Bestand | |
| Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles | |
| Häufigkeitsklasse | Arzahl Rufer |
| Reproduktionsnachweis | Bemerkungen |
| IV | 40 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 4. Lebensraum | |
| Strukturtyp: | A / C |
| Gewässerfläche: | < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² |
| Biotoptyp: | FN4/FN31 |
| Vegetation (DG): | 0-25 % 26-75 % 76-100 % |
| Beschattung: | 0 % ≤ 50 % > 50 % |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 5. Nutzungen | |
| Nutzungen Gewässer: | |
| Nutzungen Umland: | Grünland, Deich, (Siedlung) |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 6. Beeinträchtigung/Gefährdung | |
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | (x) Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | (x) Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubentrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |
| Weitere Anmerkungen: | |
| • Sehr deichnah gelegen, durch Bau-/Sanierungsmaßnahmen stark gefährdet! | |

| | |
|---|-------------|
| 7. Schutz | |
| Aktueller Schutzstatus: | |
| NSG | LSG |
| FND | FND |
| GLB | GLB |
| FFH | §-30-Biotop |
| | x |
| Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung): | |
| NSG | LSG |
| x | FND |
| GLB | GLB |
| FFH | FFH |
| | x |
| • im geplanten LSG „Altmarkische Wische“: | |

| | |
|---|---|
| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | |
| Unterschutzstellung | xx Uferbepflanzung |
| Novellerungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | x ¹ Uferrenaturierung (Profit) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschutz bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

| | |
|--|--|
| Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen: | |
| • ¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3138301 „Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“; Vorkommen sind zudem schutzwürdig als NSG; | |
| • Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe; | |
| • Maximale Schonung der Gewässer bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen; | |
| • Ausweisung von Pufferzonen v.a. westwärts auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen. | |

| | |
|--|--|
| 8. Gesamtbewertung/Bemerkungen | |
| • Sehr bedeutende und individuenreiche Vorkommen im südöstlichen Werbener Elbetal. | |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 9. Wertgebende Begleitarten Amphibien | |
| Moorfrosch | (Rana arvalis) |

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Werben – Elbdeich

Lage

MTBQ 3138-13
GK-R 4500257
GK-H 5859042



Werden – Elbdeich

SDL – 566

1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,2 km östl. Werben

NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse II

Anzahl Rufer 15

Reproduktions-Nachweis -

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen. Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

4. Lebensraum

Strukturtyp: A

Gewässerfläche: < 1 000 m² x 5 000 m² > 5 000 m²

Biotoptyp: FN3

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 % x

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 % x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland, Deich

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschreifen

Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bedeutendes Vorkommen im Werbener Elbetal.

Bezeichnung:

Ortslage Werben I

Lage

| | |
|------|---------|
| MTBQ | 3137-24 |
| GK-R | 4499200 |
| GK-H | 5858777 |

SDL - 516



5. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | ✗ | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung: Laubeintrag | | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | | Isolation |

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☐

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| NSG | LSG | x | FND | GLB | FFH |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|

- geplantes LSG „Altmärkische Wische“.

1. Allgemeine Angaben

| | | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
|----------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Lage: | Östl. Ortsrand Werben | | | |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | | | |
| Landkreis: | Stendal | x | | 2001 |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufe | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 1 | - | - |

4. Lebensraum

| Strukturtyp: | H | Gewässerfläche: | X | |
|--------------|-----|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | < 1 000 m ² | 5 000 m ² | > 5 000 m ² |
| Biotoptyp: | FA2 | Vegetation (DG): | 0-25 % | 26-75 % |
| | | | X | 76-100 % |
| | | Beschattung: | 0 % | ≤ 50 % |
| | | | X | > 50 % |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland:
Grünland, Siedlung

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen im Werbener Elbetal, möglicherweise gefährdet durch ortsnahe Lage:


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Ortslage Werben II

Lage

MTBQ 3137-24
GK-R 4498726
GK-H 5868997

Ortslage Werben II



1. Allgemeine Angaben

Lage: Nördl. Ortsrand Werben

NHE/Maturraum: D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell: x

Letztes Nachweisjahr: 2001

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse: II

Anzahl Rufer: 10

Legende: Häufigkeitsklasse (H-K): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100. Individuum; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Larve; Juv = Juveniles

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp: C

Gewässerfläche: x

Biotyp: FN4

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Grünland, Siedlung

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung (x)

Verlandung, Sukzession, Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG LSG x FND GLB FFH x §-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG LSG FND GLB FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneidungen

Gewässerschneidung bei Mäh- / Beweidung

Punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;

Schonung der überschwemmten und nassen Wiesenbereiche vor Befahren, frühzeitiger Mäh- oder Beweidung!

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommen im Werbener Elbetal, möglicherweise gefährdet durch ortsnahe Lage.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

274

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

• Deichsanierung bereits 2001 realisiert.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschulzstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonstreifen

Sicherung von Wanderwegen

x

Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

x

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Erhöhter Monitoringbedarf nach Deichsanierung!

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Bedeutendes Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Werben – Neu Goldbeck I

SDL – 285

Lage

MTBQ

3137-24

GK-R

4497804

GK-H

5859727

1. Allgemeine Angaben

Lage:

1,3 km nordwestl. Werben

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

x

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lar = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

II

10

Anzahl Rufer

10

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

D

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

x

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Biototyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Deich, Laubwald

Nutzungen Umland:

275


Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
Werben – Neu Goldbeck II

Lage

MTBQ 3137-22
GK-R 449/254
GK-H 5860349



SDL – 284

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2,1 km nordwestl. Werben
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell x
Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen, Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| V | 150 | - | - |

4. Lebensraum

Strukturtyp: C / G

Gewässerfläche: < 1 000 m² x
≤ 5 000 m²
> 5 000 m²

Biotoptyp: FN3

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %
x

Baschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %
x x x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Deich, Laubwald, (Grünland)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
|---|--------------------------------------|
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung x |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung: Laubeintrag | Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

- Deichsanierung bereits 2001 realisiert.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG GLB x FND GLB x FFH x §-30-Biotop

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG x LSG FND x GLB x FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Unterschutzstellung | x | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | x | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung | x | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | x | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | x | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Erhöhter Monitoringbedarf nach Deichsanierung
- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Die Vorkommen sind schutzwürdig als NSG oder mindestens zur Ausweisung eines FND oder GLB.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutendes und individuenreiches Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana arvalis)


276

Bezeichnung:

Wendemark

| Lage | MTBQ | GK-R | GK-H |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

3137-41
4495719
5856546



6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge: Hypertrophierung | (x) Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wandervegen |
| Beschattung; Laubeintrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|
| NSG | LSG | FND | GLB | FFH | §-30-Biotop | x |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|
| NSG | | LSC | x | END | | GLB | | FFH | |
|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|

- geplantes LSG „Altmärkische Wische“

1. Allgemeine Angaben

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Lage: | 2 km SSE Wendemark | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werben der Elbetal | x | | 2001 |
| Landkreis: | Stendal | | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| II | 8 | - | - |

4. Lebensraum

| Strukturtyp: | C |
|------------------|---|
| Gewässerfläche: | <div> <div>< 1 000 m²</div> <div>≤ 5 000 m²</div> <div>> 5 000 m²</div> </div> <div>X</div> |
| Biotoptyp: | FN3 |
| Vegetation (DG): | <div> <div>0-25 %</div> <div>26-75 %</div> <div>76-100 %</div> </div> <div>X</div> |
| Beschattung: | <div> <div>0 %</div> <div>≤ 50 %</div> <div>> 50 %</div> </div> <div>X</div> |

5. Nutzungen

[illegible]

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge: Hypertrophierung | (x) Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wandervegen |
| Beschattung; Laubeintrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|
| NSG | LSG | FND | GLB | FFH | §-30-Biotop | x |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|
| NSG | | LSC | x | END | | GLB | | FFH | |
|-----|--|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|

- geplantes LSG „Altmärkische Wische“

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|--|--|---|
| Unterschutzstellung | | x |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | | |
| Ausgliederung von Gewässerschutzstreifen | | x |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | | |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Vegetation | | |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | x |
| Uferbefestigung | | x |
| Uferrenaturierung (Profil) | | |
| Sicherung von Wanderwegen | | x |
| Sicherung der Wasserhaltung | | |
| Weitere Kartierungen | | |
| Erhöhter Monitoring-Bedarf | | x |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung des Grundwasserstandes.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


- Kleineres, möglicherweise isoliertes Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

Iden – Gewässer südöstlich Iden

SDL – 213



| 1. Allgemeine Angaben | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Lage: | 0,8 km südöstl. Iden | Aktuell | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | 2000 |
| Landkreis: | Stendal | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Larv = Larv; Laich = Laichen; Juv = Juvenges

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
nachweis | | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | | | |
| | | | | - nicht kontrolliert |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|
| 4. Lebensraum | Strukturtyp: | Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² | | |
| | Biotoptyp: | Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 % | | |
| | | Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 % | | |
| | | | | |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge: Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

• geplantes LSG „Atmürkische Wische“

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | |
|---|-----------------------------|
| Unterschutzzteilung | Uferbeplantzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Eräuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Kleineres, möglicherweise ± isoliertes Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana anax)

Bezeichnung:

Rengerslage

SDL - 366

Lage

| | |
|------|---------|
| MTBQ | 3137-34 |
| GK-R | 4493643 |
| GK-H | 5853504 |



1. Allgemeine Angaben

| | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Lage: | 0,6 km östl. Rengerslage | | 2000 |
| NHE/Naturraum: | D.09 / Werbener Elbetal | x | |
| Landkreis: | Stendal | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenales

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rüfer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| II | 10 | - | - |

4. Lebensraum

| | | | |
|--------------|-----|------------------|--|
| Strukturtyp: | A | Gewässerfläche: | <div> <div>≤ 1 000 m²</div> <div>x</div> <div>≤ 5 000 m²</div> <div>> 5 000 m²</div> </div> |
| Biotoptyp: | FN3 | Vegetation (DG): | <div> <div>0-25 %</div> <div>26-75 %</div> <div>x</div> <div>76-100 %</div> </div> |
| | | Beschattung: | <div> <div>0 %</div> <div>≤ 50 %</div> <div>x</div> <div>> 50 %</div> </div> |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Acker

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | | |
|--|----------|---|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verdickung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung; Laubeintrag
Überwindung | x | Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsenierung
Bebauung
Zerschneidung von Wäldern
Freizeitmutzung (Baden, Camping)
Isolation |
|--|----------|---|

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|---|
| NSG | ☐ | LSC | ☐ | FND | ☐ | GLB | ☐ | FFH | ☐ | §-30-Biotop | ☐ | x |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSG | LSC | FND | GLB | FFH |
|-----|-----|-----|-----|-----|

- geplantes LSG „Atmürkische Wische“

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ☐ Unterschutzstellung | | ☒ Uferbepflanzung |
| ☒ Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | ☒ | ☒ Uferrenaturierung (Profil) |
| ☒ Ausgliederung von Gewässerschonschuttbereichen | ☒ | ☒ Sicherung von Wanderwegen |
| ☒ Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | ☒ | ☒ Sicherung der Wasserhaltung |
| ☒ punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | ☒ Weitere Kartierungen |
| ☒ Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | ☒ Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleineres, möglicherweise isoliertes Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:

Sandauerholz – Germerslage

SDL – 092

Lage
MTBO 3238-11
GK-R 4500067
GK-H 5849504



| 1. Allgemeine Angaben | | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Lage: | Alte Elbe süd. Kannenberg | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | | 2000 |
| Landkreis: | Stendal | | | |

| 3. Aktueller Bestand | |
|--|--------------|
| Häufigkeitsklasse | Anzahl Rüfer |
| II | 15 |
| Bemerkungen | |
| Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; JUV = Juveniles | |

| 4. Lebensraum | |
|------------------|----------------------------------|
| Strukturtyp: | D / G |
| Biotoptyp: | FN1 |
| Gewässerfläche: | < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² |
| Vegetation (DG): | 0-25 % 26-75 % 76-100 % |
| Beschattung: | 0 % ≤ 50 % > 50 % |

| 5. Nutzungen | |
|---------------------|---------------------------|
| Nutzungen Gewässer: | Grünland, Deich, Siedlung |
| Nutzungen Umland: | |

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | x Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung; Laubeintrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☒ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

- Nur teilweise im NSG „Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge“, im LSG „Aland-Elbe-Niederung“ und im FFH-Gebiet „Eibaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“.

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

- z.T. im geplanten LSG „Altmarkische Wische“;
- Ggf. Erweiterung des FFH-Gebietes „Eibaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | |
|--|---|
| Unterschutzstellung | x Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | x ¹ Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | x Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | x Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | x Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- ¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3138301 „Eibaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“;
- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Maximale Schonung des Gewässers bei Deichbaumaßnahmen und Deichunterhaltungen;
- Ausweisung von Pufferzonen v.a. westwärts auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Kleinere, aber bedeutende Vorkommen im südöstlichen Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Moorfrosch (*Rana arvalis*)

Bezeichnung:

Elbdeich Neukirchen I

Lage

MTBQ 3137.12
GK-R 4493633
GK-H 5861714



SDL – 295

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2 km nordöstl. Neukirchen
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell x
Nicht bestätigt
Letztes Nachweisjahr 2001

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| III | 30 | - | - |

4. Lebensraum

Strukturtyp: G

Biotoptyp: FN32

| | | | | | | |
|------------------|--------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| Gewässerfläche: | < 1 000 m² x | | | > 5 000 m² | | |
| Vegetation (DG): | 0-25 % | 26-75 % | 76-100 % | 0-25 % | 26-75 % | 76-100 % |
| Beschattung: | 0 % | ≤ 50 % | > 50 % | 0 % | ≤ 50 % | > 50 % |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Laubwald, Deich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubeintrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

- Deichsanierung bereits realisiert.

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ § 30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☒ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Unterschutzstellung | x | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe;
- Das Vorkommensgebiet ist zusammen mit den östlicheren Fundpunkten generell schutzwürdig als NSG.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutende und individuenreiche Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana arvalis)


Bezeichnung:

Elbdeich Neukirchen II

SDL - 298

Lage

| | |
|------|---------|
| MTBQ | 3137-12 |
| GK-R | 4492199 |
| GK-H | 5862434 |



1. Allgemeine Angaben

Lage: 1,7 km NNE Neukirchen
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung, Lai = Laich, Lar = Larven, Juv = Juvenes

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| III | 30 | - | - |

4. Lebensraum

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------|---|------------------------|------------------------|----------|---|
| Strukturtyp: | G | | | | | | |
| Biototyp: | FN32 | | | | | | |
| Gewässerfläche: | | < 1 000 m ² | x | ≤ 5 000 m ² | > 5 000 m ² | | |
| Vegetation (DG): | | 0-25 % | | 26-75 % | x | 76-100 % | |
| Beschattung: | | 0 % | | ≤ 50 % | | > 50 % | x |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:
Laubwald, Deich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verdichtung, Sukzession
Vermulung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Übernutzung | (x) | Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation | x |
|--|-----|---|---|

Weitere Anmerkungen:

- Deichsanierung bereits realisiert

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| NSG | ☐ | LSG | ☒ | FND | ☐ | GLB | ☐ | FFH | ☒ | §-30-Biotop | ☒ |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSG | (x) | LSG | FND | GLB | FFH |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungs-dynamik der Elbe;
- Das Vorkommensgebiet ist zusammen mit den östlicheren Fundpunkten generell schutzwürdig als NSG.

3. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutende und individuenreiche Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch
(*Rana arvalis*)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Rotbauchfünke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Beuster – Oberkamps

Lage

MTBQ

3036-44

GK-R

4487310

GK-H

5865370

SDL – 552

1. Allgemeine Angaben

Lage:

Nördl. Orsteil Oberkamps

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

1996

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Larv = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-Klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-Nachweis | Bemerkungen |
|--------------------|--------------|------------------------|-------------|
| | | | |

4. Lebensraum

Strukturtyp:

D

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

FN3

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Laubwald, Deich

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm

Rotbauchfünke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

(x) Deichbau/Deichsanierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

• Deichsanierung bereits realisiert

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§ 30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzteilung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonschreifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


• Möglicherweise kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommensgebiet im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Elbdeich Beuster

Lage
3038-41
4485561
5868195

SDL – 520



| 1. Allgemeine Angaben | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Lage: | 0,4 km nördl. Beuster | Aktuell | Nicht bestätigt |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | |
| Landkreis: | Stendal | | Letztes Nachweisjahr
2001 |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rüfer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| II | 20 | - | |

| | |
|------------------|-----|
| 4. Lebensraum | C |
| Strukturtyp: | |
| Biotoptyp: | FN3 |
| Gewässerfläche: | |
| < 1 000 m² | |
| x | |
| > 5 000 m² | |
| 0-25 % | |
| 26-75 % | |
| 76-100 % | |
| Vegetation (DG): | |
| x | |
| 0 % | |
| ≤ 50 % | |
| > 50 % | |
| Beschattung: | |
| x | |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 5. Nutzungen | |
| Nutzungen Gewässer: | |
| Nutzungen Umland: | Grünland, Deich, Gehölz |

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln | |
| Verlandung, Sukzession | (x) Deichbau/Deichsanierung | |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung | x |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen | |
| Beschattung, Laubeintrag | Freizeinnutzung (Baden, Campen u.a.) | |
| Überwässerung | Isolation | |

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|-------------|---|
| NSG | LSG | x | FND | GLB | FFH | §-30-Biotop | x |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|-------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSG | LSG | FND | GLB | FFH |
|-----|-----|-----|-----|-----|

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Unterschutzzustellung | Uferbepflanzung | |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) | |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | Sicherung von Wanderwegen | x |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wasserhaltung | |
| punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen | |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf | x |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


- Möglicherweise kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommensgebiet im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung:
Beuster – Werder

Lage

3036-42
4486650
5867480



1. Allgemeine Angaben

Lage:
NHE/Naturraum:
Landkreis:

1 km östl. Beuster
D 09 / Werbener Elbetal
Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes
Nachweisjahr
1996

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|--|
| - | - | - | - von 1996 keine Angabe zu Individuen-
zahlen |

4. Lebensraum

Strukturtyp:
C

Gewässerfläche:
x

Biotoptyp:
FN1

Vegetation (DG):
0-25 %
26-75 %
76-100 %
x

Beschattung:
0 %
≤ 50 %
> 50 %
x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:
Grünland, Gehölz, Siedlung

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüdung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubentwurf
Überweidung

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:
NSG ☒ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):
NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | |
|--|-----------------------------|
| Unterschutzstellung | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Möglicherweise kleineres, für den Populationsverbund bedeutendes Vorkommensgebiet im Werbener Elbetal.


9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Bezeichnung: **Losenrade**

Lage

3036-23
4484413
5870632

SDL – 559



| 1. Allgemeine Angaben | | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Lage: | Nörtl. Ortsrand Losenrade | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | | 2001 |
| Landkreis: | Stendal | | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-klasse | Anzahl Ruffer | Reproduktions-Nachweis | Bemerkungen |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| III | 50 | - | |

| 4. Lebensraum | |
|---------------|----------------------------------|
| Strukturtyp: | C |
| Biotoptyp: | Gewässerfläche: |
| | < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m² |
| | x |
| FN3 | Vegetation (DG): |
| | 0-25 % 26-75 % 76-100 % |
| | x |
| Beschattung: | 0 % ≤ 50 % > 50 % |
| | x |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland, Gehölz, Siedlung

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung

Fischbesatz/Angeln
(x)
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

- Ggf. südliche Erweiterung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auf Gewässerkomplex nördlich Losenrade.

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------|
| Unterschutzzielung | | x | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | | x ¹ | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | | | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mähd / Beweidung | | | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

- Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:
- ¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“;
 - Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen


- Bedeutendes Vorkommensgebiet im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(*Rana arvalis*)

Bezeichnung: **Geestgottberg I**
Lage: **SDL – 561**



MTBQ 3036-14
GK-R 4482458
GK-H 5871027

| 1. Allgemeine Angaben | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Lage: | 1,7 km NNE Geestgottberg | Aktuell | Nicht bestätigt |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | |
| Landkreis: | Stendal | | 2001 |

| 3. Aktueller Bestand | |
|--|-----------------------|
| Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles | |
| Häufigkeitsklasse | Reproduktionsnachweis |
| III | 50 |

| 4. Lebensraum | |
|------------------|--|
| Strukturtyp: | A / C |
| Biotoptyp: | FN4 |
| Gewässerfläche: | < 1 000 m ² ≤ 5 000 m ² > 5 000 m ² |
| Vegetation (DG): | 0-25 % 26-75 % 76-100 % |
| Beschattung: | 0 % ≤ 50 % > 50 % |

5. Nutzungen
Nutzungen Gewässer:
Nutzungen Umland: Grünland, Gehölz

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | | |
|---|-----|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | (x) | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | (x) | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung: Laubeintrag | | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

| 7. Schutz | |
|-------------------------|-------------|
| Aktueller Schutzstatus: | |
| NSG | LSG |
| NSG | LSG |
| FND | FND |
| GLB | GLB |
| FFH | FFH |
| § 30-Biotop | § 30-Biotop |

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| NSG | LSG | FND | GLB | FFH | § 30-Biotop |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|

- Ggf. südliche Erweiterung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auf Gewässerkomplex nördlich Losenrade.

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | |
|---|----------------|
| Unterschutzstellung | x |
| Novellierungsbefehl der Schutzgebietsgrenze | x ¹ |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | |
| Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung | |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | |
| Erhöhter Monitoring-Bedarf | x |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- ¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Bauster-Wahrenberg“;
- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutendes Vorkommensgebiet im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

Bezeichnung:

Geestgottberg II

Lage

3038-12

4482100

5871630

MTBQ

GK-R

GK-H

SDL – 545

1. Allgemeine Angaben

Lage:

2,3 km nördl. Geestgottberg

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

1996

3. Aktueller Bestand

Legende:

Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100

Individuen: Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lai = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rüfer

Reproduktionsnachweis

Bemerkungen

- von 1996 keine Angabe zu Individuenzahlen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Biotoptyp:

FN4

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Deich

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG

Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wassernaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

(x) Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

• Ggf. städte Erweiterung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auf Gewässerkomplex nördlich Losenrade.

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzstellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschuttreifen

Gewässerschonung bei Mahd / Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

x

x

x

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

x

x

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• ¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“;

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Möglicherweise kleinere aber bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

288

Bezeichnung:
Wahrenberg I

Lage

3036-13
4480200
5871190

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überweidung
Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanie rung
Bebauung
Zerschneidung von Wanderwegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung
Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze
Ausgliederung von Gewässerschonstreifen
Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung
punktuelle Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation
Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung
Uferrenaturierung (Profil)
Sicherung von Wanderwegen
Sicherung der Wasserhaltung
Weitere Kartierungen
Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Möglicherweise kleinere aber bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

Bezeichnung:
SDL – 538

Lage

3036-13
4480200
5871190

1. Allgemeine Angaben

Lage: 2 km südöstl. Wahrenberg

NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes Nachweisjahr

x

1996

3. Aktueller Bestand

Häufigkeitsklasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-Nachweis

Bemerkungen

- von 1996 keine Angabe zu Individuen-zahlen

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / C

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

x

Biotoptyp:

FN3/FN4

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

x

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

x

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Deich, Laubwald

289

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe


Wahrenberg II

Lage

3036-13
4480200
GK-R
5871190

Bezeichnung:

SDL – 538



1. Allgemeine Angaben

Lage:

Südl. Ortsrand Wahrenberg
D 09 / Werbener Elbetal
Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes
Nachweisjahr

3. Aktueller Bestand

Häufigkeits-
klasse

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

35

-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / C

Biotoptyp:

FN3/FN4

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Deich, Laubwald

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsaniierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeithutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

• Ggf. Erweiterung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auf innerdeichs
gelegenen Gewässerkomplex nördlich Losenrade.

Prioritäre Schutz- und Pfleðemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonschneifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Eräuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

• Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

• Bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch

(Rana arvalis)

ANHANG
Flächensteckbriefe

SDL – 538

1. Allgemeine Angaben

Lage:

Südl. Ortsrand Wahrenberg
D 09 / Werbener Elbetal
Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes
Nachweisjahr

3. Aktueller Bestand

Häufigkeits-
klasse

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

35

-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / C

Biotoptyp:

FN3/FN4

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Deich, Laubwald

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Wahrenberg II

Lage
3036-13
4480200
GK-R
5871190

Bezeichnung:

Wahrenberg II

1. Allgemeine Angaben

Lage:

Südl. Ortsrand Wahrenberg
D 09 / Werbener Elbetal
Stendal

2. Vorkommen

Aktuell

Nicht bestätigt

Letztes
Nachweisjahr

3. Aktueller Bestand

Häufigkeits-
klasse

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

35

-

4. Lebensraum

Strukturtyp:

A / C

Biotoptyp:

FN3/FN4

Gewässerfläche:

< 1 000 m²

≤ 5 000 m²

> 5 000 m²

Vegetation (DG):

0-25 %

26-75 %

76-100 %

Beschattung:

0 %

≤ 50 %

> 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Grünland, Deich, Laubwald

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

ANHANG
Flächensteckbriefe

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Fischbesatz/Angeln

Verlandung, Sukzession

Deichbau/Deichsaniierung

Vermüllung, Verfüllen

Bebauung

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Zerschneidung von Wanderwegen

Beschattung, Laubeintrag

Freizeithutzung (Baden, Campen u.a.)

Überweidung

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

LSG

x

FND

GLB

FFH

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

x

- Ggf. Erweiterung des FFH-Gebietes DE3036301 „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auf innerdeichs
gelegenen Gewässerkomplex nördlich Losenrade.

Prioritäre Schutz- und Pfleðemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzstellung

Uferbepflanzung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Uferrenaturierung (Profil)

Ausgliederung von Gewässerschonschneifen

Sicherung von Wanderwegen

Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung

Sicherung der Wasserhaltung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Weitere Kartierungen

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Eräuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Moorfrosch (Rana arvalis)

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung | Fischbesatz/Angeln |
| Verlandung, Sukzession | Deichbau/Deichsanierung |
| Vermüllung, Verfüllen | Bebauung |
| Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen | Zerschneidung von Wanderwegen |
| Beschattung, Laubeintrag | Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.) |
| Überweidung | Isolation |

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|------------|---|
| NSG | LSG | x | FND | GLB | FFH | x | §30-Biotop | x |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| NSG | LSG | FND | GLB | FFH |
|-----|-----|-----|-----|-----|

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | |
|--|-----------------------------|
| Unterschutzeileung | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonstreifen | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wasserhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik der Elbe.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Möglicherweise kleinere aber bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

| | |
|------------|----------------|
| Moorfrosch | (Rana arvalis) |
|------------|----------------|

Bezeichnung: Wahrenberg III

SDL – 535

Lage

3036-11

4478350

5873240



1. Allgemeine Angaben

Lage: Nördl. Ortsrand Wahrenberg

NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

| | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| | x | 1996 |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweise: Paar = Paarung; Lar = Larve; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Häufigkeitsklasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-Nachweise | Bemerkungen |
| - | - | - | - |

4. Lebensraum

Strukturtyp: G / F

Gewässerfläche: < 1 000 m² ≤ 5 000 m² > 5 000 m²

Biotoptyp: FN3/FN4

Vegetation (DG): 0-25 % 26-75 % 76-100 %

Beschattung: 0 % ≤ 50 % > 50 %

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer: Deich, Laubwald, Grünland

Nutzungen Umland:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

ANHANG
Flächensteckbriefe

2935-43
GK-R
4472084
5874977

Aulosen – Stresow

Bezeichnung:

ANHANG
Flächensteckbriefe

SDL – 569

Lage

2.3 km NNW Aulosen

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

1. Allgemeine Angaben

2. Vorkommen

Lage:

2.3 km NNW Aulosen

NHE/Naturraum:

D 09 / Werbener Elbetal

Landkreis:

Stendal

3. Aktueller Bestand

4. Lebensraum

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-
Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

50

-

-

5. Nutzungen

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Deich, Grünland

7. Schutz

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-
Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

50

-

-

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

10. Weitere Anmerkungen

Knoblauchkröte
(Pelobates fuscus)

Laubfrosch
(Hyla arborea)

Moorfrosch
(Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

ANHANG
Flächensteckbriefe

2935-43
GK-R
4472084
5874977

Aulosen – Stresow

Bezeichnung:

ANHANG
Flächensteckbriefe

SDL – 569

7. Schutz

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis:
Paar = Paarung; Lar = Larven; Juv = Juveniles

Häufigkeits-
Klasse

Anzahl Rufer

Reproduktions-
Nachweis

Bemerkungen

III

50

-

-

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

10. Weitere Anmerkungen

Knoblauchkröte
(Pelobates fuscus)

Laubfrosch
(Hyla arborea)

Moorfrosch
(Rana arvalis)

Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt

Bezeichnung:

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG

x

LSG

x

FND

GLB

FFH

x

§-30-Biotop

x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG

LSG

FND

GLB

FFH

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

Unterschutzzustellung

Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze

Ausgliederung von Gewässerschonschneidungen

Gewässerschneidung bei Mahd / Beweidung

punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation

Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz

Uferbepflanzung

Uferrenaturierung (Profil)

Sicherung von Wanderwegen

Sicherung der Wasserhaltung

Weitere Kartierungen

Erhöhter Monitoring-Bedarf

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Möglichenweise bedeutende Vorkommen im Werbener Elbetal und Randbereich der Westlichen Altmärkplattens;
- Aktueller Status muss weiter überprüft werden.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte
(Pelobates fuscus)

Laubfrosch
(Hyla arborea)

Moorfrosch
(Rana arvalis)


Bezeichnung:

Wanzer

Lage

| | |
|------|---------|
| MTBQ | 3035-21 |
| GK-R | 4473339 |
| GK-H | 5873891 |

SDL - 498



1. Allgemeine Angaben

Lage: Nördl. Ortsrand Wanzer
NHE/Naturraum: D 09 / Werbener Elbetal
Landkreis: Stendal

2. Vorkommen

| | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| x | | 2000 |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lat = Laich; Lar = Larven; Juv = Juveniles

| Häufigkeits-
klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-
Nachweis | Bemerkungen |
|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| II | 20 | - | - |

4. Lebensraum

Strukturtyp:

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|------------|------------|--|
| Strukturtyp: | C | | | | |
| Biotoptyp: | FN3 | | | | |
| Gewässerfläche: | | < 1 000 m² | ≤ 5 000 m² | > 5 000 m² | |
| | | | x | | |
| Vegetation (DG): | | 0-25 % | 26-75 % | 76-100 % | |
| | | x | x | | |
| Beschattung: | | 0 % | ≤ 50 % | > 50 % | |
| | | | x | | |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

**Forschungsprojekt Artenhilfsprogramm
Rotbauchunke Sachsen-Anhalt**

ANHANG

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

| | |
|--|---|
| Nährstoffeinträge, Hypertrophierung
Verlandung, Sukzession
Vermüllung, Verfüllen
Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen
Beschattung, Laubeintrag
Überwüdhung | Fischbesatz/Angeln
Deichbau/Deichsanierung
Bebauung
Zerschneidung von Wandervegen
Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)
Isolation |
|--|---|

Weitere Anmerkungen:

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|-------------|---|
| NSG | x | LSG | x | FND | | GLB | | FFH | | S-30-Biotop | x |
|-----|---|-----|---|-----|--|-----|--|-----|--|-------------|---|

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen

| | |
|---|-------------------------------|
| Unterschutzstellung | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausschleiderung der Gewässerschonstreifen | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschonung bei Mähd / Beweidung | Sicherung der Wassernahaltung |
| punktueller Beseitigung v. Rohricht/ Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Requirierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |

xx

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

- Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

- Bedeutendes Vorkommen der Garbe-Aland-Niederung.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien


Bezeichnung:

Polnitz – Alanddeich Scharpenhufe

SDL – 497

Lage

MTBQ 3035-24
GKR 4478612
GK-H 5870149



| 1. Allgemeine Angaben | | 2. Vorkommen | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Lage: | 1,5 km südöstl. Polnitz | Aktuell | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbener Elbetal | x | 2000 |
| Landkreis: | Stendal | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100. Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Lal = Laich; Lar = Larven; Juv = Juvenies

Häufigkeits-klasse

I

Anzahl Rufer

5

Reproduktions-Nachweis

-

Bemerkungen

| 4. Lebensraum | |
|------------------|-----|
| Strukturtyp: | C |
| Gewässerfläche: | |
| < 1 000 m² | |
| ≤ 5 000 m² | |
| > 5 000 m² | |
| x | |
| Biotoptyp: | FN3 |
| Vegetation (DG): | |
| 0-25 % | |
| 26-75 % | |
| 76-100 % | |
| x | |
| Beschattung: | |
| 0 % | |
| ≤ 50 % | |
| > 50 % | |
| x | |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland:

Grünland, Gehölz, Deich

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung; Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐ §-30-Biotop ☒ x

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☐

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | |
|---|------------------------------|
| Unterschutzzteilung | Uferbepflanzung |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | Uferrenaturierung (Profil) |
| Ausgliederung von Gewässerschonschneisen | Sicherung von Wanderwegen |
| Gewässerschönung bei Mahd / Beweidung | Sicherung der Wassernhaltung |
| punktueller Beseitigung v. Rohricht/Ufervegetation | Weitere Kartierungen |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | Erhöhter Monitoring-Bedarf |
| xx | |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Bedeutendes Vorkommen der Garbe-Aland-Niederung.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)

Moorfrosch (Rana arvalis)

Bezeichnung:

Krüdren – Alanddeich

SDL – 521

Lage

3035-31

4479775

5969081

GK-R

GK-H



| 1. Allgemeine Angaben | | | 2. Vorkommen | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|
| Lage: | 2,2 km nördl. Krüdren | | Aktuell | Nicht bestätigt | Letztes Nachweisjahr |
| NHE/Naturraum: | D 09 / Werbeher Elbetal | | x | | 2001 |
| Landkrei: | Stendal | | | | |

3. Aktueller Bestand

Legende: Häufigkeitsklasse (HK): I = 1-5; II = 6-20; III = 21-50; IV = 51-100; V = > 100 Individuen; Reproduktionsnachweis: Paar = Paarung; Larj = Larven; Juv = juveniles

| Häufigkeits-klasse | Anzahl Rufer | Reproduktions-Nachweis | Bemerkungen |
|--------------------|--------------|------------------------|-------------|
| III | 30 | - | - |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 4. Lebensraum | A / D | | |
| Strukturtyp: | A / D | | |
| Gewässerfläche: | < 1 000 m² · ≤ 5 000 m² · > 5 000 m² | | |
| | x | | |
| Vegetation (DG): | 0-25 % · 26-75 % · 76-100 % | | |
| | x | | |
| Biototyp: | FN3 | | |
| Beschattung: | 0 % · ≤ 50 % · > 50 % | | |
| | x | | |

5. Nutzungen

Nutzungen Gewässer:

Nutzungen Umland: Grünland, Gehölz, Deich, Acker

6. Beeinträchtigung/Gefährdung

Nährstoffeinträge, Hypertrophierung

Verlandung, Sukzession

Vermüllung, Verfüllen

Gestörter Wasserhaushalt, Trockenfallen

Beschattung, Laubeintrag

Überweidung

Weitere Anmerkungen:

Fischbesatz/Angeln

Deichbau/Deichsanierung

Bebauung

Zerschneidung von Wanderwegen

Freizeitnutzung (Baden, Campen u.a.)

Isolation

7. Schutz

Aktueller Schutzstatus:

NSG ☐ LSG ☒ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒ §-30-Biotop ☒

nur außerhalb liegendes Vorkommen im FFH-Gebiet

Schutzstatus-Vorschlag (Novellierung):

NSG ☐ LSG ☐ FND ☐ GLB ☐ FFH ☒

Ggf. Erweiterung des FFH-Gebietes DE2935301 „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ auf innerdeichs liegendes Vorkommensgebiet.

| Prioritäre Schutz- und Pflegemaßnahmen/Sonstige Maßnahmen | | | |
|---|---|-----------------------------|----|
| Unterschutzstellung | x | Uferbepflanzung | |
| Novellierungsbedarf der Schutzgebietsgrenze | x | Uferrenaturierung (Profil) | |
| Ausgliederung von Gewässerschonschneifen | x | Sicherung von Wanderwegen | |
| Gewässerschöpfung bei Mahd / Beweidung | x | Sicherung der Wasserhaltung | |
| punktueller Beseitigung v. Röhricht/Ufervegetation | | Weitere Kartierungen | xx |
| Beseitigung/Regulierung von Fischbesatz | | Erhöhter Monitoring-Bedarf | |

Erläuterungen zu Maßnahmen/Nutzungsregelungen:

¹ betrifft Abgrenzung des FFH-Gebietes DE2935301 „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“;

Verbreiterung der Pufferzone zu südlich angrenzender Ackerfläche;

Sicherung hoher Grundwasserstände und der Überflutungsdynamik.

8. Gesamtbewertung/Bemerkungen

Bedeutendes Vorkommen der Garbe-Aland-Niederung.

9. Wertgebende Begleitarten Amphibien

Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*)

Moorfrosch (*Rana arvalis*)

NOTIZEN