


<b>Nr. des Indikators</b>	<b>B3</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Mittlerer Abfluss (MQ)</b>
<b>Themenfeld</b>	<b>Wasser</b>
Räumliche Gliederung	keine
Bearbeitungsstand	12.10.2020


<p>Definition und Berechnungsvorschrift</p>	<p>Der Abfluss ist definiert als Wasservolumen, das einen bestimmten Querschnitt in der Zeiteinheit durchfließt und einem Einzugsgebiet zugeordnet ist. Der mittlere jährliche Abfluss MQ gibt das arithmetische Mittel aller 365 bzw. 366 in einem Jahr aufgetretenen Tagesmittelwerte des Abflusses an einem Pegel wieder. Die arithmetischen Mittel der 30-Jahreszeiträume werden ebenfalls direkt aus den Tagesmittelwerten des jeweiligen Zeitraums gebildet.</p> <p>Für Sachsen-Anhalt wurden drei Pegel an Fließgewässern ausgewählt, deren Einzugsgebiete ganz oder größtenteils in Sachsen-Anhalt liegen, die eine lange Beobachtungsreihe besitzen und nur gering anthropogen beeinflusst sind. Die Einzugsgebiete liegen in unterschiedlichen Landschaftsräumen von Sachsen-Anhalt (Landschaften am Südrand des Tieflandes, Ackerebenen, Flusstäler und Niederungslandschaften, Mittelgebirge und Mittelgebirgsvorländer).</p> <table border="1" data-bbox="491 835 1348 969"> <thead> <tr> <th><b>Pegelname</b></th> <th><b>Gewässer</b></th> <th><b>Einzugsgebiet</b></th> <th><b>beobachtet seit</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nutha</td> <td>Nuthe</td> <td>509 km<sup>2</sup></td> <td>1972</td> </tr> <tr> <td>Mertendorf</td> <td>Wethau</td> <td>205 km<sup>2</sup></td> <td>1963</td> </tr> <tr> <td>Großschieferstedt</td> <td>Wipper</td> <td>544 km<sup>2</sup></td> <td>1961</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Lage der Pegel:</b></p> <p>Nutha: Landkreis Anhalt-Bitterfeld; Gemeinde Zerbst  Mertendorf: Burgenlandkreis; Verbandsgemeinde Wethautal  Goßschieferstedt: Salzlandkreis; Stadt Aschersleben</p> <p>Die ausgewählten Flussgebiete entsprechen den o. g. Kriterien. Vorhandene Datenlücken ergeben sich durch fehlende Stationswerte in diesen Jahren.</p>	<b>Pegelname</b>	<b>Gewässer</b>	<b>Einzugsgebiet</b>	<b>beobachtet seit</b>	Nutha	Nuthe	509 km <sup>2</sup>	1972	Mertendorf	Wethau	205 km <sup>2</sup>	1963	Großschieferstedt	Wipper	544 km <sup>2</sup>	1961
<b>Pegelname</b>	<b>Gewässer</b>	<b>Einzugsgebiet</b>	<b>beobachtet seit</b>														
Nutha	Nuthe	509 km <sup>2</sup>	1972														
Mertendorf	Wethau	205 km <sup>2</sup>	1963														
Großschieferstedt	Wipper	544 km <sup>2</sup>	1961														
<p>Datenquelle, Aufbereitung</p>	<p>Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW), Gewässerkundlicher Landesdienst</p>																


Bedeutung	<p>Für die Planung und Bemessung von wasserwirtschaftlichen Nutzungen und Abflussregelungen an Gewässern werden zur Beurteilung des Abflussgeschehens verschiedene Abflusskennwerte herangezogen. Diese Abflusskennwerte können für den aktuellen Klimazustand aus den Beobachtungszeitreihen der Pegel abgeleitet werden. Für nachhaltige, zukunftsorientierte Planungen und Bewertungen ist die Kenntnis darüber von besonderer Bedeutung. Es wird daraus ersichtlich, wie das Abflussgeschehen und damit die Abflusskennwerte sich infolge des Klimawandels zukünftig verändern könnten.</p> <p>Der mittlere Abfluss stellt eine wichtige hydrologische Kenngröße dar und unterliegt den Einflüssen der Klimaveränderung. Die relevanten Klimafaktoren sind dabei in erster Linie der Niederschlag und die Temperatur. Eine langfristige Veränderung des MQ wirkt sich insbesondere auf die Gesamtsysteme eines Fließgewässers aus.</p> <p>Die Analyse des Langzeitverhaltens des mittleren jährlichen Abflusses MQ besteht primär in der Ermittlung eventuell vorhandener linearer Trends in den Zeitreihen der drei ausgewählten Pegel.</p> <p>Das Trendverhalten der Zeitreihen der mittleren jährlichen Abflüsse hängt von der Länge der einzelnen Zeitreihe bzw. vom betrachteten Zeitfenster ab. Für statistisch zuverlässige Aussagen über das Trendverhalten sind daher möglichst lange Zeitreihen erforderlich, die mindestens 60 bis 70 Beobachtungsjahre umfassen sollten. Für kürzere Zeitspannen sind eventuell auftretende Trends als eher zufällig zu bewerten und daher in der Regel nur wenig aussagekräftig.</p>
Intervall der Zeitreihe	01.01.1961 (oder ab Beobachtungsbeginn) bis 31.12.2018
Aktualisierung	jährlich zum 31.12. des darauffolgenden Kalenderjahres
Kommentierung des Indikatorverlaufs	<p>Die hier dargestellten Verläufe des mittleren jährlichen Abflusses von drei Messstellen in unterschiedlichen Landschaftsräumen lassen lediglich eine Tendenz zu einem leichten Abfall des MQ über den Gesamtzeitraum erkennen. Signifikante Trends können nicht nachgewiesen werden.</p> <p>Am Pegel Mertendorf/Wethau fällt auf, dass der Zeitraum von Ende der 1970er bis Ende der 1980er Jahre im Vergleich relativ feucht war, während danach bis 2009 eine längere, eher trockene Periode folgte. An den Pegeln Großschießstedt/Wipper und Nutha/ Nuthe können keine solchen länger anhaltenden Phasen nachgewiesen werden.</p> <p>Dabei ist zu beachten, dass an den ausgewählten Messstellen lediglich die Entwicklung des mittleren Abflusses für die Fließgewässer oberhalb der Pegel beobachtet werden kann. Dieser ist maßgeblich durch das Abflussregime (charakteristischer mittlerer Jahresgang des Abflusses) beeinflusst. Das Abflussregime ist durch die klimatologischen, geologischen, bodenkundlichen, geomorphologischen, ökologischen und anthropogenen Umweltfaktoren des betrachteten Einzugsgebietes bedingt. Die einzelnen Faktoren sind häufig miteinander gekoppelt und variieren sowohl entlang eines Fließgewässers als auch zwischen den Einzugsgebieten verschiedener Fließgewässer. Die hier dargestellten Verläufe des mittleren Abflusses spiegeln daher nicht die Entwicklung des gesamten jeweiligen Landschaftsraums wider, sondern sind als Beispiel zu verstehen.</p>

Maßeinheit	Kubikmeter pro Sekunde
Bezeichnung für Diagramm	<b>Mittlerer jährlicher Abfluss am Pegel Nutha (Nuthe)</b>



Bezeichnung für Diagramm	<b>Mittlerer jährlicher Abfluss am Pegel Mertendorf (Wethau)</b>
--------------------------	--





**Datentabelle mittlerer Abfluss von Nuthe, Wethau, Wipper (in m³/s)**

Jahr	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Pegel Nutha (Nuthe)												1,62	1,23	1,62	1,58
Pegel Mertendorf (Wethau)			0,50	0,36	0,96	1,07	0,98	0,82	1,05	1,37	0,91	0,68	0,56	0,81	1,04
Pegel Großschieerstedt (Wipper)	3,85	2,55	1,22	1,05	2,93	3,33	3,12	2,10	2,52	4,69	2,18	2,02	2,09	2,92	2,71

Jahr	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Pegel Nutha (Nuthe)	1,17	1,87	2,03	2,57	1,89	1,85	1,39	1,15	1,51	1,34	1,51	2,54	1,95	1,13	1,13
Pegel Mertendorf (Wethau)	0,62	1,15	0,96	1,41	1,40	1,91	1,49	1,30	1,16	0,93	1,86	3,24	2,60	0,88	0,77
Pegel Großschieerstedt (Wipper)	1,54	2,91	2,25	2,72	1,94	3,04	2,03	1,94	2,45	1,81	2,86	3,81	3,13	1,30	1,66

Jahr	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pegel Nutha (Nuthe)	1,27	1,47	1,58	2,45	2,06	1,28	1,10	1,18	1,09	1,21	1,46	2,12	1,59	1,32	1,06
Pegel Mertendorf (Wethau)	0,60	0,61	0,68	0,99	0,92	0,69	0,65	0,61	0,62	0,71	0,56	0,72	0,80	0,54	0,69
Pegel Großschieerstedt (Wipper)	1,47	1,46	2,04	4,36	2,57	1,84	2,30	2,55	2,37	1,94	1,71	3,13	2,28	1,59	1,76

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pegel Nutha (Nuthe)	1,14	1,61	1,56	1,22	2,18	1,93	1,54	2,10	1,48	1,47	1,45	1,25	0,89	0,74	
Pegel Mertendorf (Wethau)	0,57	0,72	0,75	0,80	1,45	1,19	0,52	1,26	0,54	0,55	0,43	0,48	0,37	0,26	
Pegel Großschieerstedt	1,81	3,01	2,52	1,87	3,81	3,00	1,43	3,44	2,16	2,15	1,48	1,49	1,64		

**Mittlerer Abfluss ausgewählter langjähriger Zeitabschnitte in Kubikmeter je Sekunde**

Pegel Nutha	Pegel Mertendorf	Pegel Großschießstedt
1972-1990: 1,64 m³/s	1963-1990: 1,18 m³/s	1961-1990: 2,49 m³/s
1972-2000: 1,58 m³/s	1971-2000: 1,10 m³/s	1971-2000: 2,34 m³/s
1981-2010: 1,52 m³/s	1981-2010: 1,06 m³/s	1981-2010: 2,35 m³/s

**Anhang:**

**Grafische Darstellung der Einzugsgebiete**

