

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4135-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4135-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0102	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Salzstelle bei Hecklingen		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,5575	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,8450
Fläche:	35,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Mai 2019
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4135	Staßfurt
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

502	Nordöstliches Harzvorland
naturräumliche Haupteinheit:	
D20	Östliches Harzvorland u. Börden

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Binnensalzstelle.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gut ausgeprägte Binnensalzstelle mit zahlreich vorkommenden Rote-Liste-Arten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
geowissensch. Bedeutung:	Aufsteigende Wässer des Zechsteinsalinars.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

--	--

F1	Ackerkomplex	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	99 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4135-301		0025ASL	LSG	b	-	Bodeniederung	5.607,00	100
4135-301		0035M__	NSG	b	+	Salzstelle bei Hecklingen	14,00	40

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Durch Nutzungsaufgabe bedingtes randliches Vordringen von Schilf.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
A08	Düngung	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Salzlandkreis Salzlandkreis Umweltamt
--

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan Oktober 2010	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

--

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
1340	Salzwiesen im Binnenland	3,6990			G	A			1	B			A	2010

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MOL	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]			r	kD	r	2	2	1	h	B	B	B	B	II	2003
MOL	Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke]			r	kD	p			1	d	B			C	II	2010

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
COL	ACUPELEG	Acupalpus elegans [Salzstellen-Buntschnellläufer]					r	p	g	1999
COL	AGONSEXP	Agonum sexpunctatum					r	p	t	1999
COL	AMARCONV	Amara convexior					r	p	t	1999
COL	AMARTIBI	Amara tibialis [Zwerg-Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	AMARTRIC	Amara tricuspidata [Dreispitziger Kamelläufer]					r	p	g	1999
COL	ANISPOEC	Anisodactylus poeciloides [Salzstellen-Rotstirnläufer]					r	p	g	1999
COL	BEMBMINI	Bembidion minimum					r	p	t	1999
COL	CARACLAT	Carabus clatratus [Ufer-Laufkäfer]					r	p	g	1999
COL	DEMEIMPE	Demetrias imperialis [Gefleckter Halmläufer]					r	p	g	1999
COL	DIACGERM	Diachromus germanus					r	p	t	1999
COL	DICHGUST	Dicheirotrichus gustavi [Langhaariger Kinnzahn-Schnelläufer]					r	p	g	1999
COL	DICHOBOS	Dicheirotrichus obsoletus [Kurzhaariger Kinnzahn-Schnelläufer]					r	p	g	1999
COL	DYSCCHAL	Dyschirius chalcus [Erzfarbener Handläufer]					r	p	g	1999
COL	DYSCSALI	Dyschirius salinus [Salz-Handläufer]					r	p	g	1999
COL	HARPZABR	Harpalus zabroides [Plumper Schnelläufer]					r	p	g	1999
COL	LASIDISC	Lasiotrechus discus					r	p	t	1999
COL	POGOCHAL	Pogonus chalcus [Erzfarbener Salzstellenläufer]					r	p	g	1999
COL	POGOIRID	Pogonus iridipennis [Schillernder Salzstellenläufer]					r	p	g	1999
COL	POGOLURI	Pogonus luridipennis [Heller Salzstellenläufer]					r	p	g	1999
COL	TACHSCUT	Tachys scutellaris [Salzstellen-Zwergahnläufer]					r	p	g	1999
ODON	ISCHPUMI	Ischnura pumilio [Kleine Pechlibelle]					r	p	t	1999
PFLA	ASTETRIP	Aster tripolium [Strand-Aster]					r	p	t	1999
PFLA	GLAUMARI	Glaux maritima [Milchkraut]					r	p	t	1999
PFLA	JUNCGERA	Juncus gerardii [Bodden-Binse]					r	p	t	1999
PFLA	PUCCDIST	Puccinellia distans [s.l.] (= Puccinellia distans agg. [Artengruppe Gewöhnlicher Salzschwaden])					r	p	t	1999
PFLA	SAMOVALE	Samolus valerandi [Salz-Bunge]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)

i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0160	Soffner, J.	1971	Das Naturschutzgebiet 'Salzstelle bei Hecklingen' (Krs. Staßfurt)	Natursch. u. naturkd. Heimatf. in den Bez. Halle u. Magdeb.	8,1/2	70-74	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2010

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %