

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4338-302

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| <b>Gebietsnummer:</b>  | 4338-302  | <b>Gebietstyp:</b>                        | B             |
| <b>Landesinterne Nr.:</b>  | FFH0200   | <b>Biogeografische Region:</b>            | K             |
| <b>Bundesland:</b>   | Sachsen-Anhalt  |   |               |
| <b>Name:</b>   | Wiesen und Quellbusch bei Radegast  |   |               |
| <b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>                               | 12,1111   | <b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b> | 51,6500       |
| <b>Fläche:</b>   | 52,00 ha  |   |               |
| <b>Vorgeschlagen als GGB:</b>  | Oktober 2000  | <b>Als GGB bestätigt:</b>                 | Dezember 2004 |
| <b>Ausweisung als BEG:</b>   | Dezember 2018   | <b>Meldung als BSG:</b>                   |               |
| <b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b> |   |   |               |
| <b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>    |   |   |               |
| <b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>    | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 |   |               |
| <b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>               |   |   |               |
| <b>Bearbeiter:</b>   |   |   |               |
| <b>Erfassungsdatum:</b>  | Februar 2000  | <b>Aktualisierung:</b>                    | Juli 2020     |
| <b>meldende Institution:</b>   | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))   |   |               |

**TK 25 (Messtischblätter):**

|                                 |      |        |
|---------------------------------|------|--------|
| MTB                             | 4338 | Zörbig |
| <b>Inspire ID:</b>              |      |        |
| <b>Karte als pdf vorhanden?</b> | nein |        |

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

|      |                |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

**Naturräume:**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 500                                 | Östliches Harzvorland           |
| <b>naturräumliche Haupteinheit:</b> |                                 |
| D20                                 | Östliches Harzvorland u. Börden |

**Bewertung, Schutz:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Kurzcharakteristik:</b>          | Extensiv genutzte Mähwiesen in der Fuhneue mit einer stabilen Population von <i>Angelica palustris</i> . Der daran angrenzende Quellbusch ist ein isolierter Erlen-Eschenwald. |
| <b>Teilgebiete/Land:</b>            |  |
| <b>Begründung:</b>                  | Vorkommen einer <i>Angelica palustris</i> -Population und eines isolierten Erlen-Eschenwaldes. Artenreiche Grünlandlebensräume.  |
| <b>Kulturhistorische Bedeutung:</b> | Mit Siedlungen ist nicht zu rechnen. Sümpfe wurden gern zu kultischen Handlungen aufgesucht. Neolithisches Steinbeil könnte von einer Opferhandlung herrühren.                 |
| <b>geowissensch. Bedeutung:</b>     | Holozäne Sedimente über weichselkaltzeitlichen Sedimenten (Tone, Schluffe, Sande u.a.).  |
| <b>Bemerkung:</b>                   | Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Februar 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000 erfolgten Meldung an die EU-KOM.                        |

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

|    |   |      |
|----|---|------|
| F3 | Gehölkulturkomplex                          | 1 %  |
| H  | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte        | 62 % |
| L  | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 34 % |
| V  | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe                    | 3 %  |

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name    | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|--------|-----------------|-----|--------|-----|---------|-----------|----------|
| 4338-302      |        | 0049KÖT         | LSG | b      | /   | Fuhneae | 1.452,00  | 0        |
| 4338-302      |        | 0049BTF         | LSG | b      | -   | Fuhneae | 1.090,00  | 100      |

**Legende**

| Status                                 | Art  |
|--|--|
| b: bestehend                           | *: teilweise Überschneidung  |
| e: einstweilig sichergestellt          | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant                             | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)  |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend  |
|  | =: deckungsgleich  |

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

|  |
|--|
| Durch Aufgabe der Grünlandnutzung gefährdet. |
|--|

**Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:**

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
|      |             |      |               |     |

**Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:**

| Code | Bezeichnung | Rang                   | Verschmutzung | Ort       |
|------|-------------|------------------------|---------------|-----------|
| A03  | Mahd        | hoch (starker Einfluß) |               | innerhalb |

**Management:**

**Institute**

|  |
|--|
| LSA: LK Anhalt-Bitterfeld<br>Landkreis Anhalt-Bitterfeld Amt für Naturschutz, Forsten und Abfallwirtschaft - Untere Naturschutzbehörde |
|--|

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
|                 |      |

**Erhaltungsmassnahmen:**

|  |
|--|
| Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA) |
|--|

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name  | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel-Grö. N | rel-Grö. L | rel-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)  | 0,3440      |    |    | G           | B    |            |            | 1          | B          |           |           | C         | 2003 |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe                               | 0,0760      |    |    | G           | D    |            |            | 1          |            |           |           |           | 2003 |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)                          | 0,2060      |    |    | G           | C    |            |            | 1          | C          |           |           | B         | 2006 |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)                          | 2,5720      |    |    | G           | C    |            |            | 1          | B          |           |           | B         | 2006 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 19,2900     |    |    | G           | B    |            |            | 1          | A          |           |           | B         | 2003 |

### Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name   | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel-Grö. N | rel-Grö. L | rel-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|--|---|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| LEP   | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] |   |    | r      | kD         | p          |            |            | 1          | n          | B          |           |           | B         | II   | 2005 |
| PFLA  | Angelica palustris [Sumpf-Engelwurz]                       |   |    | r      | kD         | 6          | 5          | 5          | 3          | w          | B          | B         | B         | B         | II   | 2013 |

### weitere Arten

| Taxon | Code     | Name  | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|---|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| AMP   | RANAARVA | Rana arvalis [Moorfrosch]   |   |    | X       |        | r      | p          | g     | 2004 |
| AMP   | RANATEMP | Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]                                     |   |    |         | X      | r      | p          | g     | 2004 |
| PFLA  | CAREDIS  | Carex distans [Entferntährige Segge]  |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |
| PFLA  | CENTPULC | Centaurium pulchellum [Kleines Tausendgüldenkraut]                          |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |
| PFLA  | COLCAUTU | Colchicum autumnale [Herbst-Zeitlose]                                       |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |
| PFLA  | CYPEFUSC | Cyperus fuscus [Braunes Zypergras]  |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |
| PFLA  | DACTMAJA | Dactylorhiza majalis [s.str.] [Breitblättriges Knabenkraut]                 |   |    |         |        | r      | p          | g     | 1999 |
| PFLA  | JUNCSUBN | Juncus subnodulosus [Stumpfblütige Binse]                                   |   |    |         |        | r      | p          | g     | 1999 |
| PFLA  | MOLICAER | Molinia caerulea [s.l.] (= Molinia caerulea agg. [Artengruppe Pfeifengras]) |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |
| PFLA  | SUCCPRAT | Succisa pratensis [Gewöhnlicher Teufelsabbiß]                               |   |    |         |        | r      | p          | t     | 1999 |

### Legende

| Grund   | Status   |
|---|--|
| e: Endemiten  | a: nur adulte Stadien  |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)                                       | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)                |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig                     |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)              | g: Nahrungsgast  |
| l: lebensraumtypische Arten   | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)          |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)                                   | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |

|  |  |
|--|--|
| o: sonstige Gründe   | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)                                     |
| s: selten (ohne Gefährdung)  | r: resident  |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung    | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise                         |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung          | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| <b>Populationsgröße</b>  | u: unbekannt   |
| c: häufig, große Population (common)                                 | w: Überwinterungsgast  |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)                            |  |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)                     |  |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) |  |

**Literatur:**

| Nr.              | Autor          | Jahr | Titel   | Zeitschrift   | Nr.   | Seiten    | Verlag                                   |
|------------------|----------------|------|---|---|-------|-----------|--|
| ST63203108682321 | ...            | 2000 | Sicherung und Förderung des Naturraumpotentials der Fuhneae mit Angaben zur Pflege und Entwicklung (LSG0049BTF, Landkreis Bitterfeld) | Frank Meyer   |       |           | RANA-Büro für Ökologie und Naturschutz   |
| ST63203108353428 | Kleinke, J.    | 1964 | Ackerunkraut- und Wiesengesellschaften der Fuhneniederung   | Dipl.-Arb.  |       |           | MLU Halle-Wittenberg, Inst.f.syst.Botan. |
| ST63203108580825 | Krumbiegel, A. | 2000 | Floristische Neu- und Wiederfunde in der Fuhneae im Landkreis Bitterfeld  | Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt | Jg. 5 | 211 - 218 |  |
| ST63203108477016 | Krumbiegel, A. | 1986 | Floristische Untersuchungen im Gebiet der Fuhneae zwischen Gröbzig und Zehbitz (Saalkreis, Kreise Köthen und Bitterfeld)              | Dipl.-Arb.  |       |           | Pädagog. Hochschule                      |

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung  
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2003/2006  
 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2003

**Dokumentationslink:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Eigentumsverhältnisse:**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Bund</b>                             | 0 % |
| <b>Land</b>                             | 0 % |
| <b>Kommunen</b>                         | 0 % |
| <b>Sonstige</b>                         | 0 % |
| <b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b> | 0 % |
| <b>Privat</b>                           | 0 % |
| <b>Unbekannt</b>                        | 0 % |