

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4431-304

- Berichtspflicht 2018

**Gebiet**

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| <b>Gebietsnummer:</b>  | 4431-304  | <b>Gebietstyp:</b>                        | B             |
| <b>Landesinterne Nr.:</b>  | FFH0121   | <b>Biogeografische Region:</b>            | K             |
| <b>Bundesland:</b>   | Sachsen-Anhalt  |   |               |
| <b>Name:</b>   | Thyra im Südharz  |   |               |
| <b>geografische Länge (Dezimalgrad):</b>                               | 10,9544   | <b>geografische Breite (Dezimalgrad):</b> | 51,5292       |
| <b>Fläche:</b>   | 21,00 ha  |   |               |
| <b>Vorgeschlagen als GGB:</b>  | Oktober 2000  | <b>Als GGB bestätigt:</b>                 | Dezember 2004 |
| <b>Ausweisung als BEG:</b>   | Dezember 2018   | <b>Meldung als BSG:</b>                   |               |
| <b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b> |   |   |               |
| <b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>    |   |   |               |
| <b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>    | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 |   |               |
| <b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>               |   |   |               |
| <b>Bearbeiter:</b>   |   |   |               |
| <b>Erfassungsdatum:</b>  | Februar 2000  | <b>Aktualisierung:</b>                    | Juli 2020     |
| <b>meldende Institution:</b>   | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))   |   |               |

**TK 25 (Messtischblätter):**

|                                 |      |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| MTB                             | 4331 | Hasselfelde         |
| MTB                             | 4431 | Stolberg (Harz)     |
| MTB                             | 4531 | Heringen (Helme)    |
| MTB                             | 4532 | Kelbra (Kyffhäuser) |
| <b>Inspire ID:</b>              |      |                     |
| <b>Karte als pdf vorhanden?</b> | nein |                     |

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

|      |                |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

**Naturräume:**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 382                                 | Unterharz                           |
| 485                                 | Südharzer Zechsteingürtel           |
| 487                                 | Helme-Unstrut-Niederung             |
| 488                                 | Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland |
| <b>naturräumliche Haupteinheit:</b> |                                     |
| D37                                 | Harz                                |

**Bewertung, Schutz:**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Kurzcharakteristik:</b> | Naturnaher Bachlauf. |
| <b>Teilgebiete/Land:</b>   |                      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Begründung:                  | Lebensraum bedrohter, Fließgewässer bewohnender Arten, z.B. Gropppe und Bachneunauge.              |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Dichte Besiedlung seit der Urgeschichte insbesondere im Mittelalter.                               |
| geowissensch. Bedeutung:     | Gipskarstlandschaft des Südharzer Zechsteinausstriches, subrosive käldeozoische Akkumulationszone. |
| Bemerkung:                   |  |

### Biotopkomplexe (Habitatklassen):

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| D | Binnengewässer | 100 % |
|---|----------------|-------|

### Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer   | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name                                    | Fläche-Ha  | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|---|------------|----------|
| 4431-304      |          | BR0003          | BR  | b      | *   | Karstlandschaft Südharz                 | 30.024,00  | 81       |
| 4431-304      | 4431-301 | F97/S30         | EGV | b      | /   | Buchenwälder um Stolberg                | 3.678,00   | 0        |
| 4431-304      | 4533-301 | FFH0134         | FFH | b      | /   | Gewässersystem der Helmeniederung       | 239,00     | 0        |
| 4431-304      | 4431-302 | FFH0100         | FFH | b      | /   | Alter Stolberg und Heimkehle im Südharz | 85,00      | 0        |
| 4431-304      |          | 0065SGH         | LSG | b      | *   | Helmestausee Berga-Kelbra               | 1.097,00   | 6        |
| 4431-304      |          | 0032SGH         | LSG | b      | *   | Harz und südliches Harzvorland          | 34.745,00  | 47       |
| 4431-304      |          | NUP0004         | NP  | b      | *   | Harz/Sachsen-Anhalt                     | 166.054,00 | 86       |
| 4431-304      |          | NSG0160         | NSG | b      | *   | Gipskarstlandschaft Heimkehle           | 63,00      | 0        |

### Legende

| Status                                 | Art  |
|--|--|
| b: bestehend                           | *: teilweise Überschneidung  |
| e: einstweilig sichergestellt          | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant                             | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)  |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend  |
|  | =: deckungsgleich  |

### Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

|  |
|--|
|  |
|--|

### Gefährdung (nicht für SDB relevant):

|                                      |
|--------------------------------------|
| Veränderung an der Gewässerstruktur. |
|--------------------------------------|

### Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code   | Bezeichnung   | Rang                                | Verschmutzung | Ort        |
|--------|---|-------------------------------------|---------------|------------|
| A07    | Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)         | hoch (starker Einfluß)              |               | ausserhalb |
| A08    | Düngung   | hoch (starker Einfluß)              |               | ausserhalb |
| F02.03 | Angelsport, Angeln  | gering (geringer Einfluß)           |               | innerhalb  |
| J02.02 | Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern                             | mittel (durchschnittlicher Einfluß) |               | innerhalb  |
| J02.10 | Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung | mittel (durchschnittlicher Einfluß) |               | innerhalb  |

### Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
|      |             |      |               |     |

### Management:

## Institute

LSA: LK Mansfeld-Südharz  
Landkreis Mansfeld-Südharz Untere Naturschutzbehörde

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

## Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
|                 |      |

## Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name   | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|--|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion | 0,9870      |    |    | G           | B    |             |             | 1           | C          |           |           | C         | 2012 |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion | 5,3180      |    |    | G           | B    |             |             | 1           | B          |           |           | C         | 2012 |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  | 0,6230      |    |    | G           | C    |             |             | 1           | B          |           |           | C         | 2012 |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  | 0,0220      |    |    | G           | C    |             |             | 1           | A          |           |           | C         | 2012 |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation   | 0,0051      |    |    | G           | D    |             |             | 1           |            |           |           |           | 2012 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)            | 10,6000     |    |    | G           | B    |             |             | 1           | C          |           |           | B         | 2012 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)            | 2,2000      |    |    | G           | B    |             |             | 1           | B          |           |           | B         | 2012 |

## Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name                            | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|---------------------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| FISH  | Cottus gobio [Groppe]           |   |    | r      | kD         | r          | 2           | 2           | 1           | h          | B          | B         | B         | C         | II   | 2010 |
| FISH  | Lampetra planeri [Bachneunauge] |   |    | r      | kD         | r          | 3           | 3           | 1           | h          | B          | B         | B         | C         | II   | 2010 |
| MAM   | Lutra lutra [Fischotter]        |   |    | r      | kD         | r          |             |             | 1           | h          | B          |           |           | C         | II   | 2011 |
| MAM   | Myotis myotis [Großes Mausohr]  |   |    | r      | kD         | v          |             |             | 1           | h          | B          |           |           | C         | II   | 2007 |

## weitere Arten

| Taxon | Code     | Name                             | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|----------------------------------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| AMP   | RANADALM | Rana dalmatina [Springfrosch]    |   |    | X       |        | r      | p          | g     | 1999 |
| AMP   | RANAESCU | Rana kl. esculenta [Teichfrosch] |   |    |         | X      | r      | p          | k     | 2010 |

|      |          |  |  |  |   |   |   |   |   |      |
|------|----------|--|--|--|---|---|---|---|---|------|
| AMP  | RANATEMP | Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]                                  |  |  |   | X | r | p | k | 2012 |
| AMP  | SALASALA | Salamandra salamandra [Feuersalamander]                                  |  |  |   |   | r | p | t | 1999 |
| AMP  | TRITALPE | Triturus alpestris [Bergmolch]   |  |  |   |   | r | p | t | 1999 |
| AMP  | TRITHELV | Triturus helveticus [Fadenmolch]   |  |  |   |   | r | p | t | 1999 |
| FISH | CARACARA | Carassius carassius [Karausche]  |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |
| FISH | LOTALOTA | Lota lota [Quappe]   |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |
| FISH | NOEMBARB | Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle]) |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |
| FISH | PHOXPHOX | Phoxinus phoxinus [Elritze]  |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |
| FISH | SALMTR_F | Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle])               |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |
| MAM  | MARTMART | Martes martes [Baummarder]   |  |  |   | X | r | p | k | 2012 |
| MAM  | MYOTALCA | Myotis alcaethoe [Nymphenfledermaus]                                     |  |  | X |   | r | v | k | 2007 |
| MAM  | MYOTMYST | Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]                                |  |  | X |   | r | v | k | 2007 |
| MOL  | HELIPOMA | Helix pomatia [Weinbergsschnecke]  |  |  |   | X | r | p | k | 2005 |
| REP  | VIPEBERU | Vipera berus [Kreuzotter]  |  |  |   |   | r | p | g | 1999 |

## Legende

| Grund  | Status   |
|--|--|
| e: Endemiten   | a: nur adulte Stadien  |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)                                      | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)                              |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig                                   |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)             | g: Nahrungsgast  |
| l: lebensraumtypische Arten  | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)                        |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)                                  | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging               |
| o: sonstige Gründe   | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)                                     |
| s: selten (ohne Gefährdung)  | r: resident  |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung                | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise                         |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung                      | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| <b>Populationsgröße</b>  | u: unbekannt   |
| c: häufig, große Population (common)   | w: Überwinterungsgast  |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)  |  |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)                                 |  |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)             |  |

## Literatur:

| Nr.    | Autor      | Jahr | Titel   | Zeitschrift  | Nr.   | Seiten | Verlag                   |
|--------|------------|------|---|--|-------|--------|--------------------------|
| st0169 | ...        | 1997 | Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Harz. | Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt | SH 4  | 364    |                          |
| st0193 | Funkel, C. | 1998 | Bestehende und geplante Schutzgebiete in der Karstlandschaft Südharz  | Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt                       | SH 35 | 48-57  |                          |
| st0245 | Reuter, B. | 1986 | Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle                           |  |       | 96     | Stadtfachausschuss Halle |

## Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.  
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2012

## Dokumentationslink:

|  |
|--|
|  |
|--|

**Eigentumsverhältnisse:**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Bund</b>                             | 0 % |
| <b>Land</b>                             | 0 % |
| <b>Kommunen</b>                         | 0 % |
| <b>Sonstige</b>                         | 0 % |
| <b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b> | 0 % |
| <b>Privat</b>                           | 0 % |
| <b>Unbekannt</b>                        | 0 % |