

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4431-306

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Gebietsnummer: | 4431-306 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | FFH0249 | Biogeografische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | | |
| Name: | Haingrund und Organistenwiese bei Stolberg | | |
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 10,9175 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 51,5736 |
| Fläche: | 14,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | März 2004 | Als GGB bestätigt: | Januar 2008 |
| Ausweisung als BEG: | Dezember 2018 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | | | |
| Erfassungsdatum: | September 2003 | Aktualisierung: | Juli 2020 |
| meldende Institution: | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|-----------------|
| MTB | 4431 | Stolberg (Harz) |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 382 | Unterharz |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D37 | Harz |

Bewertung, Schutz:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Wiesen mit kleinflächigen Kalkquellmooren. |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Artenreiche Wiesen mit eingelagerten, kleinflächigen Kalkquellmooren. |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Mittelalterliche und neuzeitliche Bergbauanlagen belegen eine Nutzung des FFH-Gebietes als Bergbaurevier. |
| geowissensch. Bedeutung: | Es liegen keine Informationen vor. |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----|---|------|
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 77 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 10 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 3 % |
| L7 | Bergmischwaldkomplex | 3 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 7 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|--------------------------------|------------|----------|
| 4431-306 | | BR0003 | BR | b | - | Karstlandschaft Südharz | 30.024,00 | 100 |
| 4431-306 | 4431-301 | F97/S30 | FFH | b | / | Buchenwälder um Stolberg | 3.678,00 | 0 |
| 4431-306 | | 0032SGH | LSG | b | - | Harz und südliches Harzvorland | 34.745,00 | 100 |
| 4431-306 | | NUP0004 | NP | b | - | Harz/Sachsen-Anhalt | 166.054,00 | 100 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|---|
| Das Gebiet ist durch Sukzessionsvorgänge gefährdet. |
|---|

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|--|---------------------------|---------------|-----------|
| A04.03 | Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |
| F04 | Entnahme/ Entfernen von Pflanzen | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |
| F04.01 | Absammeln seltener Pflanzen, von Fundpunkten | gering (geringer Einfluß) | | innerhalb |

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | | | |

Management:

Institute

| |
|--|
| LSA: LK Mansfeld-Südharz Landkreis Mansfeld-Südharz Untere Naturschutzbehörde |
|--|

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
| | |

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 7,9790 | | | G | C | | | 1 | A | | | B | 2006 |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 1,8720 | | | G | C | | | 1 | B | | | C | 2012 |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | 0,3822 | | | G | B | | | 1 | B | | | C | 2012 |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1,5010 | | | G | C | | | 1 | B | | | C | 2012 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|---|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| MAM | Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus] | | | r | kD | p | | | D | h | | | | | II | 2014 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|--|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| MAM | MUSCAVEL | Muscardinus avellanarius [Haselmaus] | | | X | | r | p | k | 2007 |
| PFLA | EPIPALU | Epipactis palustris [Sumpf-Stendelwurz] | | | | | r | v | l | 2016 |
| PFLA | PINGVULG | Pinguicula vulgaris [Gewöhnliches Fettkraut] | | | | | r | r | l | 2016 |

Legende

| Grund | Status |
|---|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| |
|--|
| |
|--|

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|---|--|------|--------|--------|
| ST63203106079508 | Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) | 1997 | Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Landschaftsraum Harz | Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt | SH 4 | 364 S. | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2006/2012 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2012 |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |