

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4637-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	4637-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0144	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Geiselniederung westlich Merseburg		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,9747	geografische Breite (Dezimalgrad):	51,3344
Fläche:	59,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4637	Merseburg (Saale)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

500	Östliches Harzvorland
naturräumliche Haupteinheit:	
D20	Östliches Harzvorland u. Börden

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Binnensalzstelle.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gut ausgeprägte Binnensalzstelle umgeben von Hochstaudenfluren und Mähwiesen.
Kulturhistorische Bedeutung:	Für dieses Gebiet sind bislang keine archäologischen Denkmale bekannt.
geowissensch. Bedeutung:	Holozäne Flußauensedimente mit Relikten weichselkaltzeitlicher Niederterrassen auf Tertiär bzw. Buntsandstein.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

--	--

H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	6 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	63 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	12 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	6 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	9 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4637-301		0079MQ_	LSG	b	-	Geiselaue	158,00	100
4637-301		NSG0230	NSG	b	*	Untere Geiselniederung bei Merseburg	52,00	76

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Veränderung im hydrologischen Regime.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04.03	Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
D02.02	Rohrleitungen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
E02.03	Sonstige Industrie- und Gewerbeflächen	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
E03.03	Bauschuttdeponien und sonstige Feststoffdeponien / inerte Materialien	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
E06	Sonstige Siedlungs-, gewerbliche oder industrielle Aktivitäten	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Saalekreis Saalekreis Untere Naturschutzbehörde
--

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
1340	Salzwiesen im Binnenland	0,4600			G	A			1	A			A	2011
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1580			G	B			1	A			C	2011
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1540			G	B			1	C			C	2011
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	1,1250			G	B			1	B			C	2011
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	0,3000			G	C			1	A			C	2011
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,0450			G	B			1	C			C	2011
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,3470			G	B			1	B			C	2011
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6,1580			G	C			1	B			B	2011
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,8990			G	C			1	C			B	2011

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus]			r	kD	v			D	h					II	2014
MAM	Rhinolophus hipposideros [Kleine Hufeisennase]			r	kD	p	2	2	1	h	C	B	B	C	II	2013
MOL	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]			r	kD	p			1	d	B			C	II	2011
MOL	Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke]			r	kD	p			1	d	B			C	II	2011

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r	p	g	1999
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	1999
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	t	1996
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	p	g	2013
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r	p	t	2013
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2013

MOL	HELIPOMA	Helix pomatia [Weinbergschnecke]				X	r	p	t	2011
PFLA	PLANMAR*	Plantago maritima [s.l.] [Strand-Wegerich]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0189	...	1993	Erstes Wissenschaftliches Symposium 'Bergbaufolgelandschaft Geiseltal' am 24. und 25. April 1993 in Mücheln/Geiseltal	Tagungsbericht		139	Inter.u.Förderver.'Geiselt.

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2011
--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %