



Habitatflächen der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (identisch mit FFH-Gebiet)

Bewertungsstufen (Erhaltungszustand)

- A = Hervorragende Ausprägung
- B = Gute Ausprägung
- C = Mittlere bis schlechte Ausprägung

Bewertung der Gesamthabitatfläche je FFH-Anhang IV-Art

Artkürzel
ID-Nr.: 3xxxx

- B Gesamtbewertung (hier z.B. "Gute Ausprägung")
- Keine Bewertung möglich

Bewertung der Habitatteilflächen mit Erfassungsmethode und Zuordnung zum Erfassungspunkt im Gelände je FFH-Anhang IV-Art

Batcorder ● Artkürzel
ID-Nr.: 9xxxx

Netzfang ● Artkürzel
ID-Nr.: 9xxxx

Wochenstube ● Artkürzel
ID-Nr.: 9xxxx

- Keine Bewertung möglich
- Keine Bewertung möglich
- B Gesamtbewertung (hier z.B. "Gute Ausprägung")

■ Untersuchungsflächen xylobionte Käfer: Nr. 13 und 14 (Artenliste siehe Tabelle in Karte)

Artkürzel mit dt. und wiss. Artnamen FFH-Anhang IV-Arten

- FrFI, Fransenfledermaus (*Myotis nattereri*)
- GrBF, Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*)
- KIBF, Kleine Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*)
- KIAS, Kleiner Abendsegler (*Nyctalus leisleri*)
- MuFI, Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*)
- NyFI, Nymphenfledermaus (*Myotis alcathoe*)
- RHFI, Rauhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*)
- ZwFL, Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)

Artkürzel mit dt. und wiss. Artnamen wertgebenden Arten der Avifauna

- Be, Bekassine (*Gallinago gallinago*)
- Bk, Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
- Gr, Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)
- Hot, Hohltaube (*Columba oenas*)
- Msp, Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)
- Nt, Neuntöter (*Lanius collurio*)
- Swm, Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
- Ssp, Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
- Waw, Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Artkürzel mit dt. und wiss. Artnamen Nahrungsgast Avifauna

- Sst, Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

FFH-Gebietsgrenze (FFH256)
● ● Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen

Maßstab: 1 : 10.000 0 50 100 200 300 400 500 Meter

Kartengrundlage: Topographische Karte im Maßstab 1 : 10.000 (TK 10)

Stand: Dezember 2012

Managementplan für das FFH-Gebiet:
Ostrand der Hohen Schrecke
 Landes-Nr: FFH 256, EU-Nr: DE 4734 303

Karte 5b: Bestand und Bewertung von Habitaten der FFH-Anhang IV-Arten und wertgebende Arten der Avifauna und der xylobionten Käfer

Auftraggeber: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
 Referat 407 - Naturschutz, Landschaftspflege
 Dessauer Str. 70
 06118 Halle (Saale)

Auftragnehmer: Planungsbüro Naturschutz & Wald
 Gerlinde Straka, Paul Krämer
 Karolinenstr. 10
 99310 Arnstadt
 Tel: 03628-66 08 91

| Familie / Wissenschaftlicher Artname | Anzahl Nr. 13 |
|---|---------------|
| KURZFLÜGELKÄFER | |
| <i>Cyphea curtula</i> (ERICHSON, 1837) | 2 |
| <i>Haploglossa villosula</i> (STEPHENS, 1832) | 25 |
| <i>Phloeopora testacea</i> (MANNERHEIM, 1831) | 2 |
| <i>Placusa pumilio</i> (GRAVENH., 1802) | 3 |
| <i>Quedius invreae</i> (GRIDELLI, 1924) | 1 |
| PALPENKÄFER | |
| <i>Bibloporus bicolor</i> (DENNY, 1825) | 1 |
| <i>Euplectus karsteni</i> (REICHENBACH, 1816) | 1 |
| BUNTKÄFER | |
| <i>Tillus elongatus</i> (L., 1758) | 1 |
| MODERKÄFER | |
| <i>Enicmus atriceps</i> HANSEN, 1962 | 3 |
| CORYLOPHIDAE | |
| <i>Clypastraea pusilla</i> (GYLLENHAL, 1810) | 10 |
| POCHKÄFER | |
| <i>Dorcotoma robusta</i> (STRAND, 1938) | 18 |
| PFLANZENKÄFER | |
| <i>Mycetochara axillaris</i> (PAYKULL, 1799) | 7 |
| SCHWARZKÄFER | |
| <i>Corticeus fasciatus</i> (F., 1790) | 1 |
| BLATTHORNKÄFER | |
| <i>Protaetia lugubris</i> (HERBST, 1786) § | 1 |
| HIRSCHKÄFER | |
| <i>Aesalus scarabaeoides</i> (PANZER, 1794) §§ | 3 |
| BOCKKÄFER | |
| <i>Grammoptera abdominalis</i> (STEPHENS, 1831) § | 2 |
| BREITRÜBLER | |
| <i>Enebreutes sepicola</i> (F., 1792) | 1 |

| Familie / Wissenschaftlicher Artname | Anzahl Nr. 14 |
|---|---------------|
| KURZFLÜGELKÄFER | |
| <i>Hapalaraea pygmaea</i> (PAYKULL, 1800) | 1 |
| <i>Haploglossa marginalis</i> (GRAVENH., 1806) | 7 |
| <i>Haploglossa villosula</i> (STEPHENS, 1832) | 66 |
| <i>Phloeopora testacea</i> (MANNERHEIM, 1831) | 2 |
| <i>Phloeostiba plana</i> (PAYKULL, 1792) | 1 |
| <i>Phyllodrepa nigra</i> (GRAVENH., 1806) | 1 |
| <i>Placusa atrata</i> (SAHLBERG, 1831) | 1 |
| <i>Placusa pumilio</i> (GRAVENH., 1802) | 4 |
| PALPENKÄFER | |
| <i>Bibloporus mayeti</i> (GUILLEBEAU, 1888) | 1 |
| <i>Euplectus punctatus</i> (MULSANT, 1861) | 1 |
| BUNTKÄFER | |
| <i>Tillus elongatus</i> (L., 1758) | 1 |
| SCHNELLKÄFER | |
| <i>Elatер ferrugineus</i> (L., 1758) | 1 |
| SCHIENENKÄFER | |
| <i>Dromaeolus barnabita</i> (VILLA, 1838) | 1 |
| MODERKÄFER | |
| <i>Enicmus atriceps</i> HANSEN, 1962 | 1 |
| RINDENKÄFER | |
| <i>Synchita separanda</i> (REITTER, 1881) | 1 |
| CORYLOPHIDAE | |
| <i>Clypastraea pusilla</i> (GYLLENHAL, 1810) | 4 |
| POCHKÄFER | |
| <i>Dorcotoma robusta</i> (STRAND, 1938) | 1 |
| BAUMLÜCKENKÄFER | |
| <i>Euglenes oculatus</i> (PANZER, 1796) | 2 |
| PFLANZENKÄFER | |
| <i>Mycetochara axillaris</i> (PAYKULL, 1799) | 2 |
| BLATTHORNKÄFER | |
| <i>Protaetia lugubris</i> (HERBST, 1786) § | 5 |
| BOCKKÄFER | |
| <i>Grammoptera abdominalis</i> (STEPHENS, 1831) § | 1 |
| <i>Pedostrangalia revestita</i> (L., 1767) § | 2 |
| <i>Phymatodes pusillus</i> (F., 1787) § | 3 |
| <i>Plagionotus detritus</i> (L., 1758) § | 4 |