

## 8 Bibliographie: Arten und Lebensräume im Landschaftsraum Elbe - J. MARX

Die vorliegende Bibliographie umfasst 1.412 Quellenangaben. Veröffentlichungen ohne direkten oder wesentlichen Bezug zu Arten und Lebensräumen im Landschaftsraum Elbe sind am Ende der jeweiligen Kapitel im Textteil auf-

geführt. Dort finden sich auch die unveröffentlichten Quellen (Gutachten, Manuskripte, Diplomarbeiten etc.) und in Vorbereitung befindliche Arbeiten.

- ALBRECHT, M. L. (1960): Die Elbe als Fischgewässer. - wwt Wasserwirtschaft-Wassertechnik **10**: 461-465.
- ALE-AGHA, N., BRAUN, U., FEIGE, B. & JAGE, H. (2000): A new powdery mildew disease on *Aesculus* spp. introduced in Europe. - Cryptogamie, Mycol. **21**: 89-92.
- AMARELL, U. & WELK, E. (1995): *Amelanchier alnifolia* - ein unbeachteter Neophyt in Mitteldeutschland. - Mitt. flor. Kart. Halle **20**: 21-23.
- AMELANG, G. (1887): Die Schmetterlingsfauna der Mosigkauer (Dessauer) Haide. - Berliner Entomol. Z. **31**: 243-287.
- AMMER, K. J. (1998): Die Köcherfliegenfauna ausgewählter Auenstandorte der oberen und unteren Mittelelbe. - Lauterbornia **34**: 75-91.
- ANLAUF, A. & DORN, K. (1996): Das Makrozoobenthos der unteren Saale in Bezug zu Substrat- und Wasserbeschaffenheit. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1995, Berlin: 404-407.
- ARGE Elbe (Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe) (Hrsg.) (1991): Das oberflächennahe Zoobenthos der Elbe als Indikator für die Gewässerqualität. - Hamburg.
- ARGE Elbe (Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe) (Hrsg.) (1993): Biomonitoring des Zoobenthos an ausgewählten Standorten der Elbe. - Hamburg.
- ARGE Elbe (Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe) (Hrsg.) (1994): Makrozoobenthon der Elbe zwischen Schmilka und Cuxhaven. - Hamburg.
- ARNDT, E. (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Gattung *Carabus* LINNÉ (Coleoptera: Carabidae).- Beitr. Entomol. **39**: 63-103.
- ASCHERSON, P. (1859a): Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **1**: 1-26.
- ASCHERSON, P. (1859b): Pflanzengeographische Studien über die Flora der Mark Brandenburg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **1**: 27-41.
- ASCHERSON, P. (1864a): Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogtums Magdeburg. - Verlag August Hirschwald, Berlin.
- ASCHERSON, P. (1864b): Vegetation der Elb- und Oderniederung. Bericht über die sechste Versammlung des Vereins in Wittenberg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **6**: XII-XVII.
- ASCHERSON, P. (1866): Die wichtigeren vom August 1862 bis August 1866 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **8**: 181-184.
- ASCHERSON, P. (1894): Nachtrag zu L. Schneider's Flora von Magdeburg. - Faber'sche Buchdruckerei, Magdburg.
- ASCHERSON, P. & GRAEBNER, P. (1898/99): Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen). - Berlin.
- BACH, W. (1939): Komoran (*Phalacrocorax carbo sinensis* SHAW & NODDER) auf der Elbe bei Magdeburg. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **3**: 43.
- BADEWITZ, H. J., BISCHOFF, W. & JAEGER, D. (1967): Die Amphibien und Reptilien Magdeburgs und seiner näheren Umgebung. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg. **3**: 68-72.
- BAECK, I. & LOREY, H.-G. (1997): Die Vegetation von wiedervernäßigtem Niedermoorgrünland am Rande der Pritzerber Laake. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 36-45.
- BALDAMUS, E. (1852): Verzeichnis der Brutvögel der Umgegend von Diebzig. - Naumannia : Arch. f. Ornith. **2**: 55-58.
- BALZER, I. (1997): Das Vorkommen von potamobionten Chironomidenarten in der Elbe. - Lauterbornia **31**: 99-101.
- BALZER, I. & SCHÖLL, F. (1996): Die Zuckmückenfauna der Elbe. - In: PRANGE, A. et al. (Hrsg.): 7. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Ökosystem Elbe - Zustand, Entwicklung und Nutzung“: 375-378.
- BANNASCH, F. (1972): Brandente, *Tadorna tadorna*, und Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola*, bei Magdeburg. - Beitr. Vogelkd. **18**: 448.
- BANNASCH, F. & HAHN, W. (1972): Am Horst der grauen Reiher. - Unsere Jagd **22**: 211.
- BARTELS, R., FRITZLAR, F., SCHNEIDER, K., SCHÖPKE, H. & WALLASCHKE, M. (1992): Ergebnisse einer Insektenaufsammlung (Saltatoria; Heteroptera; Homoptera; Auchenorrhyncha; Coleoptera) in Bitterfeld und Umgebung (Sachsen-Anhalt). - Kaleidoskop : Z. Pädagogische Hochschule Halle-Köthen **1**: 28-32.
- BARTHEL, P. H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen, Brutzeit 1994. - Limicola **8**: 274-280.
- BAUCH, G. (1957): Der Elblachs (*Salmo salar* L.), seine Biologie und wirtschaftliche Bedeutung. - Z. Fischerei Hilfswiss., N. F. **6**: 241-250.
- BAUCH, G. (1958): Untersuchungen über die Gründe für den Ertragsrückgang der Elbefischerei zwischen Elbsandsteingebirge und Boizenburg. - Z. Fischerei Hilfswiss., N. F. **7**: 361-437.
- BECKER, P. H. (1998): Themenheft Flußseeschwalbe. - Die Vogelwelt : Z. Vogelkd. Vogelschutz **119**: 121-310.
- BECKER, W. (1977): Die Pilzarten des Richterwinkels bei Dessau. - Mykol. Mitt. **21**: 80-83.
- BEHNE, L. (1981): Zur Verbreitung und Biologie bemerkenswerter Rüsselkäferarten im Bezirk Magdeburg. - Entomol. Nachr. **25**: 113-120.
- BEHR, M. (1911): Aus deutschem Biberleben. - Sankt Hubertus **29**: 129-137.
- BEHR, M. (1924): Neues vom Biber. - Sankt Hubertus **42**: 481-483.
- BEHR, M. (1926): Zur Erhaltung und Hebung des Biberbestandes. - Sankt Hubertus **44**: 65-66.
- BEHR, M. (1927): Ein Spaziergang ins Bibergebiet. - Sankt Hubertus **45**: 305-306.
- BELLSTEDT, R. (1982): *Hydrochus ignicollis* MOTSCHULSKY, 1860 in der DDR (Col., Hydraenidae). - Entomol. Nachr. Ber. **26**: 79-81.
- BELLSTEDT, R. & BÄHRMANN, R. (1989): Beitrag zur Kenntnis Thüringer Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae). 3. Teil. - Entomol. Nachr. Ber. **33**: 217-220.
- BELLSTEDT, R. & REUSCH, H. (1993): Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae). - Braunschweiger Naturkd. Schr. **4**: 241-245.
- BELLSTEDT, R. & SPITZENBERG, D. (1994): Neue Nachweise des

- Wasserkäfers *Anacaena bipustulata* (MARSHAM, 1802) in Ostdeutschland (Col.; Hydrophilidae). - Entomol. Nachr. Ber. **38**: 203-204.
- BENICK, L. (1921): Beiträge zur Käferfauna des Nordelbischen Gebiets. - Arch. Naturgesch. **A 12**: 66-139.
- BENKERT, D. (1991): Bemerkenswerte Ascomyceten der DDR. 12. Sarcoscyphaceae und Sarcosomataceae (Pezizales). - Gleditschia **19**: 173-201.
- BENKERT, D., DÖRFELT, H. & KREISEL, H. (1993): Karten zur Pilzverbreitung in den nordöstlichen Bundesländern. 8. Serie, ausgewählte Makromycten (III). - Gleditschia **21**: 47-75.
- BENKERT, D., DÖRFELT, H. & KREISEL, H. (1993): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 10. Serie, ausgewählte Makromycten (IV). - Gleditschia **21**: 301-334.
- BENKERT, D., FUKAREK, F. & KORSCH, H. (Hrsg.) (1996): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. - Gustav Fischer Verlag, Jena.
- BERBIG, A. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Lurche und Kriechtiere. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **5H**: 30-31.
- BERBIG, A. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Krestiere. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **5H**: 34.
- BERG, C. (1989): Die Moosflora der DDR. Bibliographie 1945-1987. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1989/30** (P **37**).
- BERG, J., JAKOBS, W. & SACHER, P. (1988): Lurche und Kriechtiere im Kreis Wittenberg. - Schr.-R. Mus. Natur-Völkerkd. „Julius Riemer“ Wittenberg **4**: 1-80.
- BERGER, H. (1956): Kleine Mitteilungen Nr. 1560: *Gyrinus natator* L. - Entomol. Blätter **52**: 188.
- BERGER, K. (1967): *Leucopaxillus tricolor* (PECK) Kühner Hake bei Halberstadt. - Mykol. Mitt. **11**: 17-19.
- BERNDT, H. (1998): Der ungestielte Zwergmuschel, *Resupinatus trichotus*, in der Muldaue bei Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **10**: 86-89.
- BERNDT, R. (1937): Bergenten, *Nyroca m. marila* (L.), bei Steckby a. d. Elbe. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 12-13.
- BERNDT, R. (1937): Die Dreizehenmöve, *Rissa t. tridactyla* (L.), im Mittelbegebiet. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 7-10.
- BERNDT, R. (1937): Kormorane auf der Mittelbe im Frühjahr 1937. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 20.
- BERNDT, R. (1937): Schwarzkopfmöve, *Larus melanocephalus* TEMM., auf dem Herbstzuge an der Mittelbe. - Ornith. Monatsber. **45**: 69-70.
- BERNDT, R. (1937): Trauerente in Anhalt: 1. Trauerente, *Oidemia nigra* (L.), auf der Elbe bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 10-11.
- BERNDT, R. (1938): Der Erlenzeisig, *Carduelis spinus* (L.), Brutvogel bei Steckby in Anhalt. - Ornith. Monatsber. **46**: 155.
- BERNDT, R. (1938): Erneut Trauerente und Dreizehenmöve bei Steckby a. d. Elbe. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 14.
- BERNDT, R. (1938): Mittelsäger, *Mergus serrator* L., auf der Elbe bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 39.
- BERNDT, R. (1938): Samtente, *Oidemia f. fusca* (L.), auf der Elbe bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 13.
- BERNDT, R. (1938): Silbermöwen, *Larus argentatus* PONTOPP., an der Elbe bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 44-45.
- BERNDT, R. (1938): Sturmmöwen, *Larus canus* L., an der Mittelbe im Winter 1937/38. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 14.
- BERNDT, R. (1939): Erneut Sturm- und Silbermöve an der Elbe bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **3**: 47.
- BERNDT, R. (1939): Seidenschwanz, Ringdrossel, Schreiadler, Schwarzstorch und Goldregenpfeifer bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **3**: 39.
- BERNDT, R. (1939): Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.), bei Steckby in Anhalt. - Ornith. Monatsber. **47**: 15.
- BERNDT, R. (1940): Eine zweite Beobachtung des Mittelsägers, *Mergus serrator* L., im Winter 1938/39 bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 61-62.
- BERNDT, R. (1940): Horntaucher (*Podiceps auritus* L.) bei Steckby. - Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 45-46.
- BERNDT, R. (1940): Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF), bei Steckby. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 58-60.
- BERNDT, R. (1940): Sommervorkommen eines jungen Weisrückenspechtes, *Dryobates l. leucotus* (BECHST.), im Mittelbegebiet. - Ornith. Monatsber. **48**: 83-84.
- BERNDT, R. (1941): Eine Gänssäger-Begattung im Mittelbe-Gebiet. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **5**: 12.
- BEYER, R. (1964): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Landisopoden in Mitteldeutschland. - Zool. Jb. Syst. Ökol. **91**, 341-402.
- BIRKE, P. & HEISE, U. (1978): Ergebnisse einer ornithologischen Bestandserfassung im Naturschutzgebiet „Rößling“ bei Dessau-Mosigkau in den Jahren 1976 und 1977. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **1**: 83-92.
- BIRTH, M. & NICOLAI, B. (1972): Die Brandgans, Brutvogel in der Elbaue bei Burg. - Der Falke **19**: 238-241.
- BISCHOFF, H.-M. (1982): Aussaat und Bewirtschaftung neuer Gräserbestände auf überflutungsbeeinflussten Flußauenstandorten im Gebiet der mittleren Elbe. - Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle.
- BLASIUS, J. H. (1857): Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. - Braunschweig.
- BLISS, P. (1981): Zur Verbreitung von *Opilio ravennae* Spöck in der DDR (Arachnida, Opiliones). - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **8**: 87-90.
- BLISS, P. (1990): Zur Verbreitung von *Opilio canestrinii* (Thorell) in der Deutschen Demokratischen Republik (Arachnida: Opiliones, Phalangiidae). - XI International Congress of Arachnology, Turku, Finland, 07.-12. August 1989. - Acta Zool. Fennica **190**: 41-44.
- BLISS, P. & HIEBSCH, H. (1984): Verzeichnis der Weberknechte (Arachnida, Opiliones) für das Gebiet der DDR. - Entomol. Nachr. Ber. **28**: 199-200.
- BODE, H., LOTT, K. & MERZ, U. (1997): Weinberghaus und Weinberg - Rekonstruktion und Nutzung als Naturschutz-Informationszentrum und öffentlicher Veranstaltungsbereich. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5H**: 114-120.
- BOGEN, A. (1929/38): Ein Biberdamm bei Magdeburg. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **6**: 263-266.
- BÖHME, F. (1966): Die Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), in der Elbniederung bei Wittenberg Lutherstadt. - Beitr. Vogelkd. **11**: 302-312.
- BÖHME, F. (1968): Einige bemerkenswerte Beobachtungen in der Elbniederung bei Wittenberg. - Beitr. Vogelkd. **14**: 92.
- BÖHME, F. (1971): Regenbrachvogel bei Bösewig. - Apus **2**, **4**: 192.
- BÖHME, F. (1974): Brutete der Schwarzstorch im Auwald bei Wittenberg? - Der Falke **21**: 418-419.
- BÖHME, F. (1974): Einige weitere bemerkenswerte Beobachtungen in der Elbniederung bei Wittenberg. - Beitr. Vogelkd. **20**: 155-157.
- BÖHME, F. & ZUPPKE, U. (1974): Der Bestand des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im Kreis Wittenberg (Bezirk Halle) von 1955 bis 1970. - Beitr. Vogelkd. **20**: 67-104.
- BÖHME, F. & ZUPPKE, U. (1976): Der Bestand des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im Kreis Wittenberg (Bezirk Halle) von 1971 bis 1975. - Beitr. Vogelkd. **22**: 161-166.
- BÖHNERT, W. & REICHHOFF, L. (1978): Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“ V.

- Die Silbergras-Pionierfluren und Schwingel-Sandrasen - Corynephoretea und Sedo-Scleranthetea. - *Hercynia*, N. F. **15**: 106-114.
- BÖHNERT, W. & REICHHOFF, L. (1981a): Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Rößling“ bei Dessau-Mosigkau. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **2**: 53-62.
- BÖHNERT, W. & REICHHOFF, L. (1981b): Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Krägen-Riß“ im Mittelelbegebiet bei Wörlitz. - *Arch. Nat.schutz Landsch.forsch.* **21**: 67-91.
- BÖHNERT, W. & REICHHOFF, L. (1983): Das Naturschutzgebiet „Bucher Brack und Bölsdorfer Haken“. Teil 2: Floristische Ergänzungen und Hinweise zur Nutzung des Gebietes. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **20**: 37-40.
- BÖHNERT, W. & REICHHOFF, L. (1990): Das Naturschutzgebiet „Bucher Brack und Bölsdorfer Haken“. Vegetationskundliche Inventarisierung als Grundlage für die Konkretisierung von Schutzziel und Behandlung. - *Arch. Nat.schutz Landsch.forsch.* **30**: 13-44.
- BÖHNERT, W. & ZÖRNER, G. (1979): Beitrag zur Kenntnis des erweiterten Naturschutzgebietes „Rogätzer Hang“. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **16**: 14-38.
- BÖHNERT, W., HECHT, G. & STAPPERFENNE, H.-J. (1986): Orchideen des Bezirkes Halle, einst und jetzt. - *Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg.* **23 BH**: 3-59.
- BOLENDER, E., PRUME, L., STEINHAUSER, A. & TROTTMANN, R. (1999): Ermittlung und Erhaltung des floristischen Potentials von Nanocyperion-Gesellschaften der Mittelelbe mit Hilfe der Diasporenbankanalyse - In: Forschungsverbund Elbe-Ökologie (Hrsg.): Fachtagung Elbe - Dynamik und Interaktion von Fluß und Aue, Tagungsband der Fachtagung 04.-07.05.1999, Wittenberge: 253-254.
- BORCHARD, B. (1992): Gewässerunterhaltungsplan Mittelelbe km 438-471; Befischungsmethoden und -ergebnisse. - Bericht, Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg.
- BORCHERT, W. (1925): Die Vogelwelt der Umgebung von Schönebeck (Elbe). - *Abh. Ber. Mus. Natur- Heimatkd. Magdeburg* **4**: 4-60.
- BORCHERT, W. (1935): Wichtige Käferfunde aus der weiteren Umgebung von Magdeburg. - *Entomol. Blätter* **31**: 197-202.
- BORCHERT, W. (1937): Mitteilungen über die Käfer Ostfalens. - *Entomol. Blätter* **33**: 66-72, 146-154.
- BORCHERT, W. (1951): Die Käferwelt des Magdeburger Raumes. - *Magdeburger Forsch. Band 2*: Halle.
- BORCHERT, W. (1969): Berichtigungen und Nachträge zu „Die Käferwelt des Magdeburger Raumes“. Magdeburg 1951. - *Mitt. Dt. Entomol. Ges.* **28**: 55.
- BORNE, M. v. dem (1882): Die Fischereiverhältnisse des Deutschen Reiches, Österreichs, Ungarns, der Schweiz und Luxemburgs. - Moeser Verlag, Berlin.
- BORNEMANN, G. (1912): Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Magdeburg und des Harzgebietes. - *Abh. Ber. Mus. Natur- Heimatkd. Magdeburg* **2**: 163-251.
- BRAASCH, D. (1988): Zum Vorkommen von *Macronychus quadrituberculatus* MÜLLER (Col., Dryopidae) in der DDR. - *Entomol. Nachr. Ber.* **32**: 92.
- BRAASCH, D. (1989): *Agabus uliginosus* (L., 1761) - eine bivoltine Art? - *Entomol. Nachr. Ber.* **33**: 91-93.
- BRAASCH, D. & BELLSTEDT, R. (1991): *Dytiscus semisulcatus* MÜLLER, 1776 - ein Bewohner von Meliorationsgräben (Coleoptera: Dytiscidae). - *Koleopt. Rdsch.* **61**: 21-24.
- BRAASCH, D. & KEMPF, L. (1988): Zum Auftreten von *Lacophilus variegatus* (GERMAR, 1812) (Coleoptera, Dytiscidae) als Moorbewohner in der norddeutschen Tiefebene. - *Noivius* **7**: 101-104.
- BRAASCH, D. & STÖCKEL, G. (1988): Faunistische Notizen 306: Zum gegenwärtigen Vorkommen von *Agabus fuscipennis* (PAYKULL, 1798) in der DDR. - *Entomol. Nachr. Ber.* **32**: 41.
- BRACHT, H. (1999): Hartholzauen an der Unteren Mittelelbe zwischen Havelberg und Lauenburg - Vegetation, Störfaktoren und mitteleuropäischer Vergleich. - In: HÄRDLE, W. (Hrsg.): Die Elbtalau - Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flußlandschaft. - Festschrift aus Anlaß der Emeritierung von Prof. Dr. Ulf Amelung: 123-135.
- BRANDES, D. & SANDER, C. (1995): Neophytenflora der Elbufer. - *Tuexenia* **15**: 447-472.
- BRANDES, D. & SANDER, C. (1995b): Die Vegetation von Ufermauern und Uferpflasterungen an der Elbe. - *Braunschweiger Naturkd. Schr.* **4**: 899-912.
- BRÄSE, M. (1991): Rastende Saat- und Bleißgänse in der Elbaue. - *Der Falke* **38**: 374.
- BRÄUER, G. & HERZOG, M. (1997): Muldeae in Sachsen-Anhalt. Landschaftswandel - Entwicklungsziele in der mit Schadstoffen belasteten Muldeae. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* **34, SH**: 47-49.
- BRAUN, U. (1992): Die Rostpilze (*Uredinales*) der Deutschen Demokratischen Republik. - *Feddes Repertorium* **93**: 213-333.
- BRÄUNICKE, M. & TRAUTNER, J. (1999): Die Ahlenläufer-Arten der Bembidion-Untergattungen *Bracteon* und *Odontium*. Verbreitung, Bestandssituation, Habitate und Gefährdung charakteristischer Flußaue-Arten in Deutschland. - *Angew. Carabidologie, Suppl. I (Laufkäfer in Auen)*: 79-94.
- BRÄUTIGAM, S. & KUHN, H.-J. (1983): *Puccinia trautvii* ROUM. & SACC. - ein ungewöhnlicher Rostpilz an Gewächshausgurken (*Cucumis sativus* L.). - *Nachr.bl. Pflanzenschutz DDR* **2**: 43-44.
- BREUER, G. (1998): Bestandsentwicklung heimischer Orchideen. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **SH**: 5-16.
- BRIEDERMANN, L. (1971): Die Migration des Elches (*Alces alces* L., 1758) in Mitteleuropa von 1957 bis Ende 1966. - *Lynx, ser. nov.* **12**: 5-24.
- BRIESEMEISTER, E. (1971): Der Bestand des Kiebitzes - *Vanelus vanellus* (L.) - in der Elbaue bei Magdeburg. - *Apus* **2**, **4**: 161-164.
- BRIESEMEISTER, E. (1973): Zum Brutbestand des Kiebitzes im Jahre 1972 in der Magdeburger Elbaue und der Magdeburger Börde. - *Apus* **3**, **1**: 98-102.
- BRIESEMEISTER, E. (1985): Weitere zehnjährige Bestandserfassung des Kiebitz in der Elbaue bei Magdeburg. - *Apus* **6**, **1**: 10-17.
- BRIESEMEISTER, E. (1994): Das Bleißhuhn in Magdeburg - Versuch einer Bestandserfassung. - *Apus* **8**, **6**: 256-264.
- BRIESEMEISTER, E. (1995): Die Alte Elbe in Magdeburg - ein Aufzuchtgewässer für junge Brandgänse (*Tadorna tadorna*). - *Ornith. Jahresber. Mus. Heineanum* **13**: 125-131.
- BRIESEMEISTER, E. & SEELIG, K.-J. (1984): Zum Auftreten von Lach- (*Larus ridibundus*), Sturm- (*Larus canus*) und Sibermöwe (*Larus argentatus*) im Mittelelbegebiet während des Winterhalbjahres. - *Ornith. Jahresber. Mus. Heineanum* **8/9**: 17-23.
- BRIESEMEISTER, E., STEIN, H. & SEELIG, K.-J. (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Teil 1. - Magdeburg.
- BRIESEMEISTER, E., STEIN, H. & SEELIG, K.-J. (1988): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Teil 2. - Magdeburg.
- BRUNKEN, H. & BRÜMMER, I. (1993): Fischereiliches Gutachten über Fischbestand und -ertrag an der Mittelelbe km 438-471 einschließlich Altarme und stehende Gewässer - Langzeituntersuchungen mittels Netzbefischung. - Gutachten i. A. Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz.
- BUCHHOLZ, S. (1968): Die gegenwärtige Verbreitung des Marderhundes in Mitteleuropa. - *Unsere Jagd* **17**: 213.
- BUHL, A. & SCHWAB, M. (1976): Geologische Verhältnisse und Pflanzenverbreitung im Hercynischen Raum. - *Hercynia*, N. F. **13**: 380-390.



- BÜRGER, M. (1972): Robbe in der Elbe bei Magdeburg. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **12**: 231-235.
- BURKART, M. (1997): Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde im Gebiet der unteren Havel aus den Jahren 1995 und 1996. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 46-51.
- BURKART, M. (1998): Die Grünlandvegetation der unteren Havelaue in synökologischer und syntaxonomischer Sicht. - Arch. Naturwiss. Diss. **7**.
- BURKART, M. & PRASSE, R. (1996): Zur pflanzlichen Besiedelung wechsellasser Pionierstandorte im Elb-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 38-50.
- BURKART, M., KUMMER, V. & FISCHER, W. (1995): Floristische Neu- und Wiederfunde im Gebiet der Unteren Havel. - Mitt. flor. Kart. Halle **20**: 24-36.
- BURKART, W. (1994): Libellenbeobachtungen bei Havelberg (Odonata). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 53-55.
- BUSCHENDORF, J. (1984): Kriechtiere und Lurche des Bezirkes Halle. Darstellung des gegenwärtigen Kenntnisstandes der Verbreitung. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **21**: 3-28.
- BUSCHENDORF, J. (1994): Vorkommen der Kreuzkröte in Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Biologie und Ökologie der Kreuzkröte) **14**: 12-13.
- BUSCHENDORF, J. (1996): Die Verbreitung der Rotbauchunke in Sachsen-Anhalt. - RANA Sonderheft **1**: 78-86.
- BÜTTNER, M., LEMME, S., BRAUN, J., FRIEDRICHS, T. (1987/93): Avifaunistischer Jahresbericht Stendal 1987-1993. - Stendal.
- BUTZECK, S., STUBBE, M. & PIECHOCKI, R. (1988a): Beiträge zur Geschichte der Säugetierfauna der DDR. Teil 1: Der Braunbär (*Ursus arctos* LINNÉ, 1758). - Hercynia, N. F. **25**: 27-59.
- BUTZECK, S., STUBBE, M. & PIECHOCKI, R. (1988b): Beiträge zur Geschichte der Säugetierfauna der DDR. Teil 2: Der Luchs (*Lynx lynx* LINNÉ, 1758). - Hercynia, N. F. **25**: 144-168.
- BUTZECK, S., STUBBE, M., PIECHOCKI, R. (1988c): Beiträge zur Geschichte der Säugetierfauna der DDR. Teil 3: Der Wolf (*Canis lupus* LINNÉ, 1758). - Hercynia, N. F. **25**: 278-317.
- CHRISTIAN, A. (1985): Köcherfliegen-Lichtfallenfänge in der unteren Havelniederung. - Entomol. Nachr. Ber. **29**: 175-178.
- CHRISTIAN, A. (1999): Köcherfliegenfunde aus dem Elb-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **9**: 36-44.
- CIUPA, W. (1986): Neuer und westlichster Fundort von *Opi-lo pallidus* (OLIVIER) für die DDR aus dem Bezirk Magdeburg (Col., Cleridae). - Entomol. Nachr. Ber. **30**: 125.
- CLAUSING, P. (1970): Zum Vorkommen der Seeschwalben - Sternidae - im Mittelelbegebiet. - Apus **2**, **2**: 82-88.
- CONRAD, R. & DUNGER, I. (1995): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 12. Serie, ausgewählte Milchlinge. - Gleditschia **23**: 105-143.
- CURTH, P. (1985): Einige Ergebnisse 10jähriger Pilzstatistik im Kälzauer Forst bei Burg (Bez. Magdeburg). - Boletus **9**: 20-32.
- DAVERHUTH, H. (1965): Die Kreuzhorst bei Magdeburg - ein Naturschutzgebiet. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **2**: 8-26.
- DIECKMANN, L. (1961a): Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer. - Entomol. Blätter **57**: 58-64.
- DIECKMANN, L. (1961b): Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer (Fortsetzung und Schluß). - Entomol. Blätter **57**: 65-75.
- DIECKMANN, L. (1972): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Ceutorhynchinae). - Beitr. Entomol. **22**: 3-128.
- DIECKMANN, L. (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). - Beitr. Entomol. **24**: 5-54.
- DIECKMANN, L. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Apioninae). - Beitr. Entomol. **27**: 7-143.
- DIECKMANN, L. (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Brachycerinae, Otiorynchinae, Brachyderinae). - Beitr. Entomol. **30**: 145-310.
- DIECKMANN, L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). - Beitr. Entomol. **33**: 257-381.
- DIECKMANN, L. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Erihinae). - Beitr. Entomol. **36**: 119-181.
- DIECKMANN, L. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Curculionidae: Curculioninae: (Ellescini, Acalyptini, Tychini, Anthonomini, Curculionini). - Beitr. Entomol. **38**: 365-468.
- DIEDICKE, H. (1897): Beobachtungen des Herrn Pastor MÜLLER in der Flora von Delitzsch. - Ibid **11**: 8.
- DIELITZSCH, E. (1935): Zwergmöwe - *Larus minutus* PALL. - während des Herbstdurchzuges bei Klieken/Anhalt beobachtet. - Beitr. Avifauna Anhalts **4**: 15-16.
- DIELITZSCH, E. (1937): *Calidris ferruginea* (BRÜNN) im Herbst 1935 bei Klieken/Anh. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 18.
- DIELITZSCH, E. (1937): *Limosa lapponica lapponica* (L.) bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 17.
- DIELITZSCH, E. (1940): *Locustella fl. fluviatilis* (WOLF) bei Dessau-Großkühnau. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 60-61.
- DIELITZSCH, E. (1944): Löffler, *Platalea l. leucorodia* L., bei Klieken in Anhalt. - Ornith. Monatsber. **52**: 52.
- DIEN, J. & LIPPERT, W. (1965): Die Ergebnisse der Elbe-Wasservogelzählungen vom 17.01.1965. - Der Falke **12**: 404-406.
- DIEN, J. & LIPPERT, W. (1967): Die Ergebnisse der 2. Elbe-Wasservogel-Zählung vom 16.01.1966. - Der Falke **14**: 26-30.
- DIERKING, H. (1992): Untere Mittel-elbe-Niederung zwischen Qitzhöbel und Sassendorf. Naturschutzfachliche Rahmenkonzeption. - Niedersächsische Landesverwaltungsamt Naturschutz, Hannover.
- DIETZE, H. (1999): Checkliste der Armleuchteralgen (Characeae). - In: FRANK, D. & NEUMANN, V. (Hrsg.): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 146-147.
- DÖHLE, H.-J. (1980): Altersstruktur einer Rötelmauspopulation *Clethrionomys glareolus* (SCHREBER, 1780). - Säugetierkd. Info. **1**: 27-42.
- DÖHLE, H.-J. (1981): Zur Populationsökologie von Kleinnagern im NSG Kreuzhorst bei Magdeburg. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **18**: 15-24.
- DÖHLE, H.-J. & STUBBE, M. (1979): Biometrische Daten einiger Kleinnager (Rodentia: Arvicolidae, Muridae) aus der DDR. - Säugetierkd. Info. **1**: 37-66.
- DÖHLE, H.-J. & STUBBE, M. (1981): Zur Reproduktionsbiologie einiger Kleinnagerarten (Rodentia: Arvicolidae, Muridae) in der DDR. - Zool. Jb. Syst. Ökol. **108**: 117-138.
- DÖHLE, H.-J., LANGE, U. & STUBBE, M. (1991): Variabilität der Wurfgröße bei der Rötelmaus *Clethrionomys glareolus* (SCHREBER, 1780). - In: STUBBE, M., HEIDECHE, D. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Kleinsäugerarten. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1990/34 (P 42)**: 109-121.
- DÖHLE, H.-J., STUBBE, M., LANGE, U. & ALTNER, H.-J. (1984): Zur Dominanz- und Abundanzdynamik von Kleinnagern (Rodentia: Arvicolidae, Muridae) in Auwäldern der mittleren DDR. - Säugetierkd. Info. **2**: 115-136.
- DOLCH, D. (1995): Beiträge zur Säugetierfauna des Landes Brandenburg - Die Säugetiere des ehemaligen Bezirkes Potsdam. - Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg **3**: SH.
- DOLCH, D., TEUBNER, J. & TEUBNER, J. (1998): Haupttodesursachen des Fischotters - *Lutra lutra* (L., 1758) - im Land Brandenburg in der Zeit von 1990 bis 1994. - Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg **7**: 101-110.

- DÖRFELT, H. & HEKLAU, H. (1989): Zur Geschichte der pilzflo-  
ristischen Durchforschung der Bezirke Halle und Magde-  
burg. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **26**: 8-17
- DÖRFELT, H., KREISEL, H. & BENKERT, D. (1979): Karten zur  
Pflanzenverbreitung in der DDR. 2. Serie, Die Erdsterne  
(Geastrales). - Hercynia, N. F. **16**: 1-56.
- DÖRFELT, H., KREISEL, H. & BENKERT, D. (1988): Karten zur  
Pflanzenverbreitung in der DDR. 7. Serie, ausgewählte  
Macromyceten. - Hercynia, N. F. **25**: 84-106.
- DORN, M. & RUHNKE, H. (1999): Bestandsentwicklung der  
Bienen (Hymenoptera: Apoidea). - In: FRANK, D. & V. NEU-  
MANN, V. (Hrsg.): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere  
Sachsen-Anhalts. - Eugen Ulmer Verlag Stuttgart: 306-317.
- DORNBUSCH, G. (1988): Die Schmetterlinge des Natur-  
schutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst (Lep.). - Nat.schutz-  
arb. Bez. Halle Magdebg. **25**: 39-42.
- DORNBUSCH, G. (1988): Die Schmetterlingsfauna des Natur-  
schutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst (Lep.). - Entomol.  
Nachr. Ber. **5**: 221-225.
- DORNBUSCH, G. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe.  
Fische und Rundmäuler. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt  
**28, 1/2**: 54-55.
- DORNBUSCH, G. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe.  
Kriechtiere und Lurche. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt  
**28, 1/2**: 53-54.
- DORNBUSCH, G. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe.  
Säugetiere. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **28, 1/2**:  
46-48.
- DORNBUSCH, G. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe.  
Wirbellose Tiere. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **28,**  
**1/2**: 55-61.
- DORNBUSCH, G. (1995): Zur Bestandserfassung ausgewähl-  
ter Vogelarten in Sachsen-Anhalt 1994. - Apus **9, 2/3**: 99-  
104.
- DORNBUSCH, G. (1996): Die Schmetterlinge im Bereich des  
Naturschutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst. (Lepido-  
ptera). - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **1/2**: 36-40.
- DORNBUSCH, G. (1997): Adler in Sachsen-Anhalt. Informati-  
on. - In: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und  
Umwelt (Hrsg.): Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-  
Anhalt. - Magdeburg.
- DORNBUSCH, G., DORNBUSCH, M. & DORNBUSCH, P. (1996): In-  
ternationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. -  
Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **33, 5H**: 1-72.
- DORNBUSCH, M. & HEIDECHE, D. (1967): Beobachtungen der  
Blauracke bei Steckby und Edderitz. - Apus **1, 3**: 146.
- DORNBUSCH, M. (1968): Der Wiedehopf, *Upupa epops* L., in  
den Steckbyer Forsten. - Beitr. Vogelkd. **14**: 122-134.
- DORNBUSCH, M. (1969): Beobachtungen der Nordischen  
Ringdrossel im Mittelbegebiet. - Apus **1, 6**: 296.
- DORNBUSCH, M. (1969): Zwerg- und Singschwan bei Steck-  
by. - Apus **1, 6**: 291.
- DORNBUSCH, M. (1970): Beobachtungen von Ohrenlerchen  
und Schneeammern im Kreis Zerbst. - Apus **2, 3**: 98-100.
- DORNBUSCH, M. (1970/71): Übersicht über Greifvogel-Vor-  
kommen im Bereich des Naturschutzgebietes „Steckby-Löd-  
deritzer Forst“ in der Mittleren Elbaue unter Berücksichti-  
gung des angrenzenden Zerbster Landes. - Naturkd. Jah-  
resber. Mus. Heineanum **5/6**: 59-69.
- DORNBUSCH, M. (1971): Doppelschnepfe, *Gallinago media*  
(LATH.), im Mittelbegebiet. - Beitr. Vogelkd. **17**: 457.
- DORNBUSCH, M. (1972): Der Vogelbestand, seine Ernährung  
und der Einfluß auf die Arthropoden in Kiefernjung-  
bestockungen. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **12**: 85-  
100.
- DORNBUSCH, M. (1972): Die Siedlungsdichte des Brutvogel-  
bestandes und die Vogeldichte außerhalb der Brutzeit in  
Kiefernjungbestockungen sowie ihre Beeinflussung durch  
Vogelschutzmaßnahmen. - Beitr. Vogelkd. **18**: 265-294.
- DORNBUSCH, M. (1974): Die Vogelfauna. - In: DORNBUSCH, M.  
& HEIDECHE, D. (Hrsg.): Ökologisch begründete Pflegenor-  
mative für Naturschutzgebiete mit Auewaldbestockung im  
Pleistozängebiet der DDR. - Forschungsbericht Inst. Land-  
schaftsforschung Naturschutz (ILN Halle), Biolog. Station  
Steckby: 134-159.
- DORNBUSCH, M. (1977): Raufußkauz bei Steckby. - Apus **4,**  
**1**: 43-44.
- DORNBUSCH, M. (1981): Die Ernährung einiger Kleinvogelarten  
in Kiefernjungbestockungen. - Beitr. Vogelkd. **27**: 73-  
99.
- DORNBUSCH, M. (1983): Das Naturschutzgebiet Steckby-Löd-  
deritzer Forst - ein internationales Biosphärenreservat. - In:  
DORNBUSCH, M. & HEIDECHE, D. (Hrsg.): Biosphärenreservat  
Steckby-Lödderitzer Forst. Nationalkomitee der DDR für  
das Programm der UNESCO „Mensch und Biosphäre“, Ber-  
lin: 3-13.
- DORNBUSCH, M. (1983): Die Vogelwelt des Naturschutzge-  
bietes Steckby-Lödderitzer Forst. - In: DORNBUSCH, M. & HEI-  
DECKE, D. (Hrsg.): Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer  
Forst. Nationalkomitee der DDR für das Programm der  
UNESCO „Mensch und Biosphäre“, Berlin: 19-22.
- DORNBUSCH, M. (1983/89): Der Bestand des Weißstorches in  
der DDR. - Mitt. AK Weißstorch **45: 56: 65: 66: 77.**
- DORNBUSCH, M. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe.  
Vögel. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **28, 1/2**: 48-53.
- DORNBUSCH, M. (1991): Der Bestand des Weißstorches (*Ci-  
conia ciconia*) in Deutschland, speziell in Sachsen-Anhalt. -  
Institut Europe´en d'Ecologie (Hrsg.): Les Cigognes d'Eu-  
rope. - Metz: 168-170.
- DORNBUSCH, M. (1991): Die Greifvogelbesiedlung des Na-  
turschutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst. - In: Populati-  
onsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. Band 2. -  
Wiss. Beitr. Univ. Halle **1991/4 (P45)**: 84-88.
- DORNBUSCH, M. (1992): 10 Jahre Vogelschutzwarte Steckby.  
- Natur und Landschaft **67**: 251-252.
- DORNBUSCH, M. & DORNBUSCH, G. (1997): Halsbandschnäp-  
per bei Steckby. - Apus **9, 6**: 293.
- DORNBUSCH, M. & GRAFF, H. (1974): Sprosser im Mittelbe-  
gebiet. - Apus **3, 2/3**: 117-119.
- DORNBUSCH, P. (1985): Ökofaunistische Untersuchungen an  
Mäusen und Spitzmäusen im Biosphärenreservat Steckby-  
Lödderitzer Forst. - Hercynia, N. F. **22**: 13-24.
- DORNBUSCH, P. (1988): Bestockungsprofile in Dauerbeob-  
achtungsflächen im Biosphärenreservat Mittlere Elbe, DDR.  
- Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **28**: 245-263.
- DORNBUSCH, P. (1989): Wie steht es um den Elbebiber? -  
Zerbster Heimatkalender **30**: 67-72.
- DORSCHNER, J., DREYER, U., GUGEL, J., KINZELBACH, R., MEISTER,  
A. & SEEL, P. (1993): Der Gewässerzustand der Elbe 1991.  
Ergebnisse einer Bereisung mit dem Hessischen Meß- und  
Laborschiff „Argus“ zwischen Veletov und Geesthacht. - In:  
Hessische Landesanstalt für Umwelt (Hrsg.): Umweltpl-  
nung, Arbeits- und Umweltschutz **153**. - Wiesbaden.
- DREYER, U. (1994): Regeneration der Makrozoobenthos-Le-  
bensgemeinschaft in der Mittelbe. - In: GUHR, H. et al.  
(Hrsg.): 6. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Die Elbe  
im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie“:  
290-300.
- DREYER, U. (1995): Untersuchungen zum Makrozoobenthos  
in der Mittelbe. - Dt. Ges. Limnologie, Erw. Zus. Jahrestag-  
ung 1994, Hamburg: 607-611.
- DREYER, U. (1996): Besiedlung unterschiedlicher Strukturty-  
pen des Stromes und seiner Uferandgebiete. - In: PRANGE,  
A. et al. (Hrsg.): 7. Magdeburger Gewässerschutzseminar  
„Ökosystem Elbe - Zustand, Entwicklung und Nutzung“:  
13-19.
- DREYER, U. (1996): Potentiale und Strategien der Wieder-  
besiedlung am Beispiel des Makrozoobenthons in der mitte-  
ren Elbe. - Dissertation, Technische Hochschule Darmstadt,  
Inst. f. Zool. (UFZ-Bericht 1996/3. - Halle/Leipzig).
- DREYER, U. (1997): Besiedlung unterschiedlicher Substratty-

- pen in der Uferzone der Mittelbe. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1996, Schwedt/Oder: 127-131.
- DÜRIGEN, B. (1897): Deutschlands Amphibien und Reptilien. - Creutzsche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
- DZIEWIATY, K. (1994): Nahrungsräume des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) an der mittleren Elbe unter Berücksichtigung der Rühstädter Storchkolonie. - Artenschutzreport **4**: 31-35.
- EBEL, G. (1994): Ichthyofaunistische Untersuchungen in der Saale im Gebiet von Sachsen-Anhalt. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **31**, **2**: 49-56.
- EBEL, G. (1996): Untersuchungen zur aktuellen Situation der Ichthyofauna von Saale, Unstrut und Helme in Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt **2**, **SH**: 1-63.
- EBELING, W. (1870): Charakterpflanzen des Alluviums im Magdeburger Florenggebiete. - Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg **3**: 3-20.
- EDER, M. (1990): Bemerkungen zu Problemen des Pilzschutzes in und um Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 89-95.
- EHRMANN, P. (1933): Weichtiere, Mollusca. - In: BROHMER, P., EHRMANN, P. & ULMER, G. (Hrsg.): Die Tierwelt Mitteleuropas. - Leipzig.
- EICHHORN, A. & PUHLMANN, G. (1999): Das EU-Life Projekt „Renaturierung von Fluss, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe“. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **36**, **2**: 43-50.
- ELLMANN, H. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Die kulturhistorische Entwicklung und Nutzung des Gebietes aus wasserwirtschaftlicher Sicht. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 5-9.
- ENDRULAT, B. (1855): Nachträge zum Käferverzeichnis der Nieder-Elbe. - Stettiner Entomol. Z. **16**: 185-187.
- ENDRULAT, B. & TESSIEN, H. (1854): Zur Fauna der Nieder-Elbe. Verzeichnis der bisher um Hamburg gefundenen Käfer. Mit Angabe der Fundorte und sonstigen Bemerkungen. - Hamburg.
- ERFURT, J. & STUBBE, M. (1986): Die Areale ausgewählter Kleinsäugerarten in der DDR. - Hercynia, N. F. **23**: 257-304.
- ERFURT, J., RÖDER, R. & SCHUSTER, M. (1986): Zur Verbreitung der Hausratte *Rattus rattus* (L. 1758) auf dem Territorium der DDR. - Säugetierkd. Info. **2**: 303-310.
- FEDERSCHMIDT, A. (1997): Die Libellen des Kühnauer Sees. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **SH**: 78-84.
- FEILER, M. (1960): Schwarzer Milan im Januar an der Mittelbe. - Der Falke **7**: 191.
- FELD, J. (1895): Floristisches aus Magdeburg und Umgebung. - Dt. Bot. Monatsschr. **13**: 6-8.
- FEUERSTACKE, R. (1912): Verzeichnis der in der Umgebung Magdeburgs aufgefundenen Schnellkäfer (Elateridae). - Mitt. Entomol. Ges. Halle **3/4**: 53-58.
- FEUERSTACKE, R. (1913): Verzeichnis der in der Umgebung Magdeburgs aufgefundenen Cerambycidae. - Mitt. Entomol. Ges. Halle **5/7**: 75-88.
- FICHTNER, E. (1981a): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Halipidae. - Beitr. Entomol. **31**: 319-329.
- FICHTNER, E. (1981b): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Hygrobiidae. - Beitr. Entomol. **30**: 315-317.
- FICHTNER, E. (1982): Faunistische Notizen Nr. 86: *Potamonectes canaliculatus* LAC. (Col. Dytiscidae). - Entomol. Nachr. Ber. **26**: 40-41.
- FICHTNER, E. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Dytiscidae. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **11**: 1-48.
- FICHTNER, E. (1984): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Gyrinidae. - Entomol. Nachr. Ber. **28**: 49-55.
- FICHTNER, E. (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Spercheidae. - Entomol. Nachr. Ber. **31**: 229-230.
- FICHTNER, E. & BELLSTEDT, R. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Dryopidae und Elmidae. - Veröff. Naturkd.mus. Leipzig **8**: 69-81.
- FISCHER, W. (1968): Seltene Pilzfunde in Brandenburg. - Mykol. Mitt. **12**: 1-5.
- FISCHER, W. (1973): Bemerkung zur mykofloristischen Erforschung kleiner Territorien. - Mykol. Mitt. **17**: 78-92.
- FISCHER, W. (1978): Zur Flora der Prignitz, Nachträge und Ergänzungen. - Gleditschia **6**: 99-140.
- FISCHER, W. (1983): Pilze der Havelaue bei Gülpe. - Mykol. Mitt. **26**: 66-67.
- FISCHER, W. (1984): Das Mühlenholz, ein Auenwald im Elbtal. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **4**: 60-63.
- FISCHER, W. (1989): Naturnahe Vegetationsformen der Gülpener Havelniederung und ihre Gefährdung, I. - Wiss. Z. Pädagogische Hochschule Potsdam **33**: 379-393.
- FISCHER, W. (1991): Bericht über einen floristischen Kartierungseinsatz im Havelland und im Elb-Havel-Winkel. - Gleditschia **19**: 373-378.
- FISCHER, W. (1994): *Juncus atratus* und *Sagina nodosa* im Land Sachsen-Anhalt nachgewiesen - Beitrag zu einer reichen Florenstätte im Haveltal bei Vehlgest. - Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 11-15.
- FISCHER, W. (1994a): Zwei seltene Stromtalpflanzen - Schwarze Binse und Streifen-Klee - bei Havelberg nachgewiesen. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 51-52.
- FISCHER, W. (1995): Beitrag zur Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Jederitzer Holz bei Havelberg. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 20-28.
- FISCHER, W. (1995): Eine 200 Jahre alte Schrift zur Flora Havelbergs. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 75-76.
- FISCHER, W. (1995): Kommt die Seekanne noch im Havelberger Gebiet vor? - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 74.
- FISCHER, W. (1996): Die Stromtalpflanzen Brandenburgs. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 4-13.
- FISCHER, W. (1997): Pflanzenarten der Trockenrasen im Gebiet der Kamernschen Berge (Landkreis Stendal). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 20-26.
- FISCHER, W. (1997): Zur Pflanzenwelt der Spülinsel in Havelberg. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 27-35.
- FISCHER, W. (1998): Die Flora des Naturschutzgebietes Prämmer Berge. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 52-58.
- FISCHER, W. (1998a): Pilzbeobachtungen im Mühlenholz bei Havelberg. 1. Teil, Basidiomyceten. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 27-32.
- FISCHER, W. (1998b): Pilzarten auf der Spülinsel in Havelberg. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 24-26.
- FISCHER, W. (1999): Zum Vorkommen von Gefäßpflanzen und Pilzen im Bachtal zwischen Obermühle und Kümmernitz. Die Breddinner Schweiz als ausgezeichnete Florenstätte in der Prignitz. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **9**: 24-26.
- FISCHER, W. & KRAUSCH, H.-D. (1993): *Eragrostis multicaulis* STEUDEL am Elbufer bei Wittenberg. - Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **126**: 201-202.
- FISCHER, W., KUMMER, V. & PÖTSCH, J. (1994/95): Zur Vegetation des Feuchtgebietes internationaler Bedeutung (FIB) Untere Havel. - Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg **3/4**: 12-18.
- FITSCHEN, J. (1900): Kleine Beiträge zur Flora von Magdeburg. - Jahresber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg 1898/1900: 143-149.
- FLADUNG, E. (1998): Untersuchungen zu Fischbestandsstrukturen und fischereilicher Produktivität von Bühnenfeldern der Mittelbe. - In: GELLER, W. et al. (Hrsg.): 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe“: 237-238.
- FÖCKLER, H. (1937): Neuer Fundort von *Artemia salina* (L.) in Mitteldeutschland. - Z. Naturwiss. Halle **91**: 99-100.
- FRANCK, P. (1931): Über die Verbreitung und die Lebensweise deutscher Käfer. IV. - Entomol. Blätter **27**: 1-3.



- FREIDANK, K. & PLATH, L. (1982): Zur Vogelwelt des Elbe-Havel-Winkels. - Schr.-R. Kreisheimatmus. Genthin: 1-100.
- FREITAG, H., MARKUS, C. & SCHWIPPL, I. (1958): Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Flämings (Elbe-Elster-Gebiet um Torgau und Herzberg). - Wiss. Z. Pädagogische Hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. **R. 3**: 65-92.
- FREUDE, H. (1971): Leptinidae. - In: FREUDE, H., HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Band 3. - Verlag Goecke & Evers, Krefeld.
- FRICKE, E. (1965): Der Weißstorchbestand im Bezirk Magdeburg in den Jahren 1962 und 1963. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **2**: 36-50.
- FRICKE, R. (1966): Der Weißstorchbestand im Elb-Havel-Winkel in den Jahren 1965 und 1966. - Ornith. Beitr. Elb-Havel-Winkel **2**: 27-30.
- FRICKE, R. & FRICKE, E. (1965): Der Weißstorchbestand im Elb-Havel-Land. - Ornith. Beitr. Elb-Havel-Winkel **1**: 5-20.
- FRICKE, R. & FRICKE, E. (1974/75): Der Weißstorchbestand im Bezirk Magdeburg in den Jahren 1964-1973. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **11/12**: 72-80.
- FRIEDRICH, H. (1894): Die Biber an der mittleren Elbe. Nebst einem Anhang über *Platypus castoris* RITSEMA. - Verlagsbuchhandlung P. Baumann, Dessau.
- FRIEDRICH, H. (1911): Von den Bibern der alten und der neuen Welt. - Sankt Hubertus **29**: 117-119.
- FRIEDRICH, H. (1924): Aus den deutschen Biberöasen. - Sankt Hubertus **42**: 321-324.
- FRIEDRICH, T. (1994/97): Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Stendal 1994-1997. - Stendal.
- FRIEDRICH, T. (1998): Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Stendal 1998. - Stendal.
- FRIEDRICH, T. (1999): Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Stendal 1999. - Stendal.
- FUESS, W. (1936): Die Kriechtiere der Dübener Heide - 1. Teil: Schildkröten und Eidechsen. - Die Dübener Heide : eine heimatl. Monatsschr. **6**: 27-29.
- FUESS, W. (1936): Die Kriechtiere der Dübener Heide - 2. Teil: Die Schlangen. - Die Dübener Heide : eine heimatl. Monatsschr. **6**: 41-44.
- FUESS, W. (1936): Wassernüsse im Überschwemmungsgebiet der Mulde. - Die Dübener Heide : eine heimatl. Monatsschr. **6**: 13-16.
- FUESS, W. (1937): Das atlantische Florenelement im Mittelbegebiet. - Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung **79**: 17-19.
- FUESS, W. (1937): Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. 1. Das europäische und mitteleuropäische Florenelement. - Luginsland : Heimatkd. Beilage Anhalter Anzeiger **1**: 1-2.
- FUESS, W. (1937): Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. 2. Das nordische Florenelement. - Luginsland : Heimatkd. Beilage Anhalter Anzeiger **1**: 10-12.
- FUESS, W. (1937): Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. 3. Das atlantische Florenelement. - Luginsland : Heimatkd. Beilage Anhalter Anzeiger **6**: 21-22.
- FUESS, W. (1937): Steppenheidehangwald und Steppenheide am hohen Elbufer bei Steckby. - Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung **79**: 306-310.
- FUESS, W. (1937): Zur Kenntnis und Verbreitung der Torfmoose im Flußgebiet der mittleren Elbe und der unteren Mulde. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **4**: 20-34.
- FUESS, W. (1938): Das Mottenkraut im Mittelbegebiet. - Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung **80**: 169-171.
- FUESS, W. (1938): Die geographischen Florenelemente im Flußgebiet der unteren Mulde und der mittleren Elbe mit besonderer Berücksichtigung der Flora von Anhalt. 4. Das kontinentale Florenelement. - Luginsland : Heimatkd. Beilage Anhalter Anzeiger **7**: 25-27.
- FUESS, W. (1939): Die Gemeine und die Wiesen-Kuhschelle im Mittelbegebiet. - Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung **81**: 139-140.
- FÜLLMER, G., PFEIFER, M., SIEG, S. & ZARSKE, A. (1996): Die Fischfauna von Sachsen. - Rundmäuler, Fische, Krebse - Geschichte, Verbreitung, Gefährdung, Schutz. - Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden.
- GAHSCHKE, J. & HAFERKORN, J. (1999): Bestandsentwicklung der Säugetiere exkl. Fledermäuse (Mammalia exkl. Chiroptera). - In: FRANK, D. & NEUMANN, V. (Hrsg.): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
- GANZER, W., SCHNEIDER, G. & VOIGT, K. (1930/33): Die Großschmetterlinge Dessaus und seiner weiteren Umgebung. - 1. Teil. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **3**: 9-15.
- GANZER, W., SCHNEIDER, G. & VOIGT, K. (1933/37): Die Großschmetterlinge Dessau und seiner weiteren Umgebung. - 2. Teil. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **4**: 11-20.
- GARCKE, A. (1849): Flora von Nord- und Mitteldeutschland. - Verlag K. Wiegandt, Berlin.
- GARCKE, A. (1851): Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 2. Ausgabe. - Verlag K. Wiegandt, Berlin.
- GARCKE, A. (1854): Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 3. Ausgabe. - Verlag K. Wiegandt, Berlin.
- GARCKE, A. (1856): Flora von Halle. Zweiter Theil: Kryptogamen. - Verlag K. Wiegandt, Berlin.
- GÄRTNER, S., HENKEL, H., ZUPPKE, H. & HEIDECHE, D. (2000): Schäden an Forstgehölzen durch Biber. - Allg. Forstz. **55**: 380-382.
- GABMANN, F. H. (1984): Lurche und Kriechtiere des Bezirkes Magdeburg. Darstellung des gegenwärtigen Kenntnisstandes der Verbreitung. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **21**: 29-56.
- GAUMERT, T. (1996): Die Fischfauna der Elbe. - In: IKSE (Internationale Kommission zum Schutz der Elbe) (Hrsg.): Die Fischfauna der Elbe. - Magdeburg.
- GAUMERT, T. (1998): Schwarze Elster, Mulde und Saale - Fischartenspektrum und Schadstoffbelastung von Brassen, Aal und Zander in den Unterläufen der Elbnebenflüsse. - Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe, Hamburg.
- GAUMERT, T. & SPIEKER, J. (1994): Makrozoobenthon der Elbe. Arten, Biomasse und Güteklassifizierung zwischen Schmilka und Cuxhaven. - Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe, Hamburg.
- GEITER, R. (1989): Bemerkenswerte Blattkäferfunde und Erstnachweise für den Bezirk Magdeburg. - Entomol. Nachr. Ber. **33**: 88-90.
- GEORGE, K. & WADEWITZ, M. (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. - Apus **10**, **2**: 37-71.
- GEORGE, K. & WADEWITZ, M. (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. - Apus **10**, **3/4**: 125-160.
- GERBER, M. (1982): Über das Vorkommen von *Aegeria melanocephala* DALM. (Schwarzkopfsesie) in der östlichen Umgebung von Magdeburg (Lep., Aegeriidae). - Entomol. Nachr. Ber. **26**: 89-90.
- GERISCH, H. (1967): Drei Leuchtabende in Steckby an der Elbe im Juli 1966. - Entomol. Ber. **1**: 109-111.
- GERSTENBERGER, J. (1975): Brutversuch der Trauerseeschwalbe im NSG Alte Elbe bei Bösewig (Kr. Wittenberg). - Apus **3**, **6**: 283-284.
- GIESE, W. (1936): Beiträge zur Flora von Magdeburg und Umgebung. I. Im Gebiet neu aufgefundener Pflanzen. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **6**: 179-192.

- GLÖER, P. & MEIER-BROOK, C. (1998): Süßwassermollusken. - DJN, Hamburg.
- GNIELKA, R. (1978): Der Einfluß des Ulmensterbens auf den Brutvogelbestand eines Auwaldes. - *Apus* 4, 2: 49-66.
- GNIELKA, R. & ZAUMSEIL, J. (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Südtails von 1990 bis 1995. - Halle (Saale).
- GOECKE, H. (1943): Monographie der Schilfkäfer II. Die fossilen Funde und ihre Bestimmung. - *Nova Acta Leopoldina*, N. F. 12: 229-380.
- GOECKE, H. (1945/48): *Donacia Malinowski* AHR. und *Donacia fennica* PAYK. - *Entomol. Blätter* 41/44: 32-47.
- GOLDFUß, O. (1900): Die Binnen-Mollusken Mittel-Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der Thüringer Lande, der Provinz Sachsen, des Harzes, Braunschweigs und der angrenzenden Landesteile. - Leipzig.
- GOLDFUß, O. (1904): Nachtrag zur Binnenmolluskenfauna Mittel-Deutschlands. - *Z. Naturwiss.* Halle 77.
- GÖRGNER, E., KELLNER, J., MÜTZE, R. & OTTO, G. (1991): Liste der nachgewiesenen Tagfalter (Papilionoidea und Hesperoidea) des Stadtkreises Dessau/Sachsen-Anhalt mit Berücksichtigung ihrer Gefährdungsgrade. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 6: 59-66.
- GÖRNICKE, P. (1927): Fundstellen von *Triops cancriformis* im Überschwemmungsgebiet der Elbe. - *Ber. Naturwiss. Ver. Zerbst* 1927: 37-39.
- GRABOW, K. & MARTENS, A. (1995): Vorkommen von *Corbicula fluminea* (O. F. MÜLLER, 1774) und *Corbicula „fluminalis“* (O. F. MÜLLER, 1774) im östlichen Mittellandkanal (Bivalvia: Corbiculidae). - *Mitt. Dt. Malakozool. Ges.* 56/57: 19-23.
- GRABOW, K., EGGERS, T. & MARTENS, A. (1998): *Dikerogammarus villosus* (Crustacea: Amphipoda) in nordeutschen Kanälen und Flüssen. - *Lauterbornia* 33: 103-107.
- GRAFF, H. (1953): Bestandsaufnahme des Weißen Storches in Anhalt und den benachbarten Gebieten. - *Die Vogelwelt* : Z. Vogelkd. Vogelschutz 74: 23.
- GRAFF, H. (1966): Nachweise der nordischen Form des Buntspechts bei Dessau. - *Apus* 1, 2: 98.
- GRAFF, H. (1967): Der Weißstorchbestand im Gebiet der Mittelelbe 1951-1965. - *Der Falke* 14: 309-313.
- GRAFF, H. (1967): Zum Vorkommen des Rohrschwirns im Gebiet Mittelelbe. - *Apus* 1, 3: 136-137.
- GRAFF, H. (1997): Meine 45jährige Beringungstätigkeit am Weißstorch im Mittelbebegebiet. - In: KAATZ, C. & KAATZ, M. (Hrsg.): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag. - Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MRLU-LSA: 106-110.
- GRASER, K. (1990): Beobachtungen 57: *Dorcus parallelipedus* (LINNE) als „Schwimmkäfer“. - *Entomol. Nachr. Ber.* 34: 231-232.
- GRASER, K. (1993): Die Elbauen um Magdeburg - eine Lebensstätte interessanter Insekten, speziell Käfer (Insecta, Coleoptera). - In: Umweltamt Landeshauptstadt Magdeburg (Hrsg.): 1. Landschaftstag 1993 - Die Elbaue: 57-62.
- GRASER, K. (1995): Cerambycidae-Funde um Magdeburg. - *Entomol. Nachr. Ber.* 39: 233-238.
- GRASER, K. & SCHNITTER, P.-H. (1998): Bibliographie der Literatur zur Käferfauna Sachsen-Anhalts und angrenzender Gebiete, besonders des Harzes. - *Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt* 6: 3-56.
- GREBENSČIKOV, I. (1982): Die Fauna der Blatthornkäfer (Coleoptera, Lamellicornia) des nördlichen Harzvorlandes. - *Hercynia*, N. F. 19: 1-6-41.
- GRIMM, U. (1985): Die Gnaphosiden Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). - *Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg*, N. F. 26: 1-318.
- GRÖGER, F. (1960): Zur Verbreitung höherer Pilze in Mitteldeutschland I. - *Mykol. Mitt.* 4: 8-17.
- GRÖGER, F. (1984): Fundliste der Burger Tagung (u. a. NSG Kreuzhost Magdeburg). - *Mykol. Mitt.* 27: 43-48.
- GRÖGER, F. (1985): Fund Nadelholzröhrling (*Pulveroboletus lignicola*) bei Tangerhütte. - *Mykol. Mitt.* 28: 84.
- GRÖGER, F. (1991): Floristische und taxonomische Literatur über Großpilze aus der ehem. DDR. - *Mykol. Mitt.* 34: 93-96.
- GRÖGER, R. & BECH, R. (1986): Lurche und Kriechtiere des Kreises Bitterfeld. - *Bitterfelder Heimatbl.* VI: 1-64.
- GROSSER, C. (1997): Erfassung der Egel fauna im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* 34, 1: 39-44.
- GROSSER, C. (1999): Erstnachweis von *Trocheta cylindrica* ÖRLEY 1886 (Hirudinea: Erpobdellidae) im Elbegebiet Sachsen-Anhalts. - *Lauterbornia* 36.
- GRUSCHWITZ, W. (1987): Bemerkenswerte und neue Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Col., Curc.). - *Entomol. Nachr. Ber.* 31: 85-86.
- GRUSCHWITZ, W. (1989): Bemerkenswerte und neue Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Col., Curc.), 2. Beitrag. - *Entomol. Nachr. Ber.* 33: 137.
- GÜNTHER, A. & RANDOW, F. (1989): Zur Kenntnis der Libellenfauna der Unteren Havelniederung (Insecta, Odonata). - *Beitr. Tierwelt Mark* XI: 15-21.
- GÜRLICH, S., SUKAT, R. & ZIEGLER, W. (1995): Katalog der Käfer Schleswig-Holsteins und des Niederelbegebietes. - *Verh. Ver. Naturwiss. Heimatforsch. Hamburg* 41: 1-111.
- GUTTE, P. & HILBIG, W. (1975): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XI. Die Ruderalvegetation. - *Hercynia*, N. F. 12: 1-39.
- GUTTE, P., JAGE, H. & JAGE, I. (1973): *Urtica kioviensis* RO-GOW im Elbe-Havel-Winkel (Bezirk Magdeburg, DDR). - *Gleditschia* 1: 95-97.
- HAASE, P. (1994/95): Die Entwicklung der Landnutzung an der Unteren Havel. - *Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg* 4/1: 4-11.
- HAASE, P., LITZBARSKI, H., SEEGER, J. & WARTHOLD, R. (1989): Zur aktuellen Situation und zu Problemen der Gestaltung des Feuchtgebietes von internationaler Bedeutung „Untere Havel“. - *Beitr. Vogelkd.* 35: 57-74.
- HAASE, P., MÜLLER, H. & BERBIG, A. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Vögel. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* 32, 5H: 26-29.
- HAASE, T., HEIDECHE, D. & KLAPPERSTÜCK, J. (1989): Zur Ökologie und Verbreitung des Edelkrebses *Astacus astacus* in der DDR. - *Hercynia*, N. F. 26: 36-57.
- HAENSCHKE, J. (1994): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 8: 103-128.
- HAENSCHKE, J. (1996): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. 2. Teil. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 9: 49-66.
- HAENSCHKE, J. (1998): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. 3. Teil. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 10: 17-24.
- HAENSCHKE, W. (1982): Sanierung des Amphibien-Laichgewässers „Nixensumpf“ im Stadtkreis Dessau. - *Feldherp. Mitt.* 5: 8-10.
- HAENSCHKE, W. (1992): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. - II. Biogeographische Kartierung ausgewählter Vogelarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1986-1989. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 7: 19-44.
- HAENSCHKE, W. & HAENSCHKE, J. (1991): Über zwei Nachweise des Baßtölpels, *Sula bassana* (L.), in den Kreisen Dessau und Roßlau. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 6: 67-73.
- HAENSCHKE, W., HAMPE, H., SCHUBERT, P. & SCHWARZE, E.



- (1983): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 1. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5H**: 1-97.
- HAENSCHKE, W., HAMPE, H., SCHUBERT, P. & SCHWARZE, E. (1985): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. - Teil 2. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5H**: 98-200.
- HAFERKORN, J. (1992): Populationsökologie von Kleinsäu- gern in Auwäldern Mitteleuropas. - Dissertation, Martin-Lu- ther-Universität Halle.
- HAFERKORN, J. (1994): Population ecology of small mammals in a floodplain forest in the middle part of the River Elbe. - Pol. ecol. Stud. **20**: 187-191.
- HAFERKORN, J. (1995): Dynamik von Kleinsäu- gern und deren Beeinflussung durch Hochwasser in mitteldeutschen Au- wäldern. - Arch. Hydrobiol. Suppl. (Large Rivers 9) **101**: 309-313.
- HAFERKORN, J. (1999): Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe - ein Forschungsverbundprojekt in Sachsen-Anhalt. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **36**, **2**: 45-48
- HAFERKORN, J. & STUBBE, M. (1994a): Die Kleinsäu- gergemeinschaften in verschiedenen Sukzessionsstadien der Hartholzau. - Säugetierkd. Info. **3**: 651-660.
- HAFERKORN, J. & STUBBE, M. (1994b): Reproduktionsbiologie von Kleinsäu- gern in einem Auwald an der Mittleren Elbe. - Zool. Jb. Syst. Ökol. **121**: 220-232.
- HAFERKORN, J. & STUBBE, M. (1994c): Zur Altersstruktur von *Apodemus flavicollis* in einem Auwald an der mittleren El- be. - Z. Säugetierkunde **59**: 21-26.
- HAFERKORN, J. & STUBBE, M. (1995): Zur Altersstruktur von *Clethrionomys glareolus* in einem Auwald an der mittleren Elbe. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **33**: 237-242.
- HAFERKORN, J., STUBBE, M. & HEIDECHE, D. (1991): Sukzession der Kleinsäu- gergesellschaft in einem Auwaldbiotop. - In: STUBBE, M., HEIDECHE, D. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populations- ökologie von Kleinsäu- gern. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1990/34 (P 42)**: 267-281.
- HAFERKORN, J., STUBBE, M. & PACHINGER, K. (1993): Abun- danzdynamik von Kleinsäu- gern und Hochwassereinfluß in einem Elbeauwald. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **32**: 227-241.
- HAHN, H. (1885/86): Verzeichnis der in der Umgegend von Magdeburg und den angrenzenden Bezirken aufgefunde- nen Käfer. Ein Beitrag zur Insectenfauna Norddeutschlands. - Jahresber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg **I**: 97-121, **II**: 95-123. Separatdruck (1886), Fabersche Buchdruckerei, Magdeburg: 1-51.
- HAMPE, H. (1966): Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) bei Dessau. - Beitr. Vogelkd. **12**: 118.
- HAMPE, H. (1968): Rohrschwirl am Kühnauer See bei Des- sau. - Apus **1**, **5**: 255.
- HAMPE, H. (1970): Das Vorkommen der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria* (BECHST.)) im Dessauer Raum. - Apus **2**, **2**: 75-82.
- HAMPE, H. (1974): Zum Frühjahrsdurchzug der Tafelente bei Dessau. - Apus **3**, **2/3**: 91-94.
- HAMPE, H. (1975): Der Raubwürger im Dessauer Raum. - Apus **3**, **6**: 267-271.
- HAMPE, H. (1975): Grauspechtvorkommen im Dessauer Ge- biet. - Apus **3**, **6**: 272-274.
- HAMPE, H. (1980): Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1966 - 1978. - Apus **4**, **4**: 145-162.
- HAMPE, H. (1982): Schwarzstorchansammlungen zur Herbstzugzeit im Mittelbegebiet. - Apus **4**, **6**: 279-280.
- HAMPE, H. (1985): Sprosser in der Kliekener Aue (Kreis Roßlau). - Apus **6**, **1**: 41.
- HAMPE, H. (1985): Wasservogelzählungen im Raum Dessau - 1978 bis 1984. - Apus **6**, **2**: 72-81.
- HAMPE, H. (1986): Der Brutbestand des Höckerschwans in der Dessauer Umgebung 1972-1983. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **3**: 35-45.
- HAMPE, H. (1986): Der Schlagschwirl bei Dessau. - Apus **6**, **3**: 135-141.
- HAMPE, H. (1986): Schwarzstörche im Mittelbegebiet. - Apus **6**, **4**: 183.
- HAMPE, H. (1986): Zwergschnäpper im Wörlitzer Forst. - Apus **6**, **4**: 187.
- HAMPE, H. (1989): Jungführende Brandgänse an der Mit- telbe bei Dessau. - Apus **7**, **3**: 138-139.
- HAMPE, H. (1990): Kanadagans-Graugans-Mischlinge bei Dessau. - Apus **7**, **6**: 265-266.
- HAMPE, H. (1990): Teichwasserläufer bei Bösewig. - Apus **7**, **6**: 269.
- HAMPE, H. (1990): Zur Ansiedlung des Kolkrahen in der Dessau-Wörlitzer Auenlandschaft. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 51-57.
- HAMPE, H. (1992): Brutnachweis der Schellente an der Mit- telbe. - Apus **8**, **3**: 128.
- HAMPE, H. (1992): Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1984 bis 1992. - Apus **8**, **3**: 109-118.
- HAMPE, H. (1994): Erneut starker Einflug von Silbermöwen an der Mittelbe. - Apus **8**, **6**: 291.
- HAMPE, H. (1999): Vom Mittelspecht im Raum Dessau. Mit Ergebnissen zur Siedlungsdichte im Vergleich zu Bunt- und Kleinspecht. - Apus **10**, **3/4**: 182-190.
- HAMPE, H. & HINSCHKE, A. (1967): Zwergschwäne auf der Al- ten Elbe bei Bösewig. - Apus **1**, **3**: 140-141.
- HAMPE, H. & HINSCHKE, A. (1969): Kanadagänse an der Mit- telbe. - Apus **1**, **6**: 292.
- HAMPE, H. et al. (1993): Ein Beitrag zur Aktualisierung der Dessauer Lokalavifauna mit Beobachtungsangaben des Ornithologischen Vereins Dessau aus den Jahren 1981- 1992. - Dessau.
- HANDKE, K. & BERNHARDT, K.-G. (1996): Ein neues Vorkom- men von *Graphoderus austriacus* (STURM 1834) in Nord- deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). - Beitr. Naturkd. Nie- dersachsen.
- HARM, M. (1969): Revision der Gattung *Salticus* LATREILLE (Arachnida: Araneae: Salticidae). Zur Spinnenfauna Deutschlands, VI. - Senckenberg. biol. **50**: 205-218.
- HARM, M. (1971): Revision der Gattung *Heliophanus* C. L. KOCH. - Senckenberg. biol. **52**: 53-79.
- HARM, M. (1977): Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Phlegra* SIMON (Arach.: Araneae: Salticidae). - Senckenberg. biol. **58**: 63-77.
- HARZ, M. (1990): Winterbeobachtung eines Silberreihers im Mittelbegebiet. - Apus **7**, **6**: 242-243.
- HAUER, S. & HEIDECHE, D. (1999): Zur Verbreitung des Fischotters (*Lutra lutra* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. - Hercynia N. F. **32**: 149-160.
- HEIDECHE, D. (1973): Übersicht über die Biber-Bestandser- fassung 1971 in der DDR. - Info. Biberschutz **3**: 1-5.
- HEIDECHE, D. (1974/75): Beitrag zu Biologie, Verhalten und Ökologie des Elbebibers. - Nat.schutz naturkd. Heimat- forsch. Bez. Halle Magdebg. **11/12**: 43-52.
- HEIDECHE, D. (1975): Biber - Bestand 1974. - Info. Biber- schutz **5**: 1-2.
- HEIDECHE, D. (1976): Bestandserfassung des Elbebibers 1975. - Info. Biberschutz **6**: 1-2.
- HEIDECHE, D. (1977a): Ökofaunistische Untersuchungen an Mäusen (Muridae) im Auewald des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“. - Hercynia, N. F. **14**: 217-230.
- HEIDECHE, D. (1977b): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Elbebibers. - Säugetierkd. Info. **1**: 16-31.
- HEIDECHE, D. (1978): Beitrag zur Populationsökologie des Elbebibers, *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907 (Rodentia). - Säugetierkd. Info **2**: 45-50.
- HEIDECHE, D. (1978): Die faunistische Bedeutung des Natur- schutzgebietes „Elbe-Saale-Winkel“. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **BH**.
- HEIDECHE, D. (1979): Ergebnisse der zentralen Biberbe- standserfassung 1976 und 1977. - Info. Biberschutz **9**: 1- 8.

- HEIDECHE, D. (1980): Die Fledermausfauna des Kreises Zerbst. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **17**: 33-43.
- HEIDECHE, D. (1983): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus*). - In: DORNBUSCH, M. & HEIDECHE, D. (Hrsg.): Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst. Nationalkomitee der DDR für das Programm der UNESCO „Mensch und Biosphäre“, Berlin: 14-18.
- HEIDECHE, D. (1984): Untersuchungen zur Ökologie und Populationsentwicklung des Elbebibers, *Castor fiber albicus* (MATSCHIE, 1907). Teil I. Biologische und Populationsökologische Ergebnisse. - Zool. Jb. Syst. Ökol. **111**: 1-41.
- HEIDECHE, D. (1985): Ergebnisse und Probleme beim Schutz des Elbebibers. - Nat.schutzarb. Berlin Brandenbg. **21**: 6-12.
- HEIDECHE, D. (1986): Bestandssituation und Schutz von *Castor fiber albicus* (Mammalia, Rodentia, Castoridae). - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **41**: 111-119.
- HEIDECHE, D. (1989): Ökologische Bewertung von Biberhabitaten. - Säugetierkd. Info **3**: 13-28.
- HEIDECHE, D. (1989): Zum Status der Fledermausarten im Bezirk Magdeburg - Auswertung der Rasterkartierung. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1980/20 (P36)**: 93-104.
- HEIDECHE, D. (1990): Nachtreiher im NSG „Steckby-Lödderitzer Forst“. - Apus **7**, **6**: 263-264.
- HEIDECHE, D. (1991): Zur Organisation der Biberzählung und das Ergebnis im Jahr 1990. - Mitt. AK Biberschutz **1**: 1-8.
- HEIDECHE, D. (1995): Erstellung von Verbreitungskarten mit differenzierter Darstellung von Sommer- und Winterquartieren der in Sachsen-Anhalt beheimateten Flederäuse. - Information, MUNR (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung LSA). - Magdeburg.
- HEIDECHE, D. (1997): Erfahrungen bei der Wiederansiedlung des Elbebibers. - In: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (Hrsg.): Der Biber in der Kulturlandschaft - eine Illusion? - Saarbrücken: 69-78.
- HEIDECHE, D. & DORNBUSCH, M. (1978): Verbreitung und Ökologie, Schutz und Förderung des Elbebibers *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907, in der DDR. - Arch. Nat.schutz Landsh.forsch. **18**: 151-160.
- HEIDECHE, D. & HOERIG, H. (1986): Bestands- und Schutzsituation des Elbebibers. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **23**: 3-14.
- HEIDECHE, D. & HOERIG, H. (1986): Castor nicht mehr vom Austerben bedroht. - Veränderungen des Schutzstatus für den Elbebiber. - Unsere Jagd **36**: 230-232.
- HEIDECHE, D. & NEUMANN, V. (1987): Zur Verbreitung und Ökologie von *Triops cancriformis* BOSCH und *Lepidurus apus* L. in der DDR. - Herycynia, N. F. **24**: 107-118.
- HEIDECHE, D. & STUBBE, M. (1989): Schutz des Fischotters (*Lutra lutra*) in der DDR. - In: Populationsökologie marderartiger Säugetiere. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1989/37 (P 39)**: 223-236.
- HEIDECHE, D., BERBIG, A., BUSSE, P. & PAPROTH, R. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Säuger. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 23-26.
- HEIDENREICH, E. (1906): Verzeichnis der zwischen Saale, Elbe und Mulde beobachteten Staphylinen. - Entomol. Wochenbl. **23**: 194-195, 199.
- HEIDENREICH, E. (1915): Sitzung der Entomologischen Gesellschaft vom 04.08.1913. - Mitt. Entomol. Ges. Halle **5/7**: 46.
- HEIDENREICH, E. (1934): Kleine coleopterologische Mitteilungen. *Opilo pallidus* OLIV. - Entomol. Blätter **30**: 90.
- HEIDENREICH, E. (1934): Seltene Käfer um Dessau. - Entomol. Blätter **30**: 90-91.
- HEIDENREICH, E. (1953): Kleine coleopterologische Mitteilungen. *Opilo pallidus* OLIV. - Entomol. Blätter **49**: 190.
- HEINEMANN, R. (1910): Ein Ausflug ins Salzgebiet (Sülldorf bei Magdeburg). - Kranchers Entomol. Jb. Leipzig **19**: 168-171.
- HEINICKE, W. & NAUMANN, C. (1980/82): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Noctuidae. - Beitr. Entomol. **30/32**: 386-448, 39-188.
- HEINZE, B. (1989): Die Schmetterlingsfauna im Kreis Havelberg. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **9**: 75-80.
- HEINZE, B. (1991): Die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) im Kreis Havelberg, III. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **11**: 113-118.
- HEINZE, B. (1992): Tagfalter von Havelberg und Umgebung. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **1**: 11-30.
- HEINZE, B. (1993): Zur Schmetterlingsfauna von Havelberg und Umgebung. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **2**: 24-30.
- HEINZE, B. (1994): Ein „Schädling“ unserer Region? Beobachtungen zum Vorkommen des Eichenprozessionsspinner in der Umgebung von Havelberg (Lep., Thaumetopoeidae). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 25-33.
- HEINZE, B. (1994): Unsere Wälder an Elbe und Havel - wie „sauber“ müssen sie sein? - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 18-19.
- HEINZE, B. (1995): Zur Schmetterlingsfauna von Havelberg und Umgebung. Familie: Sphingidae (Schwärmer), Cymatophoridae (Eulenspinner). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 47-50.
- HEINZE, B. (1996): Ein Nachweis von *Carterocephalus silvicolus* in der „Düsteren Lake“ bei Havelberg (Lepidoptera; Hesperidae). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 72.
- HEINZE, B. (1996): Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Havelberg und Umgebung - Familien: Arctiidae (Bären), Lasiocampidae (Glucken) und Cossidae (Holzbohrer). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 57-61.
- HEINZE, B. (1997): Die Großschmetterlinge von Havelberg und Umgebung (Macrolepidoptera). - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **2**: 3-13.
- HEINZE, B. (1997): Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Havelberg und Umgebung. Familie Noctuidae (Eulenfaller), Teil I. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 55-60.
- HEINZE, B. (1998): Zur Schmetterlingsfauna von Havelberg und Umgebung - Familie Noctuidae, Teil II. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 59-65.
- HEISE, U. (1986): Der Kühnauer See - ein bedeutendes Altgewässer im Gebiet der Mittelelbe. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **3**: Zum Titelbild.
- HEISE, U. (1990): Zum Kenntnisstand der Verbreitung von Fledermäusen (Chiroptera) in den Kreisen Dessau, Roßlau, Gräfenhainichen und Bitterfeld. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 65-75.
- HEISE, U. (1992): Der Vogelbestand des Dessauer Naturschutzgebietes „Untere Mulde I“ während der Brutzeit 1983. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **7**: 67-90.
- HELLMUTH, J. (1958): Großtrappen-Vorkommen bei Zerbst. - Der Falke **5**: 70.
- HELLMUTH, J. (1958): Ringdrosselbeobachtung bei Zerbst. - Der Falke **5**: 178.
- HELMSTAEDT, K. W. (1971): Durchzug des Zwergschwans (*Cygnus columbianus bewicki* YARRELL) 1964-1969 im Gebiet der unteren Havel nebst Bemerkungen zum Projekt „Wasservogelschutzgebiet Untere Havel“. - Beitr. Vogelkd. **17**: 297-302.
- HELMSTAEDT, K. W., KOEHLER, H.P. & SCHARNBECK, H. (1982): Vom Zug des Kranichs (*Grus grus*) an der unteren Havel. - Beitr. Vogelkd. **28**: 269-274.
- HEMPEL, W. & SCHIEMENZ, H. (1975): Unsere geschützten Pflanzen und Tiere. - Urania-Verlag, Leipzig/Jena/Berlin.
- HENDRICH, L. & BALKE, M. (1991): Zur Verbreitung und Bionomie von *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE) - einem in der norddeutschen Tiefebene moorgebundenen Schwimmkäfer (Coleoptera Dytiscidae). - Entomol. Z. **101**: 453-468.
- HENDRICH, L., HERMANN, A. & TOLASCH, T. (1993): *Limnoxenus niger* (ZSCHACH, 1788) im Niederelbegebiet. -

- Bombus** **03**: 37-40.
- HENNIG, H. (1982): Wildgänse auf Zwischenstation. - Zerbster Heimatkalender **23**: 50-52.
- HENNIG, H. (1988): Am Hochwasserdeich bei Dornburg. - Zerbster Heimatkalender **29**: 75-77.
- HENNIG, H. (1993): Seltene Vogelarten an der Elbe. - Zerbster Heimatkalender **34**: 51-53.
- HENTSCHEL, P. (1991): Das Biospärenreservat Mittlere Elbe. Mensch und Landschaft. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **28**, **1/2**: 18-22.
- HENTSCHEL, P. (1995): Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - In: Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland (Hrsg.): Biosphärenreservate in Deutschland. - Verlag Julius Springer, Heidelberg.
- HENTSCHEL, P. (1997): Die zukünftige Entwicklung des Kühnauer Sees bei Dessau zum Beispielprojekt im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5H**: 135-142.
- HERBERG, M. (1955): Die Entwicklung einer Höhlenbrüterpopulation in einem einförmigen Kiefernbestande. - Beitr. Vogelkd. **5**: 61-74.
- HERBERG, M. (1959): Das Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst und die Vogelschutzstation Steckby. - Nat.schutz Landsch.gestalt. Bez. Magdebg. **3**: 24-33.
- HERBERG, M. (1960): Drei Jahrzehnte Vogelhege zur Niederhaltung waldschädlicher Insekten durch die Ansiedlung von Höhlenbrütern. - Arch. Forstwesen **9**: 1015-1048.
- HERDAM, H. (1997): Nachweise zur Flora Sachsen-Anhalts. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **2**: 39-52.
- HERMANN, F. (1901): Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. (I). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **43**: 147-151.
- HERMANN, F. (1903): Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. (II). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **45**: 192-196.
- HERMANN, F. (1926): Unsere Auenwälder. - Heimatkalender Altberburger Lande **1**: 81-83.
- HERRMANN, A. (1995): Wechselfeuchte Stromtalwiesen im Naturschutzgebiet „Untere Havel“ - Naturschutzwert und Schutzbedürftigkeit. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 37-45.
- HERRMANN, A., SACHER, P. & BRAASCH, D. (1999): Die Verbreitung des Ammen-Dornfingers (*Cheiracanthium pectorium* VILLERS, 1789) im östlichen Deutschland (Araneae, Clubionidae). - Entomol. Nachr. Ber. **43**: 53-57.
- HERRMANN, A., WERNICKE, A. & MÜLLER, H. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Die Pflanzenwelt. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **5H**: 15-23.
- HERSCHEL, K., MÜLLER, G. & BERGSTÄD (1975): Bemerkenswerte holzbewohnende Pilze bei Vockerode. - Mykol. Mitt. **19**: 8-19.
- HESS, M. & HECKES, U. (1996): Verbreitung, Status und Ökologie von *Stenelmis canaliculata* (GYLLENHAL, 1808) in Deutschland. - Koleopt. Rdsch. **66**: 191-198.
- HESS, M., HECKES, U., SKALE, A., SONDERMANN, W. & SPITZENBERG, D. (1999a): Die erste Gemeinschaftsexkursion der AG Wasserkäfer: Sammelergebnisse aus dem Biosphärenreservat "Mittlere Elbe" bei Aken (Sachsen-Anhalt). - Info.bl. AG Wasserkäfer **2**: 1-4.
- HEYNIG, H. & KRIENITZ, L. (1987): Interessante coccale Grünalgen (Chlorellales) aus einem Altwasser der Elbe (DDR). - Arch. Protistenkd. **134**: 49-58.
- HIEBSCH, H. (1983): Faunistische Kartierung der Fledermäuse in der DDR. Teil 1. - Nyctalus, N. F. **1**: 489-503.
- HIEBSCH, H. & HEIDECHE, D. (1987): Faunistische Kartierung der Fledermäuse in der DDR. Teil 2. - Nyctalus, N. F. **2**: 213-246.
- HIEKEL, I. & BELLSTEDT, R. (1989): Aktuelle Funde des Taumelkäfers *Orectochilus villosus* MÜLLER im Bezirk Cottbus (DDR) (Insecta, Coleoptera, Gyrinidae). - Entomol. Nachr. Ber. **33**: 123-126.
- HILBIG, W. (1970): Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaft im Naturschutzgebiet „Untere Mulde“. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **7**: 66-81.
- HILBIG, W. (1971): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. II. Die Röhrichtgesellschaften. - Hercynia, N. F. **8**: 256-285.
- HILBIG, W. (1971a): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. I. Die Wasserpflanzengesellschaften. - Hercynia, N. F. **8**: 4-33.
- HILBIG, W. (1973): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VII. Die Unkrautvegetation der Äcker, Gärten und Weinberge. - Hercynia, N. F. **10**: 394-428.
- HILBIG, W. (1975): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. XII. Die Großseggenrieder. - Hercynia, N. F. **12**: 341-356.
- HILBIG, W. (1977): Literaturdokumentation über Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **14**: 56-60.
- HILBIG, W. (1990): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. Bibliographie. Teil 2. - Hercynia, N. F. **27**: 142-175.
- HILBIG, W. & JAGE, H. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. V. Die annuellen Uferfluren (*Bidentetea tripartitae*). - Hercynia, N. F. **9**: 392-408.
- HILBIG, W. & JAGE, H. (1973): Zum Vorkommen von *Najas minor* ALL. im Mittelbegebiet. - Hercynia, N. F. **10**: 264-275.
- HILBIG, W. & REICHHOFF, L. (1971): Die Wasser- und Verlandungsvegetation im Naturschutzgebiet Sarenbruch bei Klieken, Krs. Roßlau. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **8**: 33-48.
- HILBIG, W. & REICHHOFF, L. (1974): Zur Vegetation und Flora des Naturschutzgebietes „Schollener See“, Kreis Havelberg. - Hercynia, N. F. **11**: 215-232.
- HILBIG, W. & REICHHOFF, L. (1977): Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Schelldorfer See“ bei Tangerhütte, Bez. Magdeburg. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **14**: 24-35.
- HILBIG, W., HEINRICH, W. & NIEMANN, E. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. IV. Die nitrophilen Saumgesellschaften. - Hercynia, N. F. **9**: 229-270.
- HILBIG, W., JAGE, H. & REICHHOFF, L. (1987): Die gegenwärtige Verbreitung der Wasserpflanzen im Mittelbegebiet (Abschnitt zwischen Schwarze Elster- und Saale-Mündung). - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **4**: 21-52.
- HILBIG, W., KNAPP, H. D. & REICHHOFF, L. (1982): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XIV. Die thermophilen, mesophilen und acidophilen Saumgesellschaften. - Hercynia, N. F. **19**: 212-248.
- HILDEBRANDT, H. (1908): Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna des Herzogtums Sachsen-Anhalt. - Mitt. Osterr. N. F. **13**.
- HILPRECHT, A. (1931): Das Biberschutzgebiet am Elbstrom. - Kosmos **28**: 67-69.
- HILPRECHT, A. (1961): Der Schollener See - Ein Naturschutzgebiet. - Natur und Heimat **10**: 356-359.
- HINSCHKE, A. (1930/33): Der Weiße Storch (*Ciconia c. ciconia* (L.)) in Anhalt und dem benachbarten Preußen. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **3**: 6-8.
- HINSCHKE, A. (1931): Beobachtungen einer Nilgans am Schönitzer See. - Beitr. Avifauna Anhalts **2**: 9.
- HINSCHKE, A. (1935): Bestand und Brutergebnisse des Weißen Storches (*Ciconia ciconia* (L.)) in Anhalt und den benachbarten preussischen Gebieten. - Beitr. Avifauna Anhalts **6**: 29-41.
- HINSCHKE, A. (1937): Durchzugsbeobachtung eines Schreiad-



- lers, *Aquila p. pomarina* BREHM, bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 21.
- HINSCHKE, A. (1937): Samtente, *Oidemia f. fusca*, in Anhalt. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 13.
- HINSCHKE, A. (1937): Wiesenpieper, *Anthus s. spinoletta* (L.), bei Vockerode. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 13-14.
- HINSCHKE, A. (1938): Bestand und Brutergebnisse des Weißen Storches - *Ciconia c. ciconia* (L.) - in Anhalt und den benachbarten preußischen Gebieten in den Jahren 1935 - 1937. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 22-25.
- HINSCHKE, A. (1956): Möwen über der Dessauer Mulde. - Dessauer Kulturspiegel **3**.
- HINSCHKE, A. (1957): Bibervater Behr und Biberschutz. - Dessauer Kulturspiegel **4**: 59-64.
- HINSCHKE, A. (1957): Stirbt der Biber aus? - Dessauer Kulturspiegel **4**: 2-5.
- HINSCHKE, A. (1958): Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris flavva* (GMELIN), im Raum Dessau-Köthen-Zerbst - Zugleich ein Beitrag zum Verhalten der Ohrenlerche im Überwinterungsgebiet. - Beitr. Vogelkd. **6**: 159-171.
- HINSCHKE, A. (1966): Rotkehlpieper bei Bösewig. - Apus **1**, **2**: 96-97.
- HINSCHKE, A. (1966): Überwinternde Seeadler *Haliaeetus albicilla* (L.) im Mittelbegebiet. - Apus **1**, **1**: 2-14.
- HINSCHKE, A. (1967): Purpurreiher bei Wittenberg. - Apus **1**, **3**: 138-139.
- HINSCHKE, A. (1968): Massierung von Turteltauben vor dem Herbstzug. - Apus **1**, **4**: 198-199.
- HINSCHKE, A. (1970): Zum Durchzug des Regenbrachvogels im Mittelbegebiet. - Apus **2**, **1**: 45-46.
- HINSCHKE, A. (1971): Der Greifvogelbestand der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau (Landschaftsschutzgebiet Mittlere Elbe). - Apus **2**, **4**: 171-177.
- HINSCHKE, A. (1974): Zwergschnäpper bei Dessau. - Apus **3**, **3**: 131-132.
- HINSCHKE, A. (1977): Eine Auenbrut der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - Apus **4**, **1**: 15-18.
- HINSCHKE, A. (1980): Notizen zur Mäusekalamität und Greifvogelanhäufung im Raum Bösewig - Klöden im Jahre 1978. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **17**: 27-30.
- HINSCHKE, A. (1986): Ein Durchzug- und Rastgebiet des Goldregenpfeifers im Mittelbegebiet. - Apus **6**, **4**: 145-150.
- HINSCHKE, A. & SCHWARZE, E. (1970): Beitrag zum Wintervorkommen des Gerfalcons, *Falco rusticolus* L., im Mittelbegebiet. - Apus **2**, **2**: 88-91.
- HINSCHKE, A. & WAHN, R. (1931): *Locustella fluviatilis* (WOLF) am Goldberger See. - Beitr. Avifauna Anhalts **2**: 7.
- HINSCHKE, A., TAUSCHER & WEICHEL, O. (1937): Weitere Kormoranbeobachtungen auf der Mittelbe. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 20-21.
- HOFFMANN, F. (1911): Verzeichnis der Phanerogamenfunde, die gelegentlich der Frühjahrs-Versammlung in Havelberg gemacht wurden. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **53**: 9-14.
- HOFFMANN, M. (1967): Ein Beitrag zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber albicus* MATSCHIE 1907 im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - Hercynia, N. F. **4**: 279-324.
- HOFFMANN, M. (1977): Ergänzungen zur Verbreitungsgeschichte des Bibers *Castor fiber albicus* im Großbeinzugsgebiet der Elbe. - Hercynia, N. F. **14**: 437-446.
- HOHMANN, M. (1998): Bemerkenswerte Köcherfliegenfänge im Tiefland von Sachsen/Anhalt. - Lauterbornia **34**.
- HOHMANN, M. (1998): Köcherfliegenfänge aus Nord- und Mitteldeutschland. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **10**: 191-201.
- HOLL, F. & HEYNOLD, G. (1842): Flora von Sachsen. - Dresden.
- HONIGMANN, H. L. (1910): Beiträge zur Molluskenfauna von Magdeburg. - Abh. Ber. Mus. Natur- Heimatkd. Magdeburg **2**: 31-48.
- HONIGMANN, H. L. (1911): Beiträge zur Molluskenfauna Magdeburgs nebst variationsstatistischen Untersuchungen über einige Arten. - Abh. Ber. Mus. Natur- Heimatkd. Magdeburg **2**: 113-161.
- HOPPENHAUS, K. & SENNE, S. (1993): Die Mulde seit 1700. Ein biokultureller Überblick. - Bauhaus Dessau.
- HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adepaga - Caraboidea. - Komm.-Verlag Goecke, Krefeld.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band II: Palpicornia - Staphylinoidea (außer Staphylinidae). - Frankfurt/M.
- HORION, A. (1951a): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, I. - Stuttgart.
- HORION, A. (1951b): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, II. - Stuttgart.
- HORION, A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III. - Eigenverlag, München.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VI: Lamellicornia. - Überlingen.
- HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VIII. - Überlingen.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae, 1. Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. - Überlingen.
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band X: Staphylinidae, 2. Teil: Paederinae bis Staphylinidae. - Überlingen.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI: Staphylinidae, 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). - Überlingen.
- HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae. - Überlingen.
- HORNUNG, E. G. (1844): Grundlage zu einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen. Erste Abtheilung: Die Lauf- und Schwimmkäfer. - Ber. Naturwiss. Ver. Harz: 1-24.
- HORNUNG, E. G. (1847) Nachträge zu der 1. Abtheilung des Verzeichnisses der Käfer des Harzes. - Ber. Naturwiss. Ver. Harz: 14-15.
- HORNUNG, E. G. (1856): Über *Hydroporus enneagrammus* AHR. und *Bembidium argenteolum* AHR. Protocoll der Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Wernigerode am 24. Juli 1833, nachträglich veröffentlicht in Berichte für das Jahr 1841/46. - Ber. Naturwiss. Ver. Harz: 14.
- HORST, K., KRAUSCH, H.-D. & MÜLLER-STOLL, W. R. (1966): Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel. - Limnologica **4**: 101-163.
- HUMMEL, D. (1997): Schreiadler (*Aquila pomarina*) an der unteren Havel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 62.
- HUNDT, R. (1954): Grünlandgesellschaften an der unteren Mulde und mittleren Elbe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **3**: 889-928.
- HUNDT, R. (1955): Die Grünlandvegetation an der Elbe, Saale und Mulde. - Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle, Math.-Naturwiss. Fak.
- HUNDT, R. (1958): Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropas. - I. Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde. - Nova Acta Leopoldina, N. F. **20**: 5-59, 88-156, 197-202, 1 Artenliste.
- HÜTTCHKE, K. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Heuschrecken. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 39-40.
- IBE, P. (1974): Blauracke in Steckby. - Apus **3**, **2/3**: 128-129.
- IBE, P. (1993): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus*). - In: Umweltamt Landeshauptstadt Magdeburg (Hrsg.): 1. Land-schaftstag 1993 - Die Elbaue: 77-80.
- IKSE (Internationale Kommission zum Schutz der Elbe)

- (Hrsg.) (1996): Die Fischfauna der Elbe. - Magdeburg. Informationsblatt der FG Entomologie Magdeburg: Enthalten Berichte von Exkursionen in verschiedene Gebiete des ehemaligen Bezirkes Magdeburg.
- JAECKEL, S. G. A. (1962): 2. Ergänzungen und Berichtigungen zum rezenten und quartären Vorkommen der mitteleuropäischen Mollusken. - In: BROHMER, P., EHRMANN, P. & ULMER, G. (Hrsg.): Die Tierwelt Mitteleuropas II. - Leipzig.
- JAGE, H. (1962): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VI). - Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Auengebiete. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **11**: 179-206.
- JAGE, H. (1963): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). - Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Auengebiete. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **12**: 695-706.
- JAGE, H. (1964a): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). - 7. *Lindernia dubia* auch in Deutschland (Zur Flora und Vegetation des mittleren Elbtals und der Dübener Heide. 3. Mitteilung). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **13**: 673-680.
- JAGE, H. (1964b): Neue Fundorte und bemerkenswerte Fundbestätigungen von höheren Pflanzen aus dem südlichen Fläming und dem mittleren Elbtal (rechtselbischer Anteil). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **101**: 59-70.
- JAGE, H. (1967): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). - Vorarbeiten zu einer Flora der Dübener Heide und ihrer näheren Umgebung. (4. Beitrag). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **16**: 851-861.
- JAGE, H. (1968): Vorarbeiten zu einer Flora der Dübener Heide und ihrer näheren Umgebung. (5. Beitrag). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **105**: 52-63.
- JAGE, H. (1974): Vorarbeiten zu einer Flora der Dübener Heide und ihrer näheren Umgebung. (6. Beitrag). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **109/111**: 3-55.
- JAGE, H. (1992): Floristische Besonderheiten im Wittenberg-Dessauer Elbtal (Sachsen-Anhalt). - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Naturschutz im Elbegebiet) **5**: 60-69.
- JAHN, H. & MÜLLER, K. H. (1976): *Podoscypha multizonata* (BERK & BR.) PAT. bei Dessau gefunden. - Westf. Pilzbr. **11**: 22-26.
- JAHN, K. (1972): Die Fische, Lurche, Kriechtiere und Säugetiere im Kreis Bernburg. - Veröff. Heimatforsch. Mus. Schloß Bernburg **1**: 67-71.
- JÄHRLING, K.-H. (1993): Struktur der Elbaue in Sachsen-Anhalt. - Information, Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg.
- JÄHRLING, K.-H. (1997): Ein neues Konzept für die Havel? Beitrag zur interdisziplinären Diskussion aus Sicht des Gewässerschutzes. - Information, Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg.
- JÄHRLING, K.-H. (1998): Deichrückverlegungen. Eine Strategie zur Renaturierung und Erhaltung wertvoller Flußlandschaften? - Information, Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg.
- JAKOBS, W. (1990): Die Amphibienfauna in der Elbaue des Kreises Wittenberg. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **27**: 43-47.
- JAKOBS, W. (1992): Die derzeitige Libellenfauna im Landkreis Wittenberg und Empfehlungen zu ihrem Schutz. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **29**, **2**: 25-30.
- JAKOBS, W. (1996): Zum Vorkommen des Kiemenfußes, *Siphonophanes grubei* (DYBOWSKI 1860), (Crustacea; Anostraca) im Landkreis Wittenberg. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **9**: 169-171.
- JOACHIMI (1794): Verzeichnis der selteneren, um Havelberg wildwachsenden Pflanzen. - Hoppes botanisches Taschenbuch, Regensburg: 92-100.
- JOHN, H. & ZENKER, E. (1978): Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Mitt. flor. Kart. Halle **4**: 36-55.
- JOHN, H. & ZENKER, E. (1982): Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. 2. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **8**: 18-29.
- JOHN, H. & ZENKER, E. (1985): Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. 3. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **11**: 46.
- JOOST, J. (1984): Erstnachweis von *Aphelocheirus aestivalis* (F.) im Bezirk Halle (Heteroptera, Aphelocheiridae). - Entomol. Nachr. Ber. **28**: 80-82.
- JORGA, W. & ERFURT, J. (1987): Zur Verbreitungsgrenze der Nordischen Wühlmaus (*Microtus oeconomus*) in der DDR. - Säugetierkd. Info. **2**: 415-422.
- JUNGBLUTH, J. H. et al. (1992): Mollusca (Weichtiere). - In: STRESEMANN, E. (Begr.) / HANNEMANN, H.-J., KLAUSNITZER, B. & SENGLAUB, K. (Hrsg.): Exkursionsfauna von Deutschland. Band 1: Wirbellose. - Gustav Fischer Verlag, Jena.
- JURGEIT, F., EPPERT, F. & HAENSCHKE, W. (1997): Muldeae in Sachsen-Anhalt. Geschützte Natur in der Muldeae. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **SH**: 50-61.
- JÜRGENS, W. (1939): Die Fischfauna der Gegend von Magdeburg. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **7**: 99-109.
- KAATZ, C. (1998): Bestandsübersicht Weißstorch Sachsen-Anhalt 1998. - In: Storchenhof Loburg (Hrsg.): Storchenkuriere Sachsen-Anhalt **13**.
- KAISER, P. (1892): Zur Flora von Schönebeck (Elbe). I. - Dt. Bot. Monatsschr. **10**: 54-57.
- KAISER, P. (1894): Zur Flora von Schönebeck (Elbe). II. - Dt. Bot. Monatsschr. **12**: 25-26.
- KAISER, P. (1896): Beiträge von Kryptogamen-Flora von Schönebeck an der Elbe I. - Wiss. Beilage Jahresber. Realprogymnasiums Schönebeck: 20-67.
- KAISER, P. (1907): Beiträge von Kryptogamen-Flora von Schönebeck an der Elbe II. - Wiss. Beilage Jahresber. Realprogymnasiums Schönebeck: 32-82.
- KAMMERAD, B. (1995): Die mittlere Elbe im Land Sachsen-Anhalt - Ein Vergleich: Fischarten und Fischerei heute und vor hundert Jahren. - Fischer und Teichwirt **46**: 300-303.
- KAMMERAD, B. (1995): Fischarten im sachsen-anhaltinischen Teil der Saale und Schlußfolgerungen für den Naturschutz. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **2**: 49-53.
- KAMMERAD, B. (1996): Die Fischarten der Ehle im Land Sachsen-Anhalt. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **33**, **1**: 34-40.
- KAMMERAD, B. (1997): Zur Neunaugenfischerei in der Mittel- elbe im Land Sachsen-Anhalt. - Fischer und Teichwirt **48**: 426-428.
- KAMMERAD, B. & WÜSTEMANN, O. (1990): Wachstum und Nahrung der Döbel (*Leuciscus cephalus* L.) im Elbe-Umflut-Kanal bei Magdeburg. - Fischökologie Aktuell **4**: 17-20.
- KAMMERAD, B. & WÜSTEMANN, O. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Fische und Rundmäuler. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 32-34.
- KAMMERAD, B., ELLERMANN, S., MENCKE, J., WÜSTEMANN, O. & ZUPPKE, U. (1997): Die Fischfauna von Sachsen-Anhalt - Verbreitungsatlas. - Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.), Magdeburg.
- KÄSEBIETER, F. (1938): Frühjahrsbeobachtung der Ringdrossel, *Turdus t. toquatus* L., 1936 bei Wörlitz. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **2**: 35-36.
- KÄSTNER, A., PARTZSCH, M. & BUSCHENDORF, J. (1993): Phytozoose und Herpetofauna der Gewässer- und Grabensysteme in einer stark anthropogen beeinflussten Landschaft. - Arch. Nat.schutz Landsch.pfl. **32**: 243-247.
- KEDING, A. (1995): Das Spatelblättrige Filzkraut (*Filago pyramidata* L.) nach 100 Jahren wiedergefunden. - Mitt. flor. Kart. Halle **20**: 58.

- KEIL, H. (1971): Flußuferläufer brütete erfolgreich an der Mittel-elbe. - *Apus* 2, 4: 194.
- KELLNER, J. (1992): Das Vorkommen von *Dicycla oo* (L.) im Dessauer Raum. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 7: 104.
- KELLNER, J. (1995): Die Großschmetterlingsfauna von Dessau und Umgebung. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **SH**.
- KERNEY, M. P., CAMERON, R. D. A. & JUNGBLUTH, J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. - Hamburg/Berlin.
- KERSTEN, K. (1929/30): Die Pilzforschung in Anhalt. - *Ber. Naturwiss. Ver. Dessau* 2: 55-58.
- KIRCHSTEIN, W. (1899): Verzeichnis von Ustilagineen, Uredineen, Erysipheen und Peronosporen aus der Mark Brandenburg. - *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 40: LV-LXVI.
- KISKER, G. (1926): Die Fischerei in der mittleren Elbe. - *Z. Fischerei* 24: 9-15.
- KISKER, G. (1934): Der Lachsfang in der Elbe und Saale in der Provinz Sachsen. - *Fischereizeitung* 37: 432-434.
- KLAPPER, H. (1960): Der biologische Zustand der Elbe im Gebiet der DDR. - *wvt Wasserwirtschaft Wassertechnik* 10: 444-448.
- KLAPPER, H. (1961): Biologisches Gütebild der Elbe zwischen Schmilka und Boizenburg. - *Intern. Revue ges. Hydrobiol.* 46: 51-64.
- KLÄUSNITZER, B. (1985): Zur Kenntnis der *Hyperaspis*-Arten der DDR (Col., Coccinellidae). - *Entomol. Nachr. Ber.* 29: 271-274.
- KLÄUSNITZER, B. (1993): Zur Eignung der Marienkäfer (Coccinellidae) als Bioindikatoren (Indikatoren, Zeigergruppe) für Landschaftsplanung und UVP in Deutschland. - *Insecta* 1: 184-194.
- KLEBAHN, H. (1912/14): Uredineae. - In: *Kryptogamenflora der Mark Brandenburg*. - **Va**: 69-904.
- KLIMA, F. (1994): Die aktuelle Gefährdungssituation der Köcherfliegen Deutschlands. - *Natur und Landschaft* 69: 511-518.
- KLOSZ, I. & KLOSZ, R. (1992): Beitrag zur Käferfauna des Schönhausener Raums. - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 1: 42-45.
- KLOSZ, R. (1993): Käferfauna um Schönhausen/Elbe. - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 2: 31-34.
- KLOSZ, R. (1995): Die Bockkäfer aus Schönhausen und Umgebung (Coleoptera; Cerambycidae). - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 4: 51-54.
- KLUGE, M. (1900): Unsere Elbefische. - *Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung* 52: 10-14
- KLUGE, M. (1904): Zum Neunaugenfang am Cracauer Elbewehr bei Magdeburg. - *Fischereizeitung* 7: 485-489.
- KLUGE, M. (1904): Zum Störfang am Cracauer Elbewehr in Magdeburg. - *Fischereizeitung* 7: 153-155/187-188.
- KNAPP, H.-D. & JESCHKE, L. (1991): Naturwaldreservate und Naturwaldforschung in den ostdeutschen Bundesländern. - *Schr.-R. Vegetationskd.* 21, Bonn.
- KNOPE, O. (1940): Zwei Bruten von Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata rubicola* L.) bei Aken a.d. Elbe. - *Beitr. Avifauna Mitteleuropas* 4: 54-58.
- KNÖSCHE, R. (1994/95): Planktische Primärproduktion und Phosphathaushalt in verschiedenen Gewässertypen der Unteren Havel bei Gülpe. - *Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg* 3/4: 35-41.
- KNÖSCHE, R. (1995): Zur Rolle der Sedimente in verschiedenen Gewässern der Unteren Havel. - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 4: 12-19.
- KNÖSCHE, R. (1996): Der Sauerstoffhaushalt in extrem flachen Gewässern, untersucht am Beispiel des Schollener Sees. - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 5: 14-21.
- KNÖSCHE, R. (1998): Zustand und Entwicklung der Fischfauna der Mittel-elbe unter Berücksichtigung von Artenschutzaspekten. - *Fischer und Teichwirt* 49: 396-399, 459-461, 491-494.
- KNÖSCHE, R., ZAHN, S., FLADUNG, E., SCHOPPE, P. & EBEL, H. (1996): Erarbeitung von Grundlagen und Richtwerten für den Wiederaufbau einer Fischerei auf der Elbe und ihren großen Nebenflüssen - Abschlußbericht 1996, Institut für Binnenfischerei, Potsdam-Sacrow.
- KNUTH, D. (1995): Die Fischfauna der Havel. - In: *Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.): Die Havel. - Studien und Tagungsberichte* 8: 63-73.
- KOCH, F. (1982): Ein Beitrag zur Symphytenfauna des mittleren Elbgebietes nebst Beschreibung des Männchens von *Macrophya tenella* MOCSÁRY, 1881 (Hymenoptera). - *Dt. Entomol. Z., N. F.* 29: 401-409.
- KOCH, M. (1934): Phänologische Beobachtungen an Amphibien bei Magdeburg. - *Bl. Aquarien- u. Terrarienk. XXXV*: 321-323.
- KOCH, O. (1969): Zur Geschichte der Seeadler im Raum an der Unteren Havel. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* 6: 21-26.
- KÖCK, U.-V. (1977): Das Vorkommen der Entenvögel (Anatidae) im Kreis Bitterfeld unter besonderer Berücksichtigung der ausgekohlten Braunkohlengruben. - *Hercynia, N. F.* 14: 447-463.
- KÖCK, U.-V. (1979): Die Gattung *Utricularia* L. in der Dübener Heide und im Untermuldegebiet. - *Mitt. flor. Kart. Halle* 5: 6-12.
- KÖCK, U.-V. (1979): Einige bemerkenswerte Limikolenbeobachtungen bei Bitterfeld im Herbst 1978. - *Apus* 4, 3: 129-130.
- KÖCK, U.-V. (1983): Zur Vegetation der stehenden Gewässer der Dübener Heide. - *Hercynia, N. F.* 20: 148-177.
- KÖHLER, H. (1962): Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteleuropäischen Ackerlandschaft. V. Ackerunkrautgesellschaften einiger Auengebiete an Elbe und Mulde. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math. Naturwiss. R.* 11: 207-250.
- KOLBE, E. (1932): Beobachtungen seltener Vögel in Anhalt. 1. *Surnia ulula ulula* (L.) bei Klieken. - *Beitr. Avifauna Anhalts* 3: 2.
- KOLBE, E. (1937): Die Gebirgsstelze, *Motacilla c. cinerea* TUNST, als Brutvogel bei Dessau-Roßlau. - *Beitr. Avifauna Mitteleuropas* 1: 18-20.
- KOLBE, H. (1960): Vorkommen des Schwarzstorchs im Landschaftsschutzgebiet Mittel-elbe. - *Der Falke* 7: 196-197.
- KOLBE, H. (1966): Über das Vorkommen der Weidenmeise (*Parus montanus* CONRAD) im Südfläming und im Mittel-elbegebiet. - *Apus* 1, 1: 45-47.
- KOLBE, H. (1969): Weitere Vorkommen der Weidenmeise im Mittel-elbegebiet. - *Apus* 1, 6: 297.
- KOLBE, H. (1971): Schwarzstörche im Kreise Zerbst. - *Zerbster Heimatkalender* 12: 79-82.
- KOLBE, M. (1954): Der Seeadler - Wintergast an der Elbe. - *Der Falke* 1: 63.
- KOLBE, M. (1961): Beitrag zum Vorkommen der Großtrappe. - *Der Falke* 8: 65-66.
- KOLBE, M. (1963): Die Trauerente (*Melanitta nigra*) im Gebiet der Mittel-elbe. - *Beitr. Vogelkd.* 8: 288-290.
- KOMPOSCH, C. (1997): Zur Weberknechtfauna (Arachnida, Opiliones). - *Untere Havel : Naturkd. Ber.* 6/7: 84-86.
- KÖNIG, H. & SCHNEIDER, R. (1969): Kurzschnabelgänse (*Anser brachyrhynchus* BAILL.) in der Elbaue nördlich Magdeburg und südlich Tangermünde. - *Naturkd. Jahresber. Mus. Heineanum* 4: 77-81.
- KÖNIGSTEDT, D. & NICOLAI, B. (1972): Zur Kenntnis der Avifauna des Kreises Burg. 1. Teil. - *Naturkd. Jahresber. Mus. Heineanum* 7: 43-80.
- KOOPS, H. (1960): Die Bedeutung der Staustufe Geesthacht für die Quappenfischerei der Elbe. - *Kurze Mitt. Inst. Fischereibiologie. Univ. Hamburg* 10: 43-56.
- KORMANN, B. & RASCHEWSKI, U. (1996): Phytoplanktodynamik in der Elbe bei Magdeburg in den Jahren 1993-1995. - *Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1996, Schwedt/Oder*: 323-327.



- KÖRNIG, G. (1992): Rote Liste der Mollusken des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **1**: 22-23.
- KÖRNIG, G. (1998): Rote Liste der Wassermollusken des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **30**: 24-27.
- KRAUCH, F. (1998): Täublinge im Guttauer Auwald/Sachsen. - Z. Mykol. **64**: 83-90.
- KRAUSE, F. (1980): Karmingimpel im Mittelbegebiet. - Apus **4**, **4**: 187-188.
- KREIBIG, K. (1956): Singschwäne an der Mittelbe. - Der Falke **3**: 169-170.
- KREISEL, H. (1971): Bibliographie der Verbreitungskarten von Pilzen Hymeno- und Gasteromyceten. - Feddes Repertorium **82**: 589-616.
- KREISEL, H. (1977): Verzeichnis der während der Exkursions-tagung im Gebiet der Mittelbe registrierten Pilze. - Mykol. Mitt. **21**: 103-110.
- KREISEL, H. (1984): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR. 6. Serie, Stielboviste (*Tulostoma*) der DDR und Westberlins. - Hercynia, N. F. **21**: 396-416.
- KREISEL, H. & MÜLLER, K. H. (1987): Das Pleurotetum cornu-copiae, eine Pilzgesellschaft an toten Ulmenstämmen. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **27**: 17-25.
- KREISEL, H., DÖRFELT, H. & BENKERT, D. (1980): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR. 3. Serie, ausgewählte Macromyceten. - Hercynia, N. F. **17**: 232-291.
- KRIEGER, W. (1927): Zur Biologie des Flußplanktons. Untersuchungen über das Potamoplankton des Havelgebietes. - Pflanzenforsch. **10**: 1-66.
- KRIENITZ, L. (1983): Einige chlorococcale Algen aus dem Gebiet der mittleren Elbe. - Arch. Protistenkd. **127**: 297-305.
- KRIENITZ, L. (1984): Zur Flora coccaler Grünalgen im Phytoplankton einiger Gewässer des Biosphärenreservates Steckby-Lödderitzer Forst (Kreis Schönebeck, Bez. Magdeburg). - Hercynia, N. F. **21**: 264-293.
- KRIENITZ, L. (1986): Drei neue Arten coccaler Grünalgen (Chlorellales) aus dem Plankton der Elbe. - Arch. Protistenkd. **132**: 299-311.
- KRIENITZ, L. (1987a): Einige neue und interessante coccale Grünalgen (Chlorellales) aus Flachgewässern des Elbe-Saale-Gebietes (DDR). - Limnologica **18**: 441-450.
- KRIENITZ, L. (1987b): Drei neue mischococcale Xanthophyceen aus dem Plankton der Elbe. - Arch. Protistenkd. **134**: 43-47.
- KRIENITZ, L. (1988): Algologische Beobachtungen in Gewässern des Biosphärenreservates „Steckby-Lödderitzer Forst“ (DDR). - Limnologica **19**: 61-81.
- KRIENITZ, L. (1990): Coccale Grünalgen der mittleren Elbe. - Limnologica **21**: 165-231.
- KRIENITZ, L. (1992): Algologische Beobachtungen in Gewässern des Biosphärenreservates „Steckby-Lödderitzer Forst“ (Deutschland) II. - Limnologica **22**: 51-81.
- KRIENITZ, L. (1994): Phytoplanktologisch-algenfloristische Untersuchungen im Gebiet der mittleren Elbe. - Dt. Ges. Limnologie, Erw. Zus. Jahrestagung 1994, Hamburg: 613-617.
- KRIENITZ, L. & HEYNIG, H. (1982): Beobachtungen an *Ankyra lanceolata* (KORS. 1953) FOTT 1957 und *Ankyra spatulifera* (KORS. 1953) FOTT 1957 (Chlorococcales) im Freiland. - Arch. Protistenkd. **126**: 265-271.
- KRIENITZ, L. & HEYNIG, H. (1983): Interessante planktische Xanthophyceen aus dem Elbe-Saale-Gebiet (DDR) I. - Arch. Protistenkd. **127**: 327-332.
- KRIENITZ, L. & HEYNIG, H. (1984): Interessante planktische Xanthophyceen aus dem Elbe-Saale-Gebiet (DDR) II. - Arch. Protistenkd. **128**: 147-157.
- KRIENITZ, L. & HEYNIG, H. (1992 b): *Tetraedriella verrucosa* (G. M. SMITH) comb. nova and its relation to *T. regularis* (KÜTZING) FOTT (Xanthophyceae). - Arch. Hydrobiol. Suppl. Algol. Stud. **65**: 1-10.
- KRIENITZ, L. & HEYNIG, H. (1992a): Interessante planktische Xanthophyceen aus dem Elbe-Saale-Gebiet (Deutschland) III. - Arch. Protistenkd. **141**: 101-117.
- KRIENITZ, L., HEGEWALD, E., REYMOND, O. & PESCHKE, T. (1993): Variability of LM, TEM and SEM characteristics of *Pseudogoniochloris tripus* gen. et comb. nov. (Xanthophyceae). - Arch. Hydrobiol. Suppl. Algol. Stud. **69**: 67-82.
- KRIENITZ, L., PESCHKE, T. & GIERING, B. (1990): Lichtmikroskopische, rasterelektronenmikroskopische und röntgenmikroanalytische Untersuchungen an *Hemitoma maeandrocystis* SKUJA (Chlorophyta, Phacotaceae). - Arch. Protistenkd. **138**: 159-170.
- KUHLIG, A. & HEINL, K. (1983): Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld. Teil 1. - Bitterfelder Heimatbl. **SH**: 1-48
- KUHLIG, A. & HEINL, K. (1983): Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld. Teil 2. - Bitterfelder Heimatbl. **SH**: 50-96.
- KÜHNEL, H. (1974): Faunistische Notizen : 17. Der Buntkäfer *Tillus unifasciatus* (Col., Cleridae) im Mittelbegebiet. - Entomol. Nachr. Ber. **18**: 189.
- KÜHNEL, H. (1994): Zur Biologie und Verbreitung von *Orthopleura sanguinicornis* (F.) (Col. Cleridae) im Mittelbegebiet. - Entomol. Nachr. Ber. **38**: 53-54.
- KÜHNEL, H. & MAI, A. (1985): Massenaufreten von *Allonyx quadrimaculatus* (Col. Cleridae) im Mittelbegebiet. - Entomol. Nachr. Ber. **29**: 281-282.
- KÜHNEL, H. & NEUMANN, V. (1975): Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennaturdenkmal "Südrand des Ochsenbusches", Forstrevier Diebzig, Kr. Köthen. - Entomol. Nachr. **19**: 196-197.
- KÜHNEL, H. & NEUMANN, V. (1977): Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bezirk Halle. 1. Mitteilung: Bockkäfer (Cerambycidae). - Entomol. Nachr. **21**: 145-159.
- KÜHNEL, H. & NEUMANN, V. (1979): Der Südrand des Ochsenbusches bei Diebzig - ein Flächennaturdenkmal zum Schutze seltener Käfer. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **16**: 51-54.
- KÜHNEL, H. & NEUMANN, V. (1981): Die Lebensweise des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.). - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **18**: 7-14.
- KUMMER, J. (1993): Karmingimpel und Silbermöwe am Schollener See. - Apus **8**, **4**: 191.
- KUMMER, J. (1993): Ornithologische Beobachtungen am Schollener See. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **2**: 40-47.
- KUMMER, J. (1994): Die Bismartrate. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 48-50
- KUMMER, J. (1994): Neue Beobachtungen am Schollener See. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 56.
- KUMMER, J. (1994): Zur Wanzen-Fauna des Elb-Havel-Winkels und seiner Umgebung (Insecta, Heteroptera). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 42-48.
- KUMMER, J. (1995): Bemerkungen zum Vorkommen des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Elb-Havel-Winkel und der Altmark. - Untere Havel : Naturkundliche Berichte, **4**: 61-63.
- KUMMER, J. (1995): Die Wollhandkrabbe. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 74.
- KUMMER, J., MÜLLER, M. & STEIN, H. (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. - Naturkd. Jahrb. Mus Heineanum **8**: 31-77.
- KUMMER, P. (1874): Der Führer in die Flechtenkunde. - Verlag Julius Springer, Berlin.
- KUMMER, V. (1997): Der Große Burgwall bei Havelberg - ein bemerkenswerter Pilzstandort. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 16-19.
- KURTHS, J. (1959): Austernfischer bei Magdeburg und Steckby. - Der Falke **6**: 68.
- LANGE, E. & SUCCOW, M. (1985): Zur Entwicklungs- und Vegetationsgeschichte des Moores „Düstere Lake“ bei Havelberg. - Gleditschia **13**: 183-191.

- LANGE, U. (1978): Chile-Flamingo an der Elbe und im NSG „Gerlebogker Teiche“. - Apus 4, 2: 93-94.
- LASSMANN, R. (1934): Beitrag zur Dipterenfauna von Halle und Umgebung. - Mitt. Entomol. Ges. Halle 13: 9-23.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1993): Gewässergütebericht Sachsen-Anhalt 1992. - Halle.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1994): Gewässergütebericht Sachsen-Anhalt 1993. - Halle.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1997): Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts. - Gustav Fischer Verlag, Jena/Stuttgartart.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1997): Fließgewässerprogramm Sachsen-Anhalt 1997. - Halle.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1997): Gewässergütebericht Sachsen-Anhalt 1996. - Halle.
- LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1998): Gewässergütebericht Sachsen-Anhalt 1997. - Halle.
- LEIBE, P. (1997): Zur Wanzenfauna (Hemiptera, Heteroptera) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elbe-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkd. Ber. 6/7: 102-104.
- LEIPNITZ, W. & KÄDING, H. (1996): Extensive Bewirtschaftung der Feuchtgrünlandflächen in den Poldern Niedere Laken, Kümmernitz und Vehlgest. - Untere Havel : Naturkd. Ber. 5: 51-56.
- LIEDEL, K. (1987): Zum Vorkommen der Weidenmeise an der Mittelbe. - Apus 6, 5: 238.
- LILL, E. (1986): Das Vorkommen des Schwarzstorches in der Kühnauer Elbaue nordwestlich von Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 19-22.
- LIMBURG, S., FRECOT, E., BERBIG, A. & HERRMANN, A. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Die Entwicklungskonzeption des NSG „Untere Havel/Sachsen-Anhalt“. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt 32, SH: 55-58.
- LINDAU, G. (1905): Zur Geschichte der Spitznuss und des Kühnauer Sees bei Dessau: Ein Beitrag zur Landeskunde von Anhalt. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 47: 1-19.
- LINDAU, G. (1912): *Hemibasidii* (Ustiliganeae). - In: Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. - Va: 1-68.
- LIPPERT, W. (1963): Brutversuch von *Haliaeetus albicilla* (L.) westlich der Elbe in der Altmark. - Die Vogelwelt : Z. Vogelkd. Vogelschutz 84: 154-155.
- LIPPERT, W. (1964): Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) bei Tangermünde/Elbe und auf Usedom. - Beitr. Vogelkd. 9: 376-377.
- LIPPERT, W. (1964): Über eine Zweitbrut der Beutelmeise (*Remiz pendulimis*) und die dabei beobachtete Nestfolge. - Beitr. Vogelkd. 10: 193-198.
- LIPPERT, W. (1966): 5 Jahre Naturschutzgebiet Schelldorfer See. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg 3: 32-38.
- LIPPERT, W. (1966): Spornammerbeobachtung aus der Elbaue bei Tangermünde. - Der Falke 13: 138.
- LIPPERT, W. (1966): Wanderfalkenbruten in der südlichen Altmark bei Tangermünde/Elbe. - Beitr. Vogelkd. 11: 338-339.
- LIPPERT, W. (1967): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I: Nonpasseres. - Beitr. Vogelkd. 13: 47-71.
- LIPPERT, W. (1968): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I: Nonpasseres. - Beitr. Vogelkd. 14: 340-350.
- LIPPERT, W. (1969): Die Ergebnisse der 3. Elbe-Wasservogel-Zählung (1967). - Der Falke 16: 131-137.
- LIPPERT, W. (1970): Ein Seehund (*Phoca vitulina*) an der Elbe zwischen Derben und Wittenberge. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. 10: 285-286.
- LIPPERT, W. (1973): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I: Nonpasseres. - Beitr. Vogelkd. 19: 179-186.
- LIPPERT, W. (1974): Massendurchzug des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) in der Elbaue südlich Tangermünde. - Beitr. Vogelkd. 20: 319-320.
- LIPPERT, W. (1974): Rallenreier, *Ardeola ralloides*, südlich Tangermünde/Elbe beobachtet. - Beitr. Vogelkd. 20: 247.
- LIPPERT, W. (1974): Zweiter Brutnachweis von *Porzana parva* in der Elbaue südlich Tangermünde (Altmark) im NSG Schelldorfer See. - Beitr. Vogelkd. 20: 237-248.
- LIPPERT, W. (1975): Massenansammlung von Silbermöwen, *Larus argentanus*, in der Elbaue südlich Tangermünde. - Beitr. Vogelkd. 21: 152.
- LIPPERT, W. (1977): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I: Nonpasseres. - Beitr. Vogelkd. 23: 249-264.
- LIPPERT, W. (1983): Sumpfhöhren-Bruten in der Elbaue südlich Tangermünde. - Apus 5, 2: 84-85.
- LIPPERT, W. & LOOSE, J. (1972): Zur Vogelwelt des NSG „Schelldorfer See“ und zur Situation des Naturschutzes. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. 9: 50-64.
- LIPPERT, W. & MASS, K. (1980): Zur Ausbildung einer neuen Überwinterungstradition des Zwergschwans in der Elbniederung bei Tangermünde unter Berücksichtigung der Sing-schwanz-Beobachtungen. - Der Falke 27: 366-374.
- LOOSE, J. (1968): Mittelsäger auf der Elbe bei Tangermünde. - Der Falke 15: 174.
- LOOSE, J. (1968): Purpurreier am Schelldorfer See. - Apus 1, 5: 250-251.
- LOOSE, J. (1968): Weißflügelseeschwalbe am Schelldorfer See. - Apus 1, 5: 254.
- LOOSE, J. & LIPPERT, W. (1967): Brandgansbrut in der Elbaue bei Tangermünde. - Beitr. Vogelkd. 12: 373.
- LOOSE, J. & LIPPERT, W. (1967): Reiherentenbruten in der Elbaue bei Tangermünde/Altmark. - Der Falke 14: 174-175.
- LORENZ, H. (1939): Zwei wenig bekannte Lachmöven im Regierungsbezirk Magdeburg. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands 3: 31-33.
- LORENZ, H. (1947): Über den Durchzug der Schnepfenvögel (*Limicolae*) und Zahnschnäbler (*Lamellirostres*) durch das Elbtal bei Magdeburg. - Mitt. Mus. Naturkd. Vorgesch. Halle 1: 71-79.
- LOTT, K. (1991): Der Obstbau im Reformwerk des Fürsten FRANZ - Rahmen und Ziele sinnvoller Rekonstruktionen des landschaftlichen Gesamtbildes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 6: 37-58.
- LOTZING, K. (1996): Ein Beitrag zum aktuellen Kenntnisstand der Verbreitung von *Calopteryx splendens* HARRIS (Odonata) in Sachsen-Anhalt. - Entomol. Nachr. Ber. 40: 23-26.
- LOTZING, K. (1998): *Libellula fulva* O. F. MÜLLER, 1764 in Sachsen-Anhalt. - halophila 5: 3.
- LUDWIG, O. (1957): Storchzählungen im Bezirk Magdeburg. - Nat.schutz Landsch.gestalt. Bez. Magdebg. 2: 27-31.
- LUDWIG, O. (1959): Neue Ergebnisse der Storchzählungen im Bezirk Magdeburg. - Nat.schutz Landsch.gestalt. Bez. Magdebg. 3: 64-66.
- LUDWIG, O. (1961): Fortsetzung der Storchzählung im Bezirk Magdeburg. - Nat.schutz Landsch.gestalt. Bez. Magdebg. 4: 47.
- MAASS, K. (1978): Ornithologische und herpetologische Beobachtungsergebnisse aus dem NSG „Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge“. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. 15 BH: 96-97.
- MAASS, K. (1993): Der Landkreis Osterburg als weißstorchreichster Kreis im Land Sachsen-Anhalt. - In: Ministerium für Umwelt und Naturschutz (Hrsg.): Praktischer und

- wissenschaftlicher Storchenschutz in Sachsen-Anhalt. 1. Sachsen-Anhaltischer Storchentag. - Tagungsband, 20-24.
- MAASS, K., STEINKE, G. et al. (1973/79): Ornithologischer Arbeitskreis Altmark. Avifaunistischer Jahresbericht 1972-1978 für die Altmark.
- MAGNUS, P. (1890): Verzeichnis der am 15. und 16. Juni 1889 bei Tangermünde beobachteten Pilze. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **31**: XXII-XXVI.
- MAGNUS, P. (1894a): Verzeichnis der bei Burg bei Magdeburg am 19. April und 27.-28. Mai 1893 beobachteten Pilze. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **35**: XXIII-XXV.
- MAGNUS, P. (1894b): Die Peronosporen der Provinz Brandenburg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **35**: 55-87.
- MAGNUS, P. (1896): Die Ustilagineen (Brandpilze) der Provinz Brandenburg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **37**: 66-97.
- MAGNUS, P. (1897): Nachtrag zu der Aufzählung der Peronosporen, Exoascen und Ustilagineen der Provinz Brandenburg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **38**: 1-10.
- MAHN, E. G. & REICHHOFF (1976): Das Flächennaturdenkmal „Raumerwiesen“ im Kreis Dessau - ein interessanter Standort der Mädesüß-Wiesenhafer-Gesellschaft (Filipendulo-helicotrichetum MAHN 65). - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg. **13**: 42-57.
- MALCHAU, W. (1992): Zum Vorkommen der Bockkäfer (Cerambycidae) im Gebiet um Schönebeck. - Entomol. Nachr. Ber. **36**: 191-196.
- MALCHAU, W. (1995): Rote Liste der Hirschkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **18**: 11-12.
- MALCHAU, W. & GRILL, E. (1994): Ergebnisse von Bestandserhebungen zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) in ausgewählten Biotopen des Gebietes um Schönebeck. - Mitt.bl. Entomol. Ver. Sachsen-Anhalt **2**: 53-65.
- MARTENS, A. & GASSE, M. (1995): Die Südliche Mosaikjungfer *Aeshna affinis* in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (Odonata: Aeshnidae). - Braunschweiger Naturkd. Schr. **4**: 795-802.
- MALCHAU, W. & SCHORNACK, S. (2000): Coleoptera (Käfer). Zur Bestandssituation wirbelloser Arten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt, **SH**: 21.
- MARTINKÖWITZ, G. (1983): Der nördliche Stachelseitling, *Climacodon septendrialis*, bei Roßlau. - Mykol. Mitt. **26**: 19.
- MÄRZ, R. (1963): Nachweis von Schläfern aus Gewöllen. - Beitr. Vogelkd. **8**: 388-396.
- MASURAT, G., PESCHEL, R. & STEPHAN, S. (1968): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1967 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachr.bl. Dt. Pflanzenschutzdienst, N. F. **22**: 103-132.
- MATHYL, E. (1984): Bemerkenswerte Carabidenfunde an der Elbe. - Entomol. Nachr. Ber. **28**: 40-41.
- MATSCHE, P. (1887): Verbreitung der Vögel Deutschlands in kartographischer Darstellung : I. Versuch einer Darstellung der Verbreitung von *Corvus corone* L., *Corvus cornix* L. und *Corvus frugilegus* L. - J. Ornith. **35**: 617-648.
- MATTHEY, K. (1987): Die heutigen Gehölzarten des Elbhavelwinkels. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **7**: 70ff.
- MATTHEY, K. (1988): Die heutigen Gehölzarten des Elbhavelwinkels. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **8**: 79ff.
- MATTHEY, K. (1992): Gehölze in der Elbniederung - nur noch Reste einst üppiger Auwälder. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **1**: 2-6.
- MATTHEY, K. (1994): Kleine Fremdlinge in der Pflanzenwelt der Altmark und des Elb-Havel-Winkels. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 14-18.
- MATZ, A. (1877): Beitrag zur Flora der nordöstlichen Altmark mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Seehausen. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **19**: 42-57.
- MATZKE, M. (1975): Molluskenbesiedlung von Grünlandgesellschaften im mittleren und südlichen Teil der Deutschen Demokratischen Republik. - Malakol. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **4**: 207-221.
- MATZKE, M. (1976): Zur Schneckenbesiedlung von Auenwiesen im Süden der Deutschen Demokratischen Republik. - Malakol. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **5**: 129-132.
- MEINEKE, T. & MENGE, K. (1993): *Tetrix ceperoi* (BOLIVAR, 1887) und andere bemerkenswerte Heuschrecken in Sachsen-Anhalt gefunden (Orthoptera: Tettigoniidae, Tetrigidae, Acrididae). - Entomol. Z. **103**: 367-375.
- MEISTER, A. (1994): Untersuchung zum Plankton der Elbe und ihrer größeren Nebenflüsse. - Limnologica **24**: 153-171.
- MERZWEILER, A. (1965): Die Vogelwelt der unteren Schwarzen Elster (Jessen/Elster und Umgebung). - Beitr. Vogelkd. **11**: 55-76.
- MEUSEL, H. (1937/38): Pflanzegeographische Gliederung des mitteldeutschen Raumes. - Mitt. sächs.-thür. Ver. Erdkd. **61/62**: 1-87.
- MEUSEL, H. (1940/44): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 5. Reihe. - Hercynia **3**: 310-337.
- MEUSEL, H. (1940/44): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 6. Reihe. - Hercynia **3**: 661-676.
- MEUSEL, H. (1951/52): Die Eichen-Mischwälder des Mitteldeutschen Trockengebietes. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **1**: 49-72.
- MEUSEL, H. (1953/54): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 7. Reihe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **3**: 11-49.
- MEUSEL, H. (1954/55): Entwurf zu einer Gliederung Mitteldeutschlands und seiner Umgebung in pflanzengeographische Bezirke. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **4**: 637-642.
- MEUSEL, H. (1955): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 8. Reihe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **5**: 297-334.
- MEUSEL, H. (1959): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 9. Reihe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **9**: 165-224.
- MEUSEL, H. (1962): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10. Reihe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **11**: 1245-1318.
- MEUSEL, H. & BUHL, A. (1968): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 11. Reihe. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **17**: 377-439.
- MEUSEL, H. & RAUSCHERT, S. (1973): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIV). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **22**: 7-103.
- MEY, W. (1981): Lichtfangergebnisse bei Köcherfliegen im Havelseengebiet. - Beitr. Entomol. **31**: 333-339.
- MIELKE, U. (1971): Epixyle Flechten in der Stadt Magdeburg. - Hercynia, N. F. **8**: 172-177.
- MISSBACH, D. (1993): Die Elbe - Lebensraum für den Kranich? - In: Umweltamt Landeshauptstadt Magdeburg (Hrsg.): 1. Landschaftstag 1993 - Die Elbaue: 19-26.
- MISSBACH, D. & KOOP, D. (1970): Der Rotschenkel - *Tringa totanus* (L.) - als Brutvogel an der unteren Saale, Mittelelbe und in der Börde. - Apus **2**, **2**: 49-54.
- MOHR, K.-H. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera-Chrysomelidae: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clytrinae. - Beitr. Entomol. **35**: 219-262.
- MORITZ, C. (1991): Ökofaunistische Untersuchungen in wechselfeuchten Wiesenbiotopen unter besonderer Berücksichtigung der Chloropidae (Diptera: Brachycera) und Saltatoria (Orthoptera). - Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
- MRLU (Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt) (Hrsg.) (2000): NATURA 2000 Besondere Schutzgebiete Sachsens-Anhalts nach der Vogelschutzrichtlinie



und der FFH-Richtlinie. - Magdeburg.

MÜHLE, R.-U. (1994): Makroskopische Bodentiere als Indikatoren für den Gewässerzustand an der Unteren Havel. - Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg **4**: 24-29.

MÜLLER, J. (1970): Das Vorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus* L.) im Gebiet der Magdeburger Börde, der unteren Saale und der Mittel-Elbe bis zum Jahre 1967. - Beitr. Vogelkd. **15**: 381-390.

MÜLLER, J. (1980): Libellenfunde (Insecta, Odonata) in Naturschutzgebieten des Bezirkes Magdeburg, DDR. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **20**: 145-153.

MÜLLER, J. (1982): Beitrag zur Verbreitung der Wasserläufer (Insecta, Heteroptera, Gerridae) im Bezirk Magdeburg. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **12**: 59-68.

MÜLLER, J. (1993): Zum Vorkommen einiger bemerkenswerter annueller Blütenpflanzen im mittleren Sachsen-Anhalt. - Mitt. flor. Kart. Halle **18**: 28-32.

MÜLLER, J. (1995): Zur Flora des Magdeburger Elbegebietes. - Mitt. flor. Kart. Halle **20**: 68-81.

MÜLLER, J. (1995a): Vorläufige Mitteilung zum Vorkommen der Südlichen Mosaikjungfer *Aeshna affinis* (Odonata) im Jahre 1995 in Sachsen-Anhalt. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **3**: 21-22.

MÜLLER, J. (1995b): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Libellen. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 36-38.

MÜLLER, J. (1996a): Südliche Mosaikjungfer (*Aeshna affinis*) - Invasionsart oder Neubürger? - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **33**, **1**: 2.

MÜLLER, J. (1996b): Ökofaunistische Übersicht zum Vorkommen der Federlibelle *Platycnemis pennipes* (Odonata) in Sachsen-Anhalt. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **4**: 28-31, 47.

MÜLLER, J. (1996c): Vorläufige Mitteilung zum indigenen Vorkommen der Asiatischen Keiljungfer *Gomphus flavipes* (Odonata) im Biosphärenreservat Mittlere Elbe / Flußlandschaft Elbe. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **4**: 44-46.

MÜLLER, J. (1996d): Zum Vorkommen der Gemeinen Keiljungfer *Gomphus vulgatissimus* L. (Odonata) im Mittellandkanal (Naturpark Drömling, Sachsen-Anhalt). - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **19**: 13-18.

MÜLLER, J. (1997a): „FFH-Libellen“. - pedemontanum **1**: 2.

MÜLLER, J. (1997b): Zur Bedeutung der indigenen Neubürger *Aeshna affinis* und *Gomphus flavipes* im Biosphärenreservat Mittlere Elbe / Flußlandschaft Elbe. - Tagungsband, 16. Jahrestagung GdO 14.-16.03.1997, Nürnberg: 13.

MÜLLER, J. (1997c): Mittellandkanal und Elbe als Refugien gefährdeter Keiljungferarten. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **1**: 52-56.

MÜLLER, J. (1997d): *Gomphus (Stylurus) flavipes* (CHARPENTIER) in der Elbe von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie in der Weser bei Bremen (Anisoptera: Gomphidae). - Libellula **16**: 169-180.

MÜLLER, J. (1998a): Neuigkeiten zum Vorkommen von *Gomphus (Stylurus) flavipes* und *Ophiogomphus cecilia* in Elbe und Weser. - Tagungsband, 17. Jahrestagung GdO 20.-22.03.1998, Bremen: 10-11.

MÜLLER, J. (1998b): Aufruf zur Mitarbeit: *Anax parthenope* in Sachsen-Anhalt. - pedemontanum **2**: 5.

MÜLLER, J. (1999): Zur Naturschutz-Bedeutung der Elbe und ihrer Retentionsflächen auf der Grundlage stenöker Lebensraumtypischer Libellenarten (Insecta, Odonata). - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **21**: 3-24.

MÜLLER, J. & BUSCHENDORF, J. (1993): Rote Liste der Libellen des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **9**: 13-16.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1997a): Zwischenergebnis 1997

zum aktuellen Vorkommen von *Gomphus flavipes* in der Elbe von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und der Weser bei Bremen. - Hagenia **14**: 21-22.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1997b): *Aeshna affinis* hat 1966 zu 1997 erfolgreich überwintert. - pedemontanum **2**: 4-5.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1998a): Neues von der Elbe bzw. aus dem Elbtal. 2. *Gomphus vulgatissimus* nun auch in der Elbe. 3. Weitere Nachweise von *Ophiogomphus cecilia* und *Gomphus flavipes*. 4. *Aeshna affinis* - Reproduktionsgewässer fast ausgetrocknet. - halophila **36**: 2-3.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1998b): Libellen- und Heuschrecken-Funde im NSG Untere Mulde. - halophila **36**: 3.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1998c): Ergebnis der „Aktion flavipes 1997“. - pedemontanum **2**: 3-4.

MÜLLER, J. & STEGLICH, R. (1999): Zur aktuellen Verbreitung und Bestandsentwicklung der Südlichen Mosaikjungfer *Aeshna affinis* (Odonata) in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1993 bis 1998. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **7**.

MÜLLER, J., LOTZING, K., CIUPA, W., CONRAD, F. & SPITZENBERG, D. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg. 1. Einleitung und Libellenfunde (Odonata) am Schollener See (Kr. Havelberg). - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **19**: 25-38.

MÜLLER, J., RENKER, C. & HEINRICHS, J. (1998): *Juncus atratus* KROCKER und *Orobanche alsatica* KIRSCHL., zwei bemerkenswerte Funde in Sachsen-Anhalt. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **3**: 127-132.

MÜLLER, J., SPITZENBERG, D. & LOTZING, K. (1982): Entomofaunistische Notizen aus den Einzugsbereichen der Ohre (Kreise Klötze, Haldensleben, Wolmirstedt) und des Tanger (Kreis Tangerhütte). - Jahresh. Mus. Wolmirstedt **6**: 3-18.

MÜLLER, J., STROBL, P. & LOTZING, K. (1980): Neue bemerkenswerte Libellenfunde (Insecta, Odonata) im Bezirk Magdeburg. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **12**: 75-80.

MÜLLER, K. H. (1970): *Formitopsis cytisina* Eschenbaumschwamm (bei Vockerode). - Mykol. Mitt. **14**: 93-94.

MÜLLER, K. H. (1973): *Phellinus hartigii* bei Dessau. - Mykol. Mitt. **17**: 54-55.

MÜLLER, K. H. (1981): Bemerkenswerte holzbewohnende Pilze bei Vockerode II. - Mykol. Mitt. **25**: 25-27.

MÜLLER, K. H. et al. (1975): Bemerkenswerte holzbewohnende Pilze bei Vockerode. - Mykol. Mitt. **19**: 8-19.

MÜLLER, U. (1984): Das Phytoplankton der Elbe. I. Jahreszyklus der Bacillariophyceae im Süßwasserbereich bei Pevedorf. - Arch. Hydrobiol. Suppl. (Untersuchung Elbe-Aestuar **5**) **61**: 587-603.

MÜLLER-STOLL, W. R., FISCHER, W. & KRAUSCH, H. D. (1962): Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen. 4. Reihe. - Wiss. Z. Pädagogische hochschule Potsdam, Math.-Naturwiss. R. **7**: 95-150.

MUN (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt) (Hrsg.) (1994): Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg.

NAACKE, J. (1997): Auswertung der Ergebnisse der Gänsezählungen 1995/96 in den neuen Bundesländern. - Bucephala **3**: 19-33.

NÄGLER (1925): Die Pilzvegetation der Elbauen (Oberluch bei Roßlau). - Z. Pilzkd. **7**: 102-103.

NAUMANN, J. F. (1850): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in unserm Anhalt. - Naumannia : Arch. f. Ornith. **1**: 1-23.

NAUMANN, J. F. (1853): Das Frühjahr 1853 und unsere Zugvögel in Anhalt. - Naumannia : Arch. f. Ornith. **4**: 353-362.

NEBEL, L. (1894): Die Käfer des Herzogtums Anhalt. 1. Cerambycidae. - Dessau.

NELLEN, W., THIEL, R. & GINTER, R. (1999): Ökologische Zusammenhänge zwischen Fischgemeinschafts- und Lebens-

- raumstrukturen der Elbe (ELFI). - Sachstandsber. 01.03.1997-31.01.1999, Univ. Hamburg.
- NELLEN, W., THIEL, R., HÖLKER, F. & BRECKLING, P. (1994): Überlegungen zu fischereilichen Perspektiven der Elbe. - *Fischer und Teichwirt* **7**: 265-267.
- NEUMANN, V. & HEIDECHE, D. (1989): Die Verbreitung von *Lepidurus apus* L. und *Triops cancriformis* BOSCH in der DDR. - *Hercynia*, N. F. **26**: 387-399.
- NEUMANN, V. & KÜHNEL, H. (1980): Zum gegenwärtigen Vorkommen des Heldbockes (*Cerambyx cerdo* L.) in der DDR. - *Arch. Nat.schutz Landsch.forsch.* **20**: 235-241.
- NICHT, M. (1973): Über die Säugetiere des Naturschutzgebietes „Kreuzhorst“ (Bezirk Magdeburg). - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **10**: 55-77.
- NICHT, M. (1993): Notizen zur Säugetierfauna von Magdeburg und Umgebung. - In: Umweltamt Landeshauptstadt Magdeburg (Hrsg.): 1. Landschaftstag 1993 - Die Elbaue: 49-56.
- NICOLAI, B. (1970): Wiesenweihe - Brutvogel an der Mittelbe. - *Der Falke* **17**: 119-121.
- NICOLAI, B. (1970/71): Das Vorkommen des Triels, *Burhinus oedicnemus* (L.), im Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises Mittelbe-Börde. - *Naturkd. Jahresber. Mus. Heineanum* **5/6**: 75-82.
- NICOLAI, B. (1992): Zur avifaunistischen Bedeutung des Mittelbegebietes (Sachsen-Anhalt). - *Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Naturschutz im Elbegebiet)* **5**: 42-53.
- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. - Gustav Fischer Verlag, Jena/Stuttgart.
- NICOLAI, B. (1994): Steinkauz *Athene noctua* (SCOPOLI, 1769). Information. - In: Ministerium für Umwelt und Naturschutz (Hrsg.): Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg.
- NICOLAI, B., BRIESEMEISTER, E., STEIN, H. & SEELIG, K.-J. (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. - Kulturbund der DDR, Magdeburg.
- NIEMANN, G. (1929/38): Die Halophytenvegetation des Magdeburger Florenbezirkes. - *Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg* **6**: 351-367.
- NITSCHKE, K.-A. (1981): Schutz des Elbebibers (*Castor fiber albicus*) im Kreis Dessau. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **2**: 71-76.
- NITSCHKE, K.-A. (1985): Mistel (*Viscum album*) als Nahrung des Elbebibers. - *Säugetierkd. Info.* **9**: 282.
- NITSCHKE, K.-A. (1987): Wiederholt Mistel (*Viscum album*) als Nahrung des Elbebibers (*Castor fiber*). - *Säugetierkd. Info.* **11**: 499-500.
- NITSCHKE, K.-A. (1988): Elbebiber im Stadtkreis Dessau. - *Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg.* **25**: 38.
- NITSCHKE, K.-A. (1990): Elbebiber (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907) im Stadtkreis Dessau - Bestandsentwicklung und Tendenzen. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **5**: 35-49.
- NÖTHLICH, I. (1972): Trophische Struktur und Bioaktivität der Planktongesellschaft im unteren limnischen Bereich des Elbe-Aestuars. - *Arch. Hydrobiol. Suppl. (Untersuchung Elbe-Aestuar 4)* **43**: 33-117.
- NÜSSLER, H. (1969): Funde von *Carabus marginalis* F. aus der Mulde (Col. Carabidae). - *Entomol. Nachr.*, **12**: 137-138.
- OESMANN, S., SCHOLTEN, M., HOLST, H. & THIEL, R. (1998): Fischgemeinschaften in unterschiedlichen Nebengewässern der Elbe. - In: GELLER, W. et al. (Hrsg.): 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe“: 239-240.
- OHLENDORF, B. (1990): Wiederfunde Harzer Bartfledermäuse (*Myotis mystacinus* und *Myotis brandti*) und Bemerkungen zum Wanderverhalten und zum Alter der beiden Arten. - *Nyctalus*, N. F. **3**: 119-124.
- OHLENDORF, B. (1998a): Beobachtungen an interspezifischen Reproduktionsgesellschaften (*Myotis brandtii*, *Pipistrellus nathusii* und *Pipistrellus pipistrellus*) in Sachsen-Anhalt. - *Abh. Ber. Mus. Heineanum* **4**: 113-126.
- OHLENDORF, B. (1999): Bestandsentwicklung der Fledermäuse (Chiroptera). - In: FRANK, D. & NEUMANN, V. (Hrsg.): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
- OHLENDORF, B. (1999a): Monitoring Rauhhauffledermaus *Pipistrellus nathusii* in Sachsen-Anhalt. - *Nyctalus*, N. F. **7**: 196-202.
- OHLENDORF, B. (1999b): Contribution to the biology of the Brandt's bat *Myotis brandtii* in Sachsen-Anhalt, Germany. - Abstracts: VIIIth European Bat Research Symposium, 23.-27. 08.1999, Krakau.
- OHLENDORF, B. & OHLENDORF, L. (1996): Zur Erfassung und Bestandssituation der Fledermäuse in Sachsen-Anhalt. - *Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt)* **21**: 26-35.
- OHLENDORF, B. & OHLENDORF, L. (1998): Zur Wahl der Paarungsquartiere und Struktur der Harem beim Kleinen Abendsegler *Nyctalus leisleri* in Sachsen-Anhalt. - *Nyctalus*, N. F. **6**: 476-491.
- OHLENDORF, B.; BUSSE, P.; LEUTHOLD, E., HECHT, B., & LEUPOLD, D. (2000): Reproduktion des Abendseglers (*Nyctalus noctula*) in Sachsen-Anhalt. - *Nyctalus*, N. F. **7**: 279-286.
- OHST, J. (1993): Übersicht über die Heuschreckenfauna der Stadt Magdeburg. - *Mitt.bl. Entomol. Ver. Sachsen-Anhalt* **1**: 4-8.
- OLDENBERG, L. (1904): Die Gattung *Saucropus* LW. (Dipt.). - *Z. Hymenopterol. Dipterol.* **1904**: 65-81.
- ORTLIEB, R. (1978): Durch Spechte geringelte Bäume im Bezirk Halle. - *Apus* **4**, **2**: 81-83.
- ORTLIEB, R. (1993): Der Wanderfalke in Sachsen-Anhalt. - *Apus* **8**, **4**: 154-166.
- OTTO, G. (1990): Untersuchung der Insektenfauna eines ausgewählten Auewaldgebietes im Forstrevier Dessau-Nord. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **5**: 77-84.
- OTTO, G. & MLEINEK, A. (1997): Mulde (Aue) in Sachsen-Anhalt. Lebensraum Fluß - Hydrologie und Biologie der Mulde. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* **34**, **SH**: 25-32.
- OTTO, P. & KREISEL, H. (1996): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 13. Serie, ausgewählte Röhrlinge. - *Gleditschia* **24**: 115-150.
- OTTO, P. & KREISEL, H. (1997): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 14. Serie, ausgewählte Milchlinge. - *Gleditschia* **25**: 143-169.
- OTTO, P., KREISEL, H., & BENKERT, D. (1994): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 11. Serie, ausgewählte Giftpilze. - *Gleditschia* **22**: 339-364.
- PACHINGER, K. & HAFERKORN, J. (1991): Zur Produktivität der Auwälder an Donau und Elbe, dokumentiert durch die Kleinsäugerzönosen. - In: STUBBE, M., HEIDECHE, D. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Kleinsäugerarten. - *Wiss. Beitr. Univ. Halle* **1990/34 (P 42)**: 323-330.
- PACHINGER, K. & HAFERKORN, J. (1998): Comparisons of the small mammal communities in floodplain forests at the Danube and Elbe rivers. - *EKOLOGIA (Bratislava)* **17**: 11-19.
- PAEPKE, H. J. (1984): Zur aktuellen Verbreitung von *Eriocheir sinensis* (Crustacea, Decapoda, Grapsidae) in der DDR. - *Mitt. Zool. Mus. Berlin* **60**: 103-113.
- PAPE, A. (1952): Untersuchungen über die Erträge der Fischerei in der Mittelbe und die Auswirkungen ihres Ertragsniedergangs. - *Z. Fischerei Hilfswiss.*, N. F. **1**: 45-72.
- PAPROTH, R. (1992): Der Biber im Landkreis Havelberg *Castor fiber albicus* (Rodentia, Castoridae). - *Untere Havel: Naturkd. Ber.* **1**: 34-41.
- PAPROTH, R. (1993): Der Lebensraum des Elbebibers. - *Untere Havel: Naturkd. Ber.* **2**: 40-47.
- PAPROTH, R. (1995): Notzeit für Biber. - *Untere Havel: Na-*

- turkd. Ber. **4**: 64-67.
- PAPROTH, R. (1998): Notzeit für Biber / Teil II: Winterszeit. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 66-67.
- PARZYK, R. (1993): Wieder Fische in der schwarzen Elster. - Fischer und Teichwirt **44**: 208.
- PARZYK, R. (1995): Eine Fischerfamilie an der schwarzen Elster zwischen 1936 bis 1945. - Fischer und Teichwirt **46**: 86-87.
- PASSARGE, H. (1953): Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes. - Arch. Forstwesen **2**: 1-19.
- PASSARGE, H. (1953): Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes (1. Fortsetzung). - Arch. Forstwesen **2**: 182-208.
- PASSARGE, H. (1953): Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes (2. Fortsetzung) - Die Eschen-Feldulmenwälder. - Arch. Forstwesen **2**: 340-383.
- PASSARGE, H. (1953): Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes (3. Fortsetzung und Schluß). - Arch. Forstwesen **2**: 532-551.
- PASSARGE, H. (1956): Vegetationskundliche Untersuchungen an Wäldern und Gehölzen der Elbaue. - Arch. Forstwesen **5**: 339-358.
- PASSARGE, H. (1957): Vegetationskundliche Untersuchungen in der Wiesenlandschaft des nördlichen Havellandes. - Feddes Repertorium **BH**: 5-55.
- PASSARGE, H. (1960): Pflanzengesellschaften der Elbauwiesen der Elbe unterhalb Magdeburg. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg. **1**: 19-33.
- PASSARGE, H. (1964): Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. - Pflanzensoziologie Bd. **13**: Gustav Fischer Verlag, Jena.
- PASSARGE, H. (1965): Über einige interessante Stromtalgesellschaften der Elbe unterhalb von Magdeburg. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **1**: 83-93.
- PASSARGE, H. (1993): Lianenschleier-, fluviatile und ruderaler Staudengesellschaften in den Elb- und Oderauen. - Tuexenia **13**: 343-371.
- PASSARGE, H. & HOFMANN, G. (1964): Soziologische Artengruppen mitteleuropäischer Wälder. - Arch. Forstwesen **13**: 913-937.
- PÄSSLER, W. (1856): Die Brutvögel Anhalts. - J. Ornith. **4**: 34-68.
- PEDERSEN, A., STOHR, G. & WEBER, H. E. (1999): Die Brombeeren Sachsen-Anhalts (Gattung *Rubus* L. subgenus *Rubus*). - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **SH**.
- PENNING, A. (1952): Die Chinesische Wollhandkrabbe. - Neue Brehm-Bücherei. Akad. Verlagsges. Deest & Portig, Leipzig.
- PETERMEIER, A. & SCHÖLL, F. (1998): Das hyporheische Interstitial der Elbe bei Magdeburg - Untersuchungsmethoden, Fauna und Korngrößen. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1997, Frankfurt a. M.: 633-637.
- PETERMEIER, A., SCHÖLL, F. & TITTIZER, T. (1996): Die ökologische und biologische Entwicklung der deutschen Elbe. Ein Literaturbericht. - Lauterbornia **24**: 1-95.
- PETERSON, J. (1997): Zur Vegetation der Untersuchungsflächen des Projektes „Faunistische Erfassungen in ausgewählten Trockenrasen und Zwergstrauchheiden des Landes Sachsen-Anhalt“ im Elbe-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 71-75.
- PETZOLD, F. (1994a): Bemerkenswerte Libellenfunde in der Muldeniederung bei Dessau. - Libellula **13**: 33-46.
- PETZOLD, F. (1994b): Entwicklungsnachweis von *Aeshna affinis* Van der LINDEN in Sachsen-Anhalt (Anisoptera: Aeshnidae). - Libellula **13**: 73-79.
- PFLAUMBAUM, R. (1961): Aus dem Leben und der Arbeit der Arneburger Elbfischer. - Heimatmus. Arneburg/Elbe.
- PIECHOCKI, R. (1962): Die Todesursachen der Elbe-Biber und ihre Auswirkungen auf die Bestandserhaltung der Art. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **2**: 140-155.
- PIECHOCKI, R. (1963): Stirbt der Elbe-Biber aus? - Urania **26**: 859-862.
- PIECHOCKI, R. (1967): Analyse von Biberverlusten in den Jahren 1961 - 1966. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **4**: 17-27.
- PIECHOCKI, R. (1989a): Elbebiber *Castor fiber albicus* MATSCHIE. - In: STUBBE, H.: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin: 588-615.
- PIETSCH, W. (1986): Vegetationsverhältnisse im NSG „Möster Birken“. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **3**: 67-78.
- PLATE, F. (1930/33): Das Schutzgebiet Behr bei Steckby. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **3**: 43-44.
- PLATH, L. (1978): Zur Siedlungsdichte und Nistweise der Aaskrähe im nördlichen Elb-Havel-Winkel. - Apus **4**, **2**: 88-91.
- PLATH, L. (1979): Löffler (*Platalea leucorodia* L.) an der Mittelbe im Kreis Havelberg. - Beitr. Vogelkd. **25**: 124-128.
- PLATH, L. (1979): Überwinternde Weißstörche im Kreis Havelberg. - Apus **4**, **3**: 139.
- PLATH, L. (1979): Wasservogelzählung an der Mittelbe bei Havelberg 1978/79. - Apus **4**, **3**: 130-131.
- PLATH, L. (1981): Avifauna des nördlichen Elb-Havel-Winkels. Kormoran (*Phalacrocorax carbo*). - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **1**: 82.
- PLATH, L. (1982): Brutansiedlung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) an der Mittelbe. - Beitr. Vogelkd. **28**: 143-146.
- PLATH, L. (1986): Avifauna des nördlichen Elb-Havel-Winkels. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **6**: 83-93.
- PLATH, L. (1990): Mit Otto Koch im Bibergebiet bei Kamern. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **27**: 33-36.
- PLATH, L. (1992): Zum Brutbestand der Dohle am Havelberger Dom. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **1**: 31-32.
- PLATH, L. (1992): Zur Kleinsäugerfauna von Havelberg. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **1**: 33.
- PLETTNER, T. (1898): Verzeichnis von Fundorten einiger seltener oder weniger verbreiteter Gefäßpflanzen der Umgegend von Rathenow. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **40**: XL-LXVI.
- PORSCH, T. (1993): Das Jederitzer Holz - ein Beispiel heutiger Naturschutzpraxis. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **2**: 5-13.
- PUHLMANN, G. (1997): Mulde in Sachsen-Anhalt. Wasserbau und Hochwasserschutz an der unteren Mulde - Historie, Status Quo, Perspektiven. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **SH**: 38-46.
- PUHLMANN, G. & RAST, G. (1997): Mulde in Sachsen-Anhalt. Zum Feststoffgehalt der Mulde im Bereich Sachsen-Anhalt - Zustand, Perspektiven und Handlungsempfehlungen aus ökomorphologischer Sicht. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **SH**: 33-37.
- QUEDENFELDT, M. (1884): Einige seltenere Käferarten aus den Dessauischen Forsten an der Elbe und aus der Wittenberger Gegend. - Berliner Entomol. Z. **28**: 179-180.
- RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Band I. - Selbstverlag, Erfurt.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Band II. - Selbstverlag, Erfurt.
- RAPP, O. (1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Band III. - Selbstverlag, Erfurt.
- RAPP, O. (1943): Beiträge zur Fauna Thüringens. 7. Odonata, Plecoptera, Orthoptera. - Museum für Naturkunde, Erfurt.
- RAPP, O. (1945): Die Bienen Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. - Museum für Naturkunde, Erfurt.



- RAPP, O. (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie. Nachtrag 1. - Manuskript, Erfurt.
- RAUSCHERT, S. (1965): Das Federgras (*Stipa pennata* L.) in Mitteldeutschland. - *Landsch.pfl. Nat.schutz Thüringen* **2**: 9-16.
- RAUSCHERT, S. (1966): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). - 1. Floristische Neufunde, Bestätigungen und Veränderungen. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **15**: 737-750.
- RAUSCHERT, S. (1967): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). - 5. Zur Flora des Bezirkes Halle (2. Beitrag). - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **16**: 867-868.
- RAUSCHERT, S. (1972): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 14. Zur Flora des Bezirks Magdeburg. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **21**: 61-63.
- RAUSCHERT, S. (1972): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 15. Zur Flora des Bezirkes Halle (4. Beitrag). - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **21**: 63-65.
- RAUSCHERT, S. (1972): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 13. Reihe. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **21**: 7-63.
- RAUSCHERT, S. (1977): Zur Flora des Bezirkes Magdeburg. 3. Beitrag. - *Mitt. flor. Kart. Halle* **3**: 66-72.
- RAUSCHERT, S. (1990): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XV. Die xerothermen Gebüschgesellschaften (*Berberidion* Br.-Bl. 52 und *Prunion fruticosae* Tx. 52). - *Hercynia, N. F.* **27**: 195-258.
- RAUSCHERT, S. & MEUSEL, H. (1975): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XV). - 3. Zur Flora des Bezirkes Magdeburg (2. Beitrag) - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **24**: 92-93.
- RAUTENBERG, W. (1928): Pflanzendecke und landwirtschaftliche Bodennutzung eines Prignitzer Elbdorfs (Lennewitz). - In: *Prignitzer Volksbücher* 80, Verlag Tienken, Pritzwalk: 14-19.
- REDECKER, B. (1999): Stromtalgrünland an der unteren Mittelelbe - Phytozoosen, Bestandessituation, Naturschutz. - In: HÄRDLE, W. (Hrsg.): *Die Elbtalau - Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flußlandschaft*. - Festschrift aus Anlaß der Emeritierung von Prof. Dr. Ulf Amelung: 111-121.
- REGIUS, K. (1929/38): Die Weichtiere in der näheren Umgebung von Magdeburg. - *Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg* **6**: 63-81.
- REGIUS, K. (1929/38): Die Weichtiere in der näheren Umgebung von Magdeburg. 1. Nachtrag. - *Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg* **6**: 223-232.
- REGIUS, K. (1968): Die Pisidien-Vorkommen um Magdeburg. - *Malakol. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden* **2**: 159-168.
- REGIUS, K. (1969): Malakologische Miscellen (*Mollusca*). Die Elbe von Schönebeck bis Hohenwarthe aus malakologischer Sicht. - *Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg* **11**: 151-159.
- REHBERG, H. & SPERLING, E. (1927): Vogelfauna der Umgebung von Magdeburg. - *Ornith. Monatsschr.* **52**: 30-40, 63-68, 76-82, 98-102, 113-118.
- REICHENBACH, H. G. L. (1844): *Flora Saxonica*. - Dresden, Leipzig.
- REICHHOFF, L. (1974/75): Bericht über den Zustand der Wasser- und Sumpfvegetation im Sarensee - NSG „Sarenbruch“, Krs. Roßlau. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **11/12**: 105-111.
- REICHHOFF, L. (1978a): Die Wasser- und Röhrichtpflanzengesellschaften des Mittelbegebietes zwischen Wittenberg und Aken. - *Limnologia* **11**: 409-455.
- REICHHOFF, L. (1978b): Wasserpflanzen- und Röhrichtgesellschaften des Naturschutzgebietes „Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge“. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **BH**: 89-95.
- REICHHOFF, L. (1978c): Auenwälder und Röhrichte im Naturschutzgebiet „Elbe-Saale-Winkel“. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **1**: 29-42.
- REICHHOFF, L. (1987): Vegetationswandel in 2 Altwassern der mittleren Elbe infolge Eutrophierung. - *Limnologia* **18**: 177-182.
- REICHHOFF, L. (1991): Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Flora und Vegetation. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* **28, 1/2**: 36-45.
- REICHHOFF, L. (1992): Ergebnisse der biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. I. Methodik und landschaftliche Gliederung. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **7**: 7-18.
- REICHHOFF, L. (1992): Scharlachroter Gitterling in Dessau (Hausgarten Isarstr. 54). - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **7**: 66.
- REICHHOFF, L. & BÖHNERT, W. (1981): Das Naturschutzgebiet „Bucher Brack und Bölsdorfer Haken“ Teil 1: Floristische Notizen. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **18**: 43-47.
- REICHHOFF, L. & HAENSCHKE, W. (1985): Zur Geschichte und zum Bestand der Solitäreichen auf den Wiesen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - *Dessauer Kalender* **29**: 28-33.
- REICHHOFF, L. & HAENSCHKE, W. (1990): Zur Altersbestimmung von Solitäreichen der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **5**: 23-34.
- REICHHOFF, L. & HENTSCHEL, P. (1998): Schutz und Nutzung biologischer Ressourcen - dargestellt am Beispiel des Biosphärenreservats Mittlere Elbe. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* **35, 1**: 17-24.
- REICHHOFF, L. & HILBIG, W. (1974/75): Die Wasser- und Röhrichtvegetation im Naturschutzgebiet „Crassensee“ bei Seegrehna, Krs. Wittenberg. - *Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg.* **11/12**: 53-71.
- REICHHOFF, L. & HILBIG, W. (1981): Die Pflanzengesellschaften von Dessau und Umgebung - Vorläufige Übersicht. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **2**: 35-50.
- REICHHOFF, L. & REFIOR, K. (1997): Der Naturraum der unteren Mulde und seine Nutzung. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt*, **34, SH**: 3-11.
- REICHHOFF, L. & SCHNELLE, E. (1977): Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Löderitzer Forst“ I. Die Wassergesellschaften - Lemnetaea, Potamogetonetaea. - *Hercynia, N. F.* **14**: 422-436.
- REICHHOFF, L. & VALTEICH, P. (1997): Geschichte und Rekonstruktion des Kühnauer Parks. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **SH**: 99-113.
- REICHHOFF, L. & VOIGT, O. (1972): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 17. Wiederfund von *Najas minor* ALL. bei Dessau. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **21**: 72-73.
- REICHHOFF, L. & VOIGT, O. (1984): Die Violette Sitter (*Epipactis purpurata* SM.) im Mittelbegebiet. - *Mitt. AK „Heimische Orchideen“* **13**: 11-21.
- REICHHOFF, L. & WARTHEMANN, G. (1997): Flora und Vegetation des Kühnauer Sees. - *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **SH**: 43-63.
- REICHHOFF, L., HAENSCHKE, W., HEISE, U. & OTTO, G. (1987): Die Landschaft an Mittel- und unterer Elbe. - IV. Vegetation und Tierwelt der Elbtalniederung. - b.) Die Tierwelt. - *Dessauer Kalender* **31**: 47-58.
- REICHHOFF, L., RATHMANN, O. & ROCHLITZER, R. (1986): Gewässereutrophierung in Naturschutzgebieten - Ursachen, Folgen und Sanierungsmaßnahmen. - *Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg.* **23**: 15-26.
- REICHHOFF, L., WARTHEMANN, G. & BRÄUER, G. (1999): Bestand und Pflege des Auengründlands im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - *Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt* **36, 1**: 3-14.
- REIMERS, H. (1964): Beiträge zur Rostpilzflora der Mark Brandenburg und angrenzender Gebiete. - *Willdenowia* **3**: 583-639.

- REINHARDT, O. (1874): Die Binnenmollusken Magdeburgs. - Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg **6**: 19-34.
- REINHARDT, R. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiiidae II. Nemeobiidae - Nymphalidae sowie Lycaenidae und Hesperiiidae. - Entomol. Nachr. Ber. **26**.
- REINHARDT, R. & KAMES, P. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperiiidae I. - Entomol. Nachr. Ber. **BH 1**.
- RICHTER, H. (1849): Fortsetzung der um Dessau aufgefundenen Lepidopteren. - Microlepidoptera. - Entomol. Z. **10**: 349-351.
- RICHTER, H. (1849): Verzeichnis der in der Umgebung von Dessau aufgefundenen Schmetterlinge. - Entomol. Z. **10**: 80-86.
- RICHTER, H. (1849): Verzeichnis der in der Umgebung von Dessau aufgefundenen Schmetterlinge (Fortsetzung). - Entomol. Z. **10**: 107-113.
- RICHTER, H. (1850): Aufzählung der um Dessau gefangenen Microlepidopteren. - Entomol. Z. **11**: 24-28.
- ITTER, G. & MÜLLER, K. H. (1984): Bemerkenswerte holzwohnende Pilze bei Vockerode III. - Mykol. Mitt. **27**: 25-32.
- RÖBER, G. & SCHMIDT, D. (1998): Brutansiedlung des Fischadlers im Landkreis Bitterfeld. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **35**, **1**: 11-17.
- ROCHLITZER, R. (1960): Die Vögel der Lödderitz-Breitenhager Elbaue. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **11**: 3-18.
- ROCHLITZER, R. (1963): Zum gelegentlichen Massenaufreten des Graureihers an der Mittelelbe. - Der Falke **10**: 67.
- ROCHLITZER, R. (1966): Winterbeobachtungen des Seedlers - *Haliaeetus albicilla* (L.) - im Naturschutzgebiet Lödderitzer Forst. - Apus **1**, **1**: 15-17.
- ROCHLITZER, R. (1969): Der Schreiadler Brutvogel an der Mittelelbe. - Apus **1**, **6**: 277-281.
- ROCHLITZER, R. (1972): Zum gegenwärtigen Auftreten der Entenvögel und der Greifvögel im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst, Teilgebiet Lödderitzer Forst. - Hercynia, N. F. **9**: 279-301.
- ROCHLITZER, R. (1988): Erfolgreiche Kormoranbrut 1987 an der mittleren Mittelelbe. - Apus **7**, **1**: 1-3.
- ROCHLITZER, R. et al. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. - Naumann-Museum Köthen, Berlin.
- RÖDER VON, V. (1886a): Übersicht der in der Umgegend von Dessau durch Herrn G. Amelang gesammelten Dipteren. - Korr.bl. Entomol. Ver. Halle **1**: 11-12.
- RÖDER VON, V. (1886b): Nachtrag zu der Übersicht der in der Umgegend von Dessau gesammelten Dipteren. (Gesammelt von Herrn E. Engel - Dessau). - Korr.bl. Entomol. Ver. Halle **1**: 25-26.
- RÖHRICHT, W. (1996): Netzflügler und Schnabelfliegen aus Mitteleuropa. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **9**: 135-156 und 44 (Tafel).
- ROBDEUTSCHER, K. (1978): FG Pilzfreunde Mykologie (Arbeitsbericht 1978). - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **1**: 96-97.
- RÖBLER, A. (1995): Sommergoldhähnchenbrut im NSG Diebziger Busch? - Apus **9**, **2/3**: 137.
- RÖBLER, A. (2000): Ein Beitrag zur Laufkäferfauna der Kühnauer Heide im Regierungsbezirk Dessau.- Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **36**, **2**: 13-24.
- ROTHER, W. (1865): Flora von Barby und Zerbst. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **7**: 31-70.
- RUDOLF, G. & WEBER, E. (1978): Zum saprobiologischen Zustand der mittleren Elbe. - Acta hydrochem. hydrobiol. **4**: 557-564.
- RUTSCHKE, E. (1982): Die Feuchtgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung in der DDR. - Beitr. Vogelkd. **28**: 2-15.
- RUTSCHKE, E. & KALBE, L. (1978): Das Gewässergebiet Untere Havel - ein Wasservogelreservat von internationaler Bedeutung. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **18**: 1-18.
- RUTTER, S. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Zum Niedermoorgebiet „Mahlitzer Kultur“. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 53-55
- RYL, H. & SCHUBOTH, J. (1996): Suche alter Obstsorten im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, Erste Ergebnisse 1995. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **33**, **1**: 11-21.
- SACHER, P. (1983): Spinnen (Araneae) an und in Gebäuden - Versuch einer Analyse der synanthropen Spinnenfauna in der DDR, Teil II. - Entomol. Nachr. Ber. **27**: 141-152.
- SACHER, P. (1997): Zur Webspinnenfauna (Araneida). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 78-83.
- SACHER, P. & BLISS, P. (1989): Zum Vorkommen der Wespen spinne (*Argiope bruennichi*) im Bezirk Halle (Arachnida: Araneae). - Hercynia, N. F. **26**: 400-408.
- SCHÄDLER, M. (1998): Die Heuschreckenfauna des bewirtschafteten Auengrünlandes im Biosphärenreservat "Mittlere Elbe" (Orthoptera). - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **10**: 169-190.
- SCHARLINSKI, H. (1939): Nachtrag zum Katalog der WOLTERSTORFF-Sammlung im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte zu Magdeburg. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **7**: 31-57.
- SCHAUER, W. (1964): Die Entwicklung der Biberpopulation im Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **4**: 207-215.
- SCHAUER, W. (1966): Der Biber im Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg. **3**: 36-44.
- SCHAUER, W. (1970): Beitrag zur Entwicklung der Waldbestockungen im NSG Steckby-Lödderitzer Forst. - Arch. Forstwesen **19**: 525-541.
- SCHAUM, H. (1843): Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Salzkäfer. - Germar's Z. Entomol. **4**: 172-193.
- SCHIEMENZ, H. (1969): Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **2**: 241-258.
- SCHIEMENZ, H. (1981): Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) *Tettigonia viridissima* (L.) und *T. cantans* (FUES-SLY) in der DDR. - Zool. Jb. Syst. Ökol. **108**: 554-562.
- SCHIEMENZ, H. (1987): Beitrag zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta). Teil I: Allgemeines, Artenliste, Überfamilie Fulgoroidea. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **15**: 41-108.
- SCHIEMENZ, H. (1988): Beitrag zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta). Teil II: Überfamilie Cicadoidea excl. Typhlocybiniae et Deltocephalinae. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **16**: 37-93.
- SCHIEMENZ, H. (1990): Beitrag zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta). Teil III: Unterfamilie Typhlocybiniae. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **17**: 141-188.
- SCHIEMENZ, H. & GÜNTHER, R. (1994): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen DDR). - Natur & Text, Rangsdorf.
- SCHIEMENZ, H., EMMRICH, R. & WITSACK, W. (1996): Beitrag zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta). Teil IV: Unterfamilie Deltocephalinae. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **20**: 153-258.
- SCHILSKY, J. (1888): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreich: Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung. - Verlag Strecker & Schröder, Stuttgart.
- SCHUHR, C. (1791, 1796, 1803): Botanisches Handbuch 1-3. - Wittenberg.
- SCHUHR, C. (1801, 1803): Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht beschriebenen Arten von Riedgräsern. - Wittenberg.

- SCHUHR, C. (1806): Botanisches Handbuch 1-3. - Fleischer Verlag, Leipzig.
- SCHLOSSER, S. (1987): Abschluß der Erfassung der genetischen Pflanzenressourcen in den Naturschutzgebieten der DDR. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **24**: I-VI.
- SCHLOSSER, S., HILBIG, W., SEELIG, K.-J. et al. (1989): Die Zustandserfassung der Naturschutzgebiete der Bezirke Halle und Magdeburg. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **26**: 25-32
- SCHMIDT, A. (1998): Zur Verbreitungsgeschichte der Gartenspitzmaus *Crocidura suaveolens* in Ostdeutschland. - Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg **7**: 49-52.
- SCHMIDT, L. (1977): Die Wasser- und Verlandungsvegetation der Naturschutzgebiete „Cöselitzer Teich“, „Neolith-Teich“ und der „Gerlebogker Teiche“ im Köthener Ackerland. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **14**: 47-69.
- SCHMIDT, P. (2000): Lepidoptera (Schmetterlinge). Zur Bestandssituation wirbelloser Arten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt, **SH**: 31-43.
- SCHMIDT, R. (1994): Schwarzkehlchen im Mittelbegebiet. - Apus **8**, **6**: 271-273.
- SCHNEEWEISS, N. (1995): Die Amphibien und Reptilien der Havel. - In: Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.): Die Havel. - Studien und Tagungsberichte **8**: 73-76.
- SCHNEIDER, D. (1874): Wanderungen im Magdeburger Florenggebiet im Jahre 1873. - Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg **6**: 1-18.
- SCHNEIDER, G. (1928): Seltene Röhrlinge in der Umgebung von Dessau. - Z. Pilzkd. **10**: 160.
- SCHNEIDER, K. (1982): Ökologische Untersuchungen an Rüsselkäfern (Col., Curculionidae) in anthropogen belasteten Kiefernforsten der Dübener Heide. - Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle.
- SCHNEIDER, K. (1997): Zur Rüsselkäferfauna (Coleoptera, Curculionidae) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel: Naturkd. Ber. **6/7**: 120-127.
- SCHNEIDER, K., SCHOLZE, P., BEHNE, L., JUNG, M. & HUTH, M. (1995): Rote Liste der Rüsselkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **18**: 13-23.
- SCHNEIDER, L. (1868): Wanderungen im Magdeburger Floren-Gebiet in den Jahren 1866 und 1867. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **10**: 39-61, 71-100.
- SCHNEIDER, L. (1869): Wanderungen im Magdeburger Floren-Gebiet in den Jahren 1866 und 1867 (Schluß). - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **11**: 1-66.
- SCHNEIDER, L. (1873): Wanderungen durch die Florenggebiete Zerbst, Möckern, Burg, Burgstall, Calvörde, Wolmirstedt, Barby und Bernburg während des Sommers 1872. - Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg **4**: 3-12.
- SCHNEIDER, L. (1874): Flora von Magdeburg mit Einschluß der Florenggebiete von Bernburg und Zerbst, nebst einem Abriss der allgemeinen Botanik als einleitenden Theil. - Grundzüge der allgemeinen Botanik nebst einer Übersicht der wichtigsten Pflanzenfamilien. - Verlag Julius Springer, Berlin.
- SCHNEIDER, L. (1877): Flora von Magdeburg mit Einschluß der Florenggebiete von Bernburg und Zerbst, nebst einem Abriss der allgemeinen Botanik als einleitenden Theil. - Beschreibung der Gefäßpflanzen des Florenggebietes von Magdeburg, Bernburg und Zerbst mit einer Übersicht der Boden- und Vegetationsverhältnisse. - Verlag Julius Springer, Berlin.
- SCHNEIDER, L. (1891): Beschreibung der Gefäßpflanzen des Florenggebietes von Magdeburg, Bernburg und Zerbst. Mit einer Übersicht der Boden- und Vegetationsverhältnisse. - Commissionsverlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
- SCHNELLE, E. (1979): Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“. - II. Die Röhricht- und Großseggenesellschaften (Phragmitetea). - Hercynia, N. F. **16**: 141-150.
- SCHNELLE, E. (1981): Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“. - III. 1. Die Auennälder - Salici-Populetum und Fraxino-Ulmetum. - Hercynia, N. F. **18**: 387-398.
- SCHNELLE, W. (1992): Verzeichnis der wildwachsenden Gefäßpflanzen von Zerbst und Umgebung. - Zerbst.
- SCHNITZER, P. & TROST, M. (1997): Zum Projekt „Faunistische Erfassungen in ausgewählten Trockenrasen und Zwergstrauchheiden des Landes Sachsen-Anhalt“. - Untere Havel : Naturkd. Berichte **6/7**: 64-69.
- SCHNITZER, P., BERBIG, A., GOHR, F., HEINZE, B., HÜTTICHE, K. & MÜLLER, J. (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Wirbellose. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **SH**: 34-41.
- SCHÖLL, F. (1994): Die aquatischen Lebensgemeinschaft der Elbe - einst und jetzt. - In: GUHR, H. et al. (Hrsg.): 6. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Die Elbe im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie“: 290-300.
- SCHÖLL, F. (1998): Bemerkenswerte Makrozoobenthosfunde in der Elbe: Erstnachweis von *Corbicula fluminea* (O.F. MÜLLER 1774) bei Krümmel sowie Massenvorkommen von *Oligoneuriella rhenana* (IMHOFF 1852) in der Oberelbe. - Lauterbornia **33**: 23-24.
- SCHÖLL, F. & BALZER, I. (1998): Das Makrozoobenthos der deutschen Elbe 1992-1997. - Lauterbornia **32**: 113-129.
- SCHÖLL, F. & FUKSA, J. (2000): Das Makrozoobenthos der Elbe vom Riesengebirge bis Cuxhaven. - Koblenz, Prag.
- SCHÖLL, F. & HARDT, D. (2000): *Jaera istri* (VEUILLE) (Janiridae, Isopoda) erreicht Elbe. - Lauterbornia **38**: 99.
- SCHÖLL, F., HARDT, D. & EHMANN, H. (1997): Wiederfund von *Oligoneuriella rhenana* in der Elbe. - Lauterbornia **28**: 93-95.
- SCHÖLL, F., TITZNER, T. & BEHRING, E. (1993): Faunistische Bestandsaufnahme an der Elbsohle zur ökologischen Zustandsbeschreibung der Elbe und Konzeption von Sanierungsmaßnahmen. Zwischenbericht zum F+E Vorhaben (BfG-0793). - Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz.
- SCHÖLL, F., TITZNER, T., BEHRING, E. & WANITSCHHECK, M. (1995): Faunistische Bestandsaufnahme an der Elbsohle zur ökologischen Zustandsbeschreibung der Elbe und Konzeption von Sanierungsmaßnahmen. Endbericht zum F+E Vorhaben (BfG-0880). - Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, (UBA Texte 64/95. - Berlin).
- SCHOLLER, F. A. (1775): Flora Barbiensis. - Verlag Weidmann & Reich, Leipzig.
- SCHOLLER, M. (1994): *Puccinia lagenophorae* in Deutschland: Anmerkungen zur Einwanderung, Verbreitung und Ökologie. - Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **127**: 177-189.
- SCHOLLER, M. (1997): Rust Fungi on *Bellis perennis* in Centrale Europe: Delimitation and distribution. - Sydowia **49**: 174-181.
- SCHOLTEN, M. (1998): Saisonale Nutzung von Bühnenfeldern der mittleren Elbe durch die 0 + Fischgemeinschaft. - In: GELLER, W. et al. (Hrsg.): 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe“: 243-244.
- SCHOLZ, H. (1995): *Eragrostis albensis* (Graminae), das Elb-Liebesgras - ein neuer Neo-Endemit Mitteleuropas. - Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **128**: 73-82.
- SCHOLZ, H. & SCHOLZ, J. (1988): Die Brandpilze Deutschlands (Ustilaginales). - Englera **8**: 1-691.
- SCHOLZ, P. (1993a): Kartierung epiphytischer Flechten. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt **8**: 28-29.
- SCHOLZ, P. (1993b): Kartierung epiphytischer Flechten und Luftgüte in Sachsen-Anhalt. - In: SCHOLZ, P. (Hrsg.): Flechtenmonitoring - ein kommunales Kontrollinstrument. - Tagungber. der Tagung des Unabhängigen Institutes für Umweltfragen 27.-28.03.1993, Halle: 119-128.



- SCHOLZ, P. (1995): New or interesting records of lichens and lichenicolous fungi from Germany. - *Bibl. Lichenol.* **57**: 387-394.
- SCHOLZE, P. (1997): Zur Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphylinidae) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - *Untere Havel* : Naturkd. Ber. **6/7**: 111-119.
- SCHÖNFELD, M. (1977): Brutvorkommen des Schlagschwirls im Kreis Wittenberg. - *Apus* **4**, **1**: 14-15.
- SCHÖNFELD, M. (1978): Zum Brutvorkommen der Weidenmeise im Mittelbegebiet. - *Apus* **4**, **2**: 85-88.
- SCHÖNFELD, M. (1992): Zur Situation des Sprossers im mittleren und südlichen Sachsen-Anhalt. - *Apus* **8**, **1**: 20-21.
- SCHÖNFELD, M., ZUPPKE, U. & BECHER, H. (1985): Die Vögel des Kreises Wittenberg - eine kommentierte Artenliste. - *Apus* **6**, **2**: 49-65.
- SCHÖNFELD, M. & ZUPPKE, U. (1980): Ausbreitung und Vorkommen der Beutelmeise im Wittenberger Gebiet. - *Apus* **4**, **4**: 176-186.
- SCHÖNFELD, M. & ZUPPKE, U. (1985): Die Saatkrähe im Kreis Wittenberg. - *Apus* **6**, **2**: 95-96.
- SCHÖNFELD, M., ZUPPKE, U. & REHN, H. (1997): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. - *Apus* **9**, **7**: 301-344.
- SCHÖNFELDER, I. (1994): Diatomeenanalyse in der Havelaue zur Rekonstruktion der Entwicklung des mittleren pH-Wertes eines Flachlandflusses. - *Dt. Ges. Limnologie, Erw. Zus. Jahrestagung 1994, Hamburg*: 709-712.
- SCHÖNFELDER, I. (1995a): Diatomeenanalyse in der Havelaue zur Rekonstruktion der nacheiszeitlichen Entwicklung abiotischer Faktoren in der Havel. - *Untere Havel* : Naturkd. Ber. **4**: 68-73.
- SCHÖNFELDER, I. (1995b): Die Diatomeenflora der Havel und ihre Veränderung im Zuge der Eutrophierung. - *Dt. Ges. Limnologie, Abstracts. Jahrestagung 1995, Berlin*.
- SCHÖNFELDER, I. (1997): Eine Phosphor-Diatomeen-Relation für alkalische Seen und Flüsse Brandenburgs und ihre Anwendung für die paläolimnologische Analyse von Auensedimenten der unteren Havel. - *Dissertationes Botanicae* **283**.
- SCHORLER, B. (1900): Das Plankton der Elbe bei Dresden. - *Z. Gewässerkd.* **3**: 1-27.
- SCHRAMM, O. C. (1857): Flora von Brandenburg und Umgegend, mit besonderer Berücksichtigung der Nachbarstädte Belzig, Genthin, Nauen, Rathenow und Werder. - *Brandenburg*.
- SCHROEDER, H. (1939): Die Algenflora der Mulde. Ein Beitrag zur Biologie saprober Flüsse. - *Pflanzenforsch.* **21**: 1-88.
- SCHUBERT, P. (1977): Beobachtungen der Doppelschnepfe in den Kreisen Roßlau und Zerbst. - *Apus* **4**, **1**: 41-42.
- SCHUBERT, P. (1982): Sperber-Beobachtungen im Kreis Roßlau, der angrenzenden Elbaue und im NE-Teil des Kreises Zerbst. - *Apus* **5**, **1**: 26-32.
- SCHUBERT, P. (1983): Bemerkenswerte Beobachtungen zum Zug des Wespenbussards, *Pernis apivorus*, an der Mittelbe. - *Beitr. Vogelkd.* **29**: 314-316.
- SCHUBERT, P. (1983): Weißbartseeschwalben in der Kliekener Elbaue. - *Apus* **5**, **2**: 96-97.
- SCHUBERT, P. (1983): Zum Vorkommen von Ohrenlerche und Schneeammer im Kreis Roßlau. - *Apus* **5**, **2**: 90-94.
- SCHUBERT, P. (1988): Eine Steppenweihe in der Kliekener Elbaue. - *Apus* **7**, **1**: 36.
- SCHUBERT, P., SCHWARZE, E. & BIRKE, P. (1983): Zwei neue Wassertreter-Feststellungen im mittleren Mittelbegebiet. - *Apus* **5**, **2**: 95-96.
- SCHUBERT, R. (1960): Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. - *Pflanzensoziologie Bd. 11*: Gustav Fischer Verlag, Jena.
- SCHUBERT, R. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. III. Wälder Teil 1. - *Hercynia, N. F.* **9**: 1-34.
- SCHUBERT, R. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. III. Wälder Teil 2. - *Hercynia, N. F.* **9**: 106-136.
- SCHUBERT, R. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. III. Wälder Teil 3. - *Hercynia, N. F.* **9**: 197-228.
- SCHUBERT, R. (1973): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. VI. Azidiphile Zwergstrauchheiden. - *Hercynia, N. F.* **10**: 101-110.
- SCHUBERT, R. (1974): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. VIII. Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen. - *Hercynia, N. F.* **11**: 22-46.
- SCHUBERT, R. (1974): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. X. Silbergrasreiche Pionierfluren auf nährstoffarmen Sand- und Grusböden. - *Hercynia, N. F.* **11**: 291-298.
- SCHUBERT, R. (1977): Ausgewählte pflanzliche Bioindikatoren zur Erfassung ökologischer Veränderungen in terrestrischen Ökosystemen durch anthropogene Beeinflussung unter besonderer Berücksichtigung industrieller Ballungsgebiete. - *Hercynia, N. F.* **14**: 399-412.
- SCHUBERT, R. & HILBIG, W. (1969): Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 12. Reihe. - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **18**: 163-210.
- SCHUBERT, R. & RAUSCHERT, S. (1967): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). - *Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R.* **16**: 852-861.
- SCHULZ, H. (1961): Qualitative und quantitative Planktonuntersuchungen im Elbe-Aestuar. - *Arch. Hydrobiol. Suppl. (Untersuchung Elbe-Aestuar 1)* **26**: 5-105.
- SCHULZE, E. (1890a): Verzeichnis der Säugetiere von Sachsen-Anhalt, Braunschweig, Hannover und Thüringen. - *Z. Naturwiss. Halle* **63**: 97-112.
- SCHULZE, E. (1890b): Fauna Hercynicae Mammalia. - *Schr. Naturwiss. Ver. Harz* **5**: 21-35.
- SCHULZE, E. (1904): Fauna Hercynicae. Batrachia. - *Z. Naturwiss.* **77**: 199-230.
- SCHULZE, E. (1907): J. C. Beckman's Flora von Anhalt (1710) - *Z. Naturwiss. Halle* **78**: 323-352.
- SCHULZE, E. & BORCHERDING, F. (1893): Amphibia et Reptilia. Verzeichnis der Lurche und Kriechtiere des nordwestlichen Deutschlands. - In: *Fauna Saxonia*. - Fischer Verlag, Jena.
- SCHUMACHER, H. (1998): Das ganze Land ein Garten. - *Strauss, Potsdam*.
- SCHUSCHKE, G., MIELKE, U. & SCHULZE, H.-D. (1974): Rindensiedende Flechten als lufthygienischer Bioindikator in Magdeburg. - *Z. ges. Hygiene Grenzgebiete* **20**: 415-421.
- SCHÜZ, E. (1952): Zur Methode der Storchforschung. - *Beitr. Vogelkd.* **2**: 287-298.
- SCHWABE, S. H. (1838): Flora Anhaltina. Tomus I. - *Berolini, Apud Ge. Reimerum, Dessau*.
- SCHWABE, S. H. (1839): Flora Anhaltina. Tomus II. - *Berolini, Apud Ge. Reimerum, Dessau*.
- SCHWABE, S. H. (1865): Flora von Anhalt. 2. (deutsche) Ausgabe. - *Dessau*.
- SCHWARZBERG, H. (1960): Beutelmeisen im Brutrevier an der Mittelbe. - *Der Falke* **7**: 58-61.
- SCHWARZBERG, H. & KREIBIG, C. (1958): Weiterer Brutnachweis der Beutelmeise. - *Der Falke* **5**: 170-172.
- SCHWARZE, E. (1968): Schelladler und Eisente bei Roßlau. - *Apus* **1**, **4**: 196-197.
- SCHWARZE, E. (1971): Ornithologische Besonderheiten vom Unterluch bei Roßlau. - *Apus* **2**, **4**: 189-191.
- SCHWARZE, E. (1974): Das Vorkommen des Kranichs im mittleren Mittelbegebiet. - *Apus* **3**, **2/3**: 73-90.
- SCHWARZE, E. (1975): Der Durchzug des Kiebitzregenpfeifers, *Pluvialis squatarola* (L.), im mittleren Mittelbegebiet.

- Beitr. Vogelkd. **21**: 120-126.
- SCHWARZE, E. (1975): Doppelschnepfe, *Gallinago media* (LATH.), im Mittelbegebiet. - Beitr. Vogelkd. **21**: 155-156.
- SCHWARZE, E. (1977): Liste über alle bisher im Bereich des NSG Sarenbruch im Raume der vorgeschlagenen Grenzen sowie in der gesamten Kliekener Elbaue beobachteten Vogelarten. - Roßlau.
- SCHWARZE, E. (1978): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kr. Roßlau, Bez. Halle). - 1. Teil: Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **1**: 43-62.
- SCHWARZE, E. (1980): Einige Nachweise südlich verbreiteter Vogelarten in den Kreisen Roßlau und Dessau. - Apus **4**, **4**: 171-175.
- SCHWARZE, E. (1980): Ergebnisse der Wasservogelzählungen der Saison 1978/79 im Bezirk Halle. - Apus **4**, **4**: 162-166.
- SCHWARZE, E. (1981): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kr. Roßlau, Bez. Halle). - 2. Teil: Falconiformes, Galliformes, Gruiformes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **2**: 77-82.
- SCHWARZE, E. (1985): Die Elbe im Bezirk Halle - ein bemerkenswertes Winteraufenthaltsgebiet für Wasservögel. - Beitr. Vogelkd. **31**: 73-80.
- SCHWARZE, E. (1986): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kr. Roßlau, Bez. Halle). - 3. Teil: Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **3**: 23-33.
- SCHWARZE, E. (1987): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kr. Roßlau, Bez. Halle). - 4. Teil (Schluß). - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **4**: 63-73.
- SCHWARZE, E. (1988): Mornellregenpfeifer an der Mittelbe. - Apus **7**, **1**: 36-37.
- SCHWARZE, E. (1988): Stelzenläufer im NSG Sarenbruch. - Apus **7**, **1**: 39-40.
- SCHWARZE, E. (1989): Zur Entwicklung des Naturschutzes im Kreis Roßlau. - Heimatkalender Kr. Roßlau **29**: 11-17.
- SCHWARZE, E. (1990): Erneut Steinadler im Raum Dessau/Roßlau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 88.
- SCHWARZE, E. (1990): Schwarzkopfmöwe auch Gast im Kreis Roßlau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 64.
- SCHWARZE, E. (1994): Zum Brutvorkommen des Graureihers in Sachsen-Anhalt. - Apus **8**, **6**: 249-256.
- SCHWARZE, E. (1995): Kleinralle an der Alten Elbe bei Klieken. - Apus **9**, **1**: 60-61.
- SCHWARZE, E. (1995): Zur Entwicklung des Winterbestandes der Wasservögel an der Mittelbe in Sachsen-Anhalt. - Apus **9**, **1**: 38-59.
- SCHWARZE, E. (1996): Der Brutbestand des Graureihers 1993 in Sachsen-Anhalt. - Apus **9**, **5**: 197-199.
- SCHWARZE, E. (1996): Zur Überwinterung des Singschwans *Cygnus cygnus* an der mittleren Mittelbe. - Apus **9**, **4**: 149-153.
- SCHWARZE, E. (1998): Überwinterungsbeobachtungen von Schwänen *Cygnus* 1995/96 an der mittleren Mittelbe im Vergleich zu 1994/95. - Apus **10**, **1**: 1-8.
- SCHWARZE, E. (1999): Zum Vorkommen des Zwergschwans im Desauer Gebiet. - Apus **10**, **3/4**: 198-200.
- SCHWARZE, E. & HAMPE, H. (1985): Das Auftreten des Kormorans im mittleren Mittelbegebiet. - Apus **6**, **2**: 65-72.
- SCHWARZE, E. & PUHLMANN, G. (1994): Gänsenotizen aus der Roßlauer Umgebung. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **8**: 95-99.
- SCHWIER, C. & SCHWIER, H. J. (1967): Erfassung einiger Käferfamilien des Lödderitzer Forstes und Berücksichtigung des jahreszeitlichen Aspektes und bevorzugten Aufenthaltsorte. - Staatsexam.arb., Pädagogisches Institut Köthen.
- SCHWIER, H.-J. (1979): Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bezirk Halle. 2. Mitteilung: Buntkäfer (Cleridae). - Entomol. Nachr. **23**: 55-59.
- SCHWING, W. (1955): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Deutschland (II). - Beiträge zur Flora von Magdeburg. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **4**: 755-770.
- SEEGER, J. J. (1974): Untersuchungen zum Brutbestand von Limicolen im Bereich der unteren Havel. - Beitr. Vogelkd. **20**: 421-426.
- SEELIG, K.-J. (1972): Zur Verbreitung und Ökologie der Sumpfohreule (*Asio flammeus* (PONTH.)) im Mittelbegebiet. - Naturkd. Jahresber. Mus. Heineanum **7**: 109-116.
- SEELIG, K.-J. (1979): Brutvögel und bemerkenswerte Durchzügler im Mittelbe-Börde-Gebiet in den Jahren 1973 bis 1975. - Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **12**: 52-77.
- SEELIG, K.-J. (1986): Graureiher im Bezirk Magdeburg. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **23**: 15-20.
- SEELIG, K.-J., SIMON, B. & ZUPPKE, U. (1997): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen im NSG „Untere Schwarze Elster“. Teil II: Fauna. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **2**: 3-12.
- SEIDEL, E., DORNBUSCH, M. & REICHHOFF, L. (1988): Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - Berlin.
- SEIDEWITZ, H. D. (1990): Pilze im Kreisgebiet Bitterfeld. - Beitr. Heimatkd. Stadt Kreis Bitterfeld **12**: 3-6.
- SEIFERT, G. (1986): Erneuter Brutversuch eines Austernfischers an der Mittelbe bei Wittenberg. - Apus **6**, **3**: 142-143.
- SELK, H. (1908): Beiträge zur Kenntnis der Algenflora der Elbe und ihres Gebietes. - Mitt. Bot. Staatsinst. Hamburg **25**: 1-119.
- SELLIN, D. (1973): Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. - Apus **3**, **1**: 34-36.
- SELLIN, D. (1995): Silberreiher im NSG Alte Elbe Klieken. - Apus **9**, **2/3**: 131-132.
- SELLIN, D. & BEICHE, S. (1980): Die Vögel des Diebziger Forstes. - In: Festschrift zum 200. Geburtstag von Johann Friedrich Naumann (14.2.1780 - 15.8.1857). - Naumann Museum Köthen, Berlin: 38-67.
- SIMON, B. (1986): Ökologische Untersuchungen an Landschaftselementen und Brutvögeln im NSG „Riß“ (Kr. Jessen/E.). Teil 1. - Hercynia, N. F. **23**: 325-345.
- SIMON, B. (1987): Ökologische Untersuchungen an Landschaftselementen und Brutvögeln im NSG „Riß“ (Kr. Jessen/E.). Teil 2. - Hercynia, N. F. **24**: 78-94.
- SIMON, M. (1994): Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Elbe. - In: GUHR, H. et al. (Hrsg.): 6. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Die Elbe im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie“: 290-300.
- SKALE, A. (1999): Neunachweise von *Rhantus latitans* SHP. und *Helophorus paraminutus* ANGUS in Sachsen-Anhalt. - Info.bl. AG Wasserkäfer **2**: 7.
- SPECHT, D. (1993): Exkursion durch die „Kreuzhorst“. - In: Umweltamt Landeshauptstadt Magdeburg (Hrsg.): 1. Landeshaupttag 1993 - Die Elbaue: 81-84.
- SPIEB, H.-J. (1995): Ergebnisse ichthyofaunistischer Untersuchungen im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **32**, **2**: 19-28.
- SPIEB, H.-J., JÄHRLING, K.-H. & RASCHEWSKI, U. (1994): Fauna der Rundmäuler und Fische in der Elbe im Land Sachsen-Anhalt: Verbreitung, Gefährdung und Schutz. - Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.). - Magdeburg.
- SPITTKA, B., HENTSCHEL, P., REICHHOFF, L., PIEPER, K. & MILDE, W. (1997): Planung und Durchführung der Sanierung des Kühnauer Sees. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **SH**: 121-134.
- SPITZENBERG, D. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg. 2. Aquatile Coleopteren der Naturschutzgebiete Jeggauer Moor, Jävenitzer Moor und Mahlpfuhler Fenn. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **XII**: 59-66.

- SPITZENBERG, D. (1987): Die aquatilen Coleopteren des Naturschutzgebietes „Schollener See“. - Abh. Ber. Mus. Naturkd. Vorgesch. Naturwiss. Ver. Magdeburg **XIII**: 77-84.
- SPITZENBERG, D. (1988): Bemerkenswerte Wasserkäferfunde (Col., Palpicornia) aus dem Bezirk Magdeburg. - Entomol. Nachr. Ber. **32**: 207-210.
- SPITZENBERG, D. (1993): Rote Liste der wasserbewohnenden Käfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **9**: 35-39.
- SPITZENBERGER, F. (1990): *Neomys fodians* (PENNANT, 1771) - Wasserspitzmaus. - In: NIETHAMMER, J. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Insectivora, Primates. Band 3/I. - AULA-Verlag, Wiesbaden.
- SPRICK, P. (1998): Nachweise zur Flora Sachsen-Anhalts entlang der Schnellbahnstrecke Hannover - Berlin zwischen Drömling und Schönhauser Heide. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **3**: 159-173.
- STANGL, J. (1970): Das Pilzwachstum in alluvialen Schotterebenen und seine Abhängigkeit von Vegetationsgesellschaften. - Z. f. Pilzkd. **36**: 209-256.
- STARITZ, R. (1904): Beiträge zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. 1. Teil. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **45**: 59-96.
- STARITZ, R. (1914): Beiträge zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. 2. Teil. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **55**: 55-86.
- STARITZ, R. (1918): Beiträge zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. 3. Teil. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **59**: 62-111.
- STARITZ, R. (1918): Liste des STARITZ-Pilzherbars in Naturkundemuseum Dessau. - Naturkundemuseum, Dessau.
- STARK, A. (1999): Liste der Langbeinfliegen. - In: FRANK, D. & NEUMANN, V. (Hrsg.): Bestandessituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
- STARK, A. & LEHMANN, S. (1999): Die Elbtalaue bei Pevestorf (Landkreis Lüchow-Dannenberg) als Lebensraum faunistisch bemerkenswerter Dipterenarten aus der Überfamilie Empidoidea (Insecta, Diptera). - In: HÄRDLE, W. (Hrsg.): Die Elbtalaue - Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flusslandschaft. - Festschrift aus Anlaß der Emeritierung von Prof. Dr. Ulf Amelung: 97-109.
- STAU (Staatliches Amt für Umweltschutz) Magdeburg (Hrsg.) (1995): Gewässergütebericht Sachsen-Anhalt 1995. - Magdeburg.
- STEGELICH, R. (1996a): Die Gestreifte Zartschrecke *Leptophyes albovittata* (Ins., Saltatoria) im Elbtal Sachsen-Anhalts und im Landkreis Meißen (Sachsen). - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **4**: 10-14.
- STEGELICH, R. & MÜLLER, J. (1999): Zur Verbreitung der Säbeldornschrecke *Tetrix subulata* (Caelifera) im mittleren und nördlichen Teil Sachsen-Anhalts. - Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt **7**: 13-15.
- STEIN, H. (1985): Zur Siedlungsdichte des Sumpfrohrsängers im Bezirk Magdeburg und Anmerkungen zum Heimzug. - Apus **6**, **1**: 26-34.
- STEINBACHER, G. (1936): Zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. - Märkische Tierwelt **1**: 219-220.
- STEINKE, G. (1971): Mittelsäger, *Mergus serrator*, südlich von Tangermünde/Elbe. - Beitr. Vogelkd. **17**: 384.
- STEINKE, G. (1971): Pfuhlschnepfen während des Herbstzuges 1970 in der Elbaue bei Tangermünde. - Apus **2**, **4**: 192-193.
- STEINKE, G. (1971): Schmarotzerraubmöwen in der Elbaue bei Tangermünde. - Apus **2**, **4**: 196.
- STEINKE, G. (1974): Beobachtungen an einem westelbischen Kranichbrutpaar bei Tangerhütte/Altmark. - Beitr. Vogelkd. **20**: 441-443.
- STEINKE, G. (1978): Die Vögel des NSG „Bucher Brack“, Kreis Genthin. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **15 BH**: 98-100.
- STEINKE, G. (1981): Zum Vorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) im Steckby-Lödderitzer Forst mit Bemerkungen zu Fortpflanzung und Beringung. - Ornith. Jahresber. Mus. Heineanum **5/6**: 37-48.
- STEINKE, G. & HEINDORFF, K. (1982): Die Vögel des Kreises Tangerhütte. - Ornith. Jahresber. Mus. Heineanum **7**: 1-105.
- STÖCKEL, G. (1983): Zur derzeitigen Verbreitung von *Sympetrum pedemontanum* ALLIONI (Odonata) in der DDR. - Entomol. Nachr. Ber. **27**: 261-266.
- STOHR, G. (1998): Bestimmungsschlüssel für Rubus-Arten im Gebiet von Halle und der weiteren Umgebung. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **3**: 3-26.
- STRICKER, W. (1961): Die Vegetation der Elbtaldünen und -sandflächen des Bezirkes Cottbus. - Märkische Heimat: Heimatkd. Z. Bez. Cottbus Frankfurt Potsdam **5**: 254-259.
- STUBBE, H. (1989): Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin.
- STUBBE, M. (1978): Der Fischotter *Lutra lutra* (L., 1758) in den mittleren Bezirken der DDR (Ergebnisse der „Aktion Fischotter 1972“, Nr. 8). - Hercynia, N. F. **15**: 77-105.
- STUBBE, M. (1986): Arten- und Biotopschutz des Fischotters in der DDR. - Unsere Jagd **36**: 236-237.
- STUBBE, M. (1987): Die aktuelle Verbreitung des Marderhundes in der DDR. - Unsere Jagd **37**: 142-143.
- STUBBE, M. (1989b): Verbreitung und Ökologie des Fischotters *Lutra lutra* (L., 1758). - In: Populationsökologie marderartiger Säugetiere. - Wiss. Beitr. Univ. Halle **1989/37 (P39)**: 13-33.
- STUBBE, M. (1989c): Marderhund *Nyctereutes procyonoides* (GRAY). - In: STUBBE, H.: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin: 401-416.
- STUBBE, M. (1989d): Amerikanischer Nerz *Mustela vison* (SCHREBER). - In: STUBBE, H.: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin: 541-549.
- STUBBE, M. (1989e): Fischotter *Lutra lutra* (L.). - In: STUBBE, H.: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin: 550-575.
- STUBBE, M. (1989f): Nutria *Myocastor coypus* (MOLINA). - In: STUBBE, H.: Buch der Hege. Band 1: Haarwild. - Berlin: 630-639.
- STUBBE, M. (1993a): *Procyon lotor* (LINNÉ, 1758) - Waschbär. - In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger - Carnivora (Fissipedia). Band 5/I. - AULA-Verlag, Wiesbaden: 331-364.
- STUBBE, M. (1993b): *Mustela lutreola* (LINNÉ, 1761) - Europäischer Nerz. - In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger - Carnivora (Fissipedia). Band 5/II. - AULA-Verlag, Wiesbaden: 627-653.
- STUBBE, M. (1993c): *Mustela vison* (SCHREBER, 1777) - Mink, Amerikanischer Nerz. - In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger - Carnivora (Fissipedia). Band 5/II. - AULA-Verlag, Wiesbaden: 654-698.
- STUBBE, M. (1994): Kartierung der Säugetiervorkommen in den östlichen Bundesländern Deutschlands. - Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 71.
- STUBBE, M. & KRAPP, F. (1982): *Myocastor coypus* (MOLINA, 1782) - Nutria. - In: NIETHAMMER, J. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Rodentia II. Band 2/I. - AULA-Verlag, Wiesbaden.
- STUBBE, M. & STUBBE, A. (1994): Säugetierarten und deren feldökologische Forschung im östlichen Deutschland. - Tiere im Konflikt **3**: 1-52.
- STUBBE, M. & STUBBE, A. (1995): Säugetierarten und deren feldökologische Erforschung im östlichen Deutschland. - In: STUBBE, M., STUBBE, A. & HEIDECHE, D. (Hrsg.): Methoden feldökologischer Säugetierforschung. - Wiss. Beitr. Univ. Halle: 407-454.
- STUBBE, M., SELUGA, K. & WEIDLING, A. (1997): Bestandssituation und Ökologie des Feldhamsters *Cricetus cricetus* (L., 1758). - Tiere im Konflikt **5**: 5-60.



- STUBBE, M., SELUGA, K. & WEIDLING, A. (1998): Bestandssituation und Ökologie des Feldhamsters *Cricetus cricetus* (L., 1758). - In: STUBBE, M. & STUBBE, A. (Hrsg.): Ökologie und Schutz des Feldhamsters. - Wiss. Beitr. Univ. Halle: 137-182.
- TAEGER, A. (1974): Zur Blattwespenfauna des Mittelbegebietes (Hymenoptera, Symphyta). 1. Beitrag. - Entomol. Ber. **1**: 107-109.
- TASCHENBERG, O. (1918): Faunistische Ergänzungen meiner Bearbeitung der Zoologie in Ules „Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mannsfelder Seekreises“. - Leopoldina **54**: 68-72.
- TÄUSCHER, H. & TÄUSCHER, L. (1993): Die Mikro- und Makrophytenbesiedlung des Kamernschen Sees (Elb-Havel-Winkel). Artenliste. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **2**: 14-23.
- TÄUSCHER, L. (1991): Mikroalgen im Kamernschen See. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **11**: 118-123.
- TÄUSCHER, L. (1992): Hydrosoziologische Untersuchungen an den Mikro- und Makrophyten des Kamernsche Sees im Elbe-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **1**: 7-10.
- TÄUSCHER, L. (1994): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels. I. Untertrübengraben und Rahnsee (Wulkauer See). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 4-13.
- TÄUSCHER, L. (1995a): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels. II. Garzer See und naturnahes Kleingewässer. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **4**: 3-11.
- TÄUSCHER, L. (1995b): Erfassungen der Mikro- und Makrophyten-Besiedlung und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des Elb-Havel-Winkels (Sachsen-Anhalt) als Beitrag zur regional-limnologischen Erforschung und zur Bioindikation. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1995, Berlin, 779-783.
- TÄUSCHER, L. (1996): Zum Vorkommen von „Urzeitkrebse“ in Gewässern des Elb-Havel-Winkels. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 70-71.
- TÄUSCHER, L. (1996a): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels. III. Entwässerungsgräben. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **5**: 31-37.
- TÄUSCHER, L. (1996b): Beitrag zur Gewässerökologie des Elbe-Havelwinkels (Sachsen-Anhalt). - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **33**, **2**: 40-51.
- TÄUSCHER, L. (1996c): Algen- und Makrophytengesellschaften als Indikatoren der Trophie und Saprobie in planktondominierten Fließgewässern Nordostdeutschlands. - Lauterbornia **26**: 77-83.
- TÄUSCHER, L. (1996d): Seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzen und -gesellschaften im Naturpark „Brandenburgische Elbtalau“. - Auenreport : Beitr. brandbg. NP Elbtalau **2**: 93-101.
- TÄUSCHER, L. (1996e): Entwässerungsgräben als Refugialbiotope für seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzen-Gesellschaften in den Niederungen der Mittleren Elbe und Unteren Havel. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1996, Schwedt/Oder: 487-491.
- TÄUSCHER, L. (1996f): Hydrobotanische Untersuchungen an und in Gewässern von Berlin und Brandenburg II. Seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Brandenburgischen Elbtalau. - Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **129**: 141-149.
- TÄUSCHER, L. (1997): Bemerkungen zum Vorkommen von Wassermollusken im Elb-Havel-Winkel. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 52-54.
- TÄUSCHER, L. (1997): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels. IV. Die planktische und benthische Algenbesiedlung der unteren Havel (incl. Gnevsdorfer Vorfluter). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 9-15.
- TÄUSCHER, L. (1998): Wassermollusken-Funde im brandenburgischen Naturpark Elbtalau. - Auenreport : Beitr. brandbg. NP Elbtalau **4**: 101-104.
- TÄUSCHER, L. (1998a): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels. V. Die Mikro- und Makrophytenbesiedlung von Teilbereichen der Oberen Mittelbe und ihrer Auengewässer (Elbe-km 395 bis 430). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 39-51.
- TÄUSCHER, L. (1998b): Veränderungen der Phytoplankton- Artstruktur und Wiederbesiedlung des Kamernschen Sees (Elb-Havel-Winkel) mit submersen Makrophyten als Zeichen einer Reoligotrophierung. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **8**: 35-38.
- TÄUSCHER, L. (1998c): Mikroalgenesellschaften der Gewässer Nordostdeutschlands und ihre Nutzung zur Bioindikation. - Feddes Repertorium **109**: 617-638.
- TÄUSCHER, L. (1999a): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flußlandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt). VI. Beitrag zur Mikroalgenbesiedlung des Königsfließes. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **9**: 31-35.
- TÄUSCHER, L. (1999b): Planktic and benthic diatom assemblages as indicators of water quality in the floodplains of the middle area of the River Elbe and lower area of the River Havel (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Germany). - Berichte des IGB (Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei) **7**, **SH II**: 82-85.
- TÄUSCHER, L. (1999c): Wasser- und Sumpfpflanzen-Funde im Elb-Havel-Winkel (Biosphärenreservat „Flußlandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal). - Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt **4**: 70-74.
- TÄUSCHER, L. (2000): Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt). VII. Die Wasser- und Sumpfpflanzen-Besiedlung von Kleingewässern. - Untere Havel : Naturkd. Ber. **10**: 36-39.
- TEICHMANN, D. (1988): Die Pilzflora des Kreises Roßlau. - Heimatkalender Kr. Roßlau **28**: 34.
- THALMANN, U. (1990): Untersuchungen zur Ameisenfauna des Naturschutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“. - Nat.schutzarb. Bez. Halle Magdebg. **27**: 33-41.
- THIEL, H. (1988): Pilze im Kreis Bernburg. - Bernburger Heimatbl. 1988: 42-58.
- THIEL, R. (1998): Ökologische Zusammenhänge zwischen Fischgemeinschafts- und Lebensraumstrukturen der Elbe. - In: GELLER, W. et al. (Hrsg.): 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe“: 245-246.
- THIENEMANN, G. (1905): Ornithologische Beobachtungen aus der Umgebung Magdeburgs. - Ornith. Monatschr. **30**: 533.
- THIENEMANN, A. (1936): Die Süßwasserfische Deutschlands. Eine tiergeographische Skizze. - In: Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band III A: 1-32.
- TISCHER, H. (1927): Ornithologisch Interessantes für Magdeburg und Umgebung aus den Jahren 1822-1850. - Mitt. Ornith. Ver. Magdeburg **1**: 49-59.
- TISCHER, H. (1928): Ornithologisch Interessantes für Magdeburg und Umgebung aus den Jahren 1822-1850 (Fortsetzung und Schluß). - Mitt. Ornith. Ver. Magdeburg **2**: 1-9.
- TITTIZER, T. & SCHLEUTER, A. (1986): Eine neue Technik zur Entnahme quantitativer Makrozoobenthos-Proben aus Sedimenten größerer Flüsse und Ströme. - Dt. gewässerkd. Mitt. **30**: 147-149.
- TITTIZER, T. et al. (1992): Aquatische Makrozoen der „Roten Liste“ in den Bundeswasserstraßen. - Lauterbornia **12**: 57-102.
- TODTE, I. (1987): Zum Vorkommen von Höcker- und Sing-

- schwan an der Mittelelbe im Raum Aken. - Apus 6, 5: 212-216.
- TRAUZETTEL, L. (1991): Wörlitz - Führer durch die Englischen Anlagen. - RV, Berlin.
- TROLL, W. (1940/44): Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands. - Floristische Notizen. - 1. Reihe. - Hercynia 3: 338-339.
- TROLL, W. (1940/44): Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands. - Floristische Notizen. - 2. Reihe. - Hercynia 3: 677-680.
- TROST, M. & SCHNITTER, P. (1997): Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkdl. Ber. 6/7: 105-110.
- TUCHSCHERER, K. (1966): Roffußfalke am Schönitzer See. - Apus 1, 2: 1-93.
- TUCHSCHERER, K. (1966): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung vorn Gohrau/Wörlitzer Winkel 1966. - Apus 1, 2: 74-80.
- TUCHSCHERER, K. (1968): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels (II). - Apus 1, 5: 243-245.
- TUCHSCHERER, K. (1970): Beiträge zur Vogelwelt des östlichen Teils des Wörlitzer Winkels (III). - Apus 2, 1: 38-40.
- TUCHSCHERER, K. (1971): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels (IV). - Apus 2, 4: 186-189.
- ULBRICH, E. (1925): Über die Vegetationsverhältnisse der Umgebung von Tangermünde. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 67: 114-137.
- ULBRICH, E. (1935): Frühjahrsausflug des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 16. und 17. Juni 1934 in die Havel- und Elbe-Auen bei Havelberg. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 75: 311-320.
- ULRICH, A. (1971): Eine Übersicht über das Vorkommen des Wachtelkönigs- *Crex crex* (L.) - im Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises Mittelelbe-Börde. - Apus 2, 4: 165-171.
- ULRICH, A. (1983): Die Entwicklung des Weißstorchbestandes im Kreis Wolmirstedt. - Jahresh. Mus. Wolmirstedt 7: 3-14.
- ULRICH, A. & ZÖRNER, G. (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil 1. - Wolmirstedter Beitr. 11: 3-64.
- ULRICH, A. & ZÖRNER, G. (1988): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil 2. - Wolmirstedter Beitr. 13: 3-75.
- ULRICH, A. & ZÖRNER, G. (1989): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil 3. - Wolmirstedter Beitr. 14: 3-68.
- URBAN, C. (1915): Verzeichnis der in der Umgebung von Magdeburg aufgefundenen Staphyliniden. - Mitt. Entomol. Ges. Halle 8/9: 12-39.
- VENT, W. & BENKERT, D. (1984): Verbreitungskarten brandenburgischer Pflanzenarten. 2. Reihe: Stromtalpflanzen (1). - Gleditschia 2: 213-238.
- VILCINSKAS, A. & WOLTER, Ch. (1993): Fischfauna der Bundeswasserstraßen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. - Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz/Berlin.
- VOERKEL, S. H. (1926): Beitrag zur Avifauna des Torgau-Annaburg-Jessener Gebietes. - Ornith. Monatsschr. 11: 3-40.
- VOIGT, O. (1963): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). - 2. Zur Flora des Mittelbegebietes. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. 12: 710.
- VOIGT, O. (1965): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (IX). - 2. Zur Flora der Umgebung von Dessau. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. 14: 492-494.
- VOIGT, O. (1966): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). - 2. Zur Flora von Dessau (2.Beitrag). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. 15: 750-751.
- VOIGT, O. (1967): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). - 2. Zur Flora von Dessau (3.Beitrag). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. 16: 862-864.
- VOIGT, O. (1972): Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). - 16. Zur Flora der Umgebung von Dessau (4.Beitrag). - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. 21: 66-71.
- VOIGT, O. (1977): Zur Flora der Umgebung von Dessau. 5. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle 3: 37-41.
- VOIGT, O. (1978): Zur Flora des Naturschutzgebietes „Saalberghau“ bei Dessau. - Nat.schutz naturkdl. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. 15: 28-36.
- VOIGT, O. (1978): Zur früheren und heutigen Verbreitung heimischer Orchideen im Dessauer Florenggebiet. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 1: 63-82.
- VOIGT, O. (1979): Fremdpflanzenfunde, zusammengestellt nach Belegen im Herbar A. Zobel im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. - Mitt. flor. Kart. Halle 5: 20-28.
- VOIGT, O. (1980): Flora von Dessau und Umgebung. - 1. Teil. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau SH: 1-95.
- VOIGT, O. (1982): Flora von Dessau und Umgebung. - 2. Teil. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau SH: 98-181.
- VOIGT, O. (1984): Zweiter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitt. flor. Kart. Halle 10: 64-72.
- VOIGT, O. (1985): Dritter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitt. flor. Kart. Halle 11: 71-76.
- VOIGT, O. (1986): Veränderungen in der Pflanzenwelt des Dessauer Florenggebietes während der letzten Jahrzehnte. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 47-65.
- VOIGT, O. (1987): Beitrag zur „Flora von Dessau und Umgebung“. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 4: 53-56.
- VOIGT, O. (1987): Bemerkenswerte Bäume und Sträucher in den Straßen und Parkanlagen, auf den Plätzen und Friedhöfen des Stadtkreises Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 4: 3-20.
- VOIGT, O. (1987): Vierter Nachtrag zur Flora von Dessau und Umgebung. - Mitt. flor. Kart. Halle 13: 27-32.
- VOIGT, O. (1992): Zur Kurzfühlerschreckenfauna (Saltatoria: Caelifera) des Dessau-Wittenberger Raumes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 7: 91-103.
- VOIGT, O. (1993): Ein bemerkenswerter Fund in Dessau. - Mitt. flor. Kart. Halle 18: 46-47.
- VOIGT, O. (1993): Flora von Dessau und Umgebung. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau SH: 1-161.
- WADEWITZ, M. (1999): Die Brutvogelkartierung Sachsen-Anhalt Nord. - Apus 10, 3/4: 219.
- WAHN, R. (1930): Brutvorkommen der Wacholderdrossel 1930 auch bei Lödderitz. - Beitr. Avifauna Anhalts 1: 15.
- WAHN, R. (1937): *Arenaria interpres* und *Calidris canutus* in Anhalt. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands 1: 50-51.
- WAHNSCHAFFE, M. (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Allervereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer. - Druck und Verlag C. A. Eyraud, Neuhaldensleben.
- WALLASCHEK, M. (1992): Zur Kurzfühlerschreckenfauna (Saltatoria: Caelifera) des Dessau-Wittenberger Raumes. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 7: 91-103.
- WALLASCHEK, M. (1996a): Kenntnisstand zur Roten Liste der Heuschrecken des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) 21: 73-81.
- WALLASCHEK, M. (1997a): Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkdl. Ber. 6/7: 87-94.
- WALLASCHEK, M. (1998): Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. II. - Entomol. Nachr. Ber. 42: 211-219.
- WALLASCHEK, M. (1998b): Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. II. - Entomol. Nachr. Ber. 42: 211-219.

- mol. Nachr. Ber. **42**: 211-219.
- WALTER, S. & BÖHNERT, W. (1993): Erstnachweis der Gestreiften Zartschrecke (*Leptophyes albovittata* (KOLL.)) im Regierungsbezirk Magdeburg. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **30**, **2**: 51-52.
- WARNSTEDT, H.-J. (1964): *Mycenastrum corium* (GUERS.) DESV. auch bei Havelberg. - Mykol. Mitt. **8**: 92-93.
- WARNSTEDT, H.-J. (1967a): Drei neue Fundstellen von *Mycenastrum corium* bei Havelberg. - Mykol. Mitt. **11**: 60-61.
- WARNSTEDT, H.-J. (1967b): Massenaufreten von *Xerocomus parasiticus* in den Birken-Erlenbrüchen östlich Havelbergs. - Mykol. Mitt. **11**: 64.
- WARNSTEDT, H.-J. (1981): Seltene Pilze aus der Umgebung Havelbergs. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **1**: 87-91.
- WARTHEMANN, G. & KRUMMHAAR, B. (1997): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen im NSG „Untere Schwarze Elster“. Teil 1: Vegetation. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **1**: 3-14.
- WARTHEMANN, G. & WÖLFEL, U. (1997): Muldeae in Sachsen-Anhalt. Flora und Vegetation der Muldeae. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **5H**: 12-16.
- WEBER, B. (1978): Vom Fischotter im Bezirk Magdeburg. 2. Mitteilung. - Jahresschr. Mus. Haldensleben **19**: 80-86.
- WEBER, B. (1981): Vom Fischotter im Bezirk Magdeburg. 3. Mitteilung. - Jahresschr. Mus. Haldensleben **22**: 84-86.
- WEBER, B. (1983): Zur nördlichen Verbreitungsgrenze der Feldspitzmaus (*Crocidura leucodon*) auf dem Gebiet der DDR. - Säugetierkd. Info. **2**: 69-73.
- WEBER, B. (1985): Vom Fischotter im Bezirk Magdeburg. 4. Mitteilung. - Jahresschr. Mus. Haldensleben **26**: 65-68.
- WEICHELT, O. (1937): Bergenten, *Nyroca marila* (L.), bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 12.
- WEICHELT, O. (1937): Kolbenente, *Netta rufina* (PALL.), bei Klieken/Anhalt. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 15-16.
- WEICHELT, O. (1937): Polartaucher, *Colymbus articus articus* L., auf der Mittelelbe. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 15.
- WEICHELT, O. (1937): Purpurreiher, *Ardea p. purpurea* L., bei Klieken (Anhalt). - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 16.
- WEICHELT, O. (1937): Trauerente in Anhalt: 2. Trauerente bei Roßlau und bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **1**: 11.
- WEICHELT, O. (1939): Ueber die Anzahl überwinternder Seeadler bei Dessau in den Jahren 1930 - 1939. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **3**: 29-31.
- WEICHELT, O. (1940): Bläßgänse bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 41.
- WEICHELT, O. (1940): Der Höckerschwan *Cygnus olor* (GM.) wieder Brutvogel in Mitteldeutschland. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 29-32.
- WEICHELT, O. (1940): Die Vogelwelt im Kliekener Gebiet. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 21-29.
- WEICHELT, O. (1940): Seltene Wintergäste bei Dessau - Bergenten, Mittelsäger, Sturm- und Silbermöwe. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **4**: 41-42.
- WEICHELT, O. (1941): Singschwäne (*Cygnus c. cygnus* L.) auf der Alten Elbe bei Klieken. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **5**: 8.
- WEICHELT, O. (1941): Verschiedenes aus dem Kliekener Beobachtungsgebiet. - Beitr. Avifauna Mitteldeutschlands **5**: 5-6.
- WEIDLICH, M. (1987): Lepidopterologische und coleopterologische Beobachtungen aus den mittleren und nördlichen Teilen des Bezirkes Halle unter besonderer Berücksichtigung von Gefährdungsursachen. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Dresden **9**: 131-160.
- WEIDNER, H. (1938): Die Geradflügler (Orthopteroidea und Blattoidea) Mitteldeutschlands. - Z. Naturwiss. Halle **92**: 123-181.
- WEIDNER, H. (1994): Belästigungen von Menschen und Tieren durch die Raupen des Eichenprozessionsspinners *Thaumetopoea processionea* LINNAEUS 1758 (Lep., Thaumetopoeidae). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **3**: 34-42.
- WEINERT, E. (1983): Die pflanzengeographische Gliederung des südlichen Teiles der DDR und der angrenzenden Gebiete. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **32**: 31-36.
- WEINERT, E. (1988): Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigung im herzynischen Florengbiet. - Mitt. flor. Kart. Halle **14**: 30-33.
- WEINITSCHKE, H. (1957): Die Waldschutzgebiete der Bezirke Magdeburg und Halle. - Mitteldeutsches Land **4**: 209-215.
- WEINITSCHKE, H. (1962): Das Verbreitungsgefälle charakteristischer Florelemente in Mitteldeutschland. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. R. **11**: 251-280.
- WESTERMANN, F. (1997): Bemerkenswerte Funde potamobionter Elmidae und Ephemeroptera in Rheinland-Pfalz. - Lauterbornia **31**: 67-72.
- WESTHUS, W. (1986): Flora des Kreises Wolmirstedt - Vorkommen und Verbreitung der wildwachsenden Pflanzenarten des Kreises Wolmirstedt (Teil I.) - Wolmirstedter Beitr. **10**: 3-48.
- WESTHUS, W. (1987): Flora des Kreises Wolmirstedt - Vorkommen und Verbreitung der wildwachsenden Pflanzenarten des Kreises Wolmirstedt (Teil II.) - Wolmirstedter Beitr. **12**: 3-60.
- WESTHUS, W. (1993): Nachträge zur Flora des Kreises Wolmirstedt. - Mitt. flor. Kart. Halle **18**: 42-44.
- WESTHUS, W. & WESTHUS, W. (1998): Neue Binnensalzstellen im Umfeld der Rückstandshalden des Kaliwerkes Zielitz. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **3**: 123-125.
- WESTPHAL, D., STEINKE, G. & LIPPERT, W. (1975): Erstnachweis der Zwerggralle (*Porzana pusilla*) für das NSG „Schelldorfer See“ südlich Tangermünde/Elbe. - Beitr. Vogelkd. **21**: 369-370.
- WEYHE, E. (1907): Landeskunde des Herzogtums Anhalt. Band 1. - Verlag Dünnhaupt, Dessau.
- WICKE, G. & HÜPPE, J. (1992): Vergleichende Untersuchungen zur Ackerunkrautvegetation des Weser- und Elbetales in Nordwestdeutschland. - Ber. Naturhist. Ges. Hannover **134**: 135-159.
- WIEHLE, H. (1931): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). 27. Familie: Araneidae. - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 23. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 1-136.
- WIEHLE, H. (1937): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 33. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 119-222.
- WIEHLE, H. (1953): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). IX: Orthognatha - Cribellatae - Haplogynae - Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 42. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 1-150.
- WIEHLE, H. (1956): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). 28. Familie: Linyphiidae - Baldachinspinnen. - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 44. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 1-337.
- WIEHLE, H. (1960): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XI: Micryphantidae - Zwergspinnen. - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebens-



- weise. 47. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 1-620.
- WIEHLE, H. (1963): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XII: Tetragnathidae - Streckspinnen und Dickkiefer. - In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 49. Teil. - Gustav Fischer Verlag, Jena: 1-76.
- WIESEL, L. (1929/30): Ueber die Verbreitung des Bibers an der mittleren Elbe. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **2**: 58-60.
- WILKENS, H. (1999): Die Aland-Niederung (Sachsen-Anhalt): Planungen im alten Stil statt Hochwasserschutz im Gesamtkonzept. - Natur und Landschaft **74**: 52-57.
- WITSACK, W. (1997): Zur Zikadenfauna (Hemiptera, Auchenorrhyncha) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel : Naturkd. Ber. **6/7**: 95-101.
- WITSACK, W., KLAUSNITZER, B. & SCHNEIDER, K. (1995): Rote Liste der Marienkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Rote Listen Sachsen-Anhalt) **18**: 8-10.
- WOBICK, C. (1906): Molluskenfauna auf dem Domfelsen in der Stromelbe zu Magdeburg. - Abh. Ber. Natur- Heimatk. Magdeburg **1**: 185-187.
- WÖLFEL, U. (1981): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 2. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **7**: 111-114.
- WÖLFEL, U. (1988): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 3. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **14**: 23-25.
- WÖLFEL, U. (1990): Bemerkenswerte Pflanzenfunde 1989 im Raum Dessau-Bitterfeld. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **5**: 8.
- WÖLFEL, U. (1991): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 4. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **17**: 23-25.
- WÖLFEL, U. (1992): Aktuelle Flora des Landkreises Bitterfeld. - Landratsamt Bitterfeld, Amt für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.). - Wolfen, Bitterfeld.
- WÖLFEL, U. (1993): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 5. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Halle **18**: 44-46.
- WÖLFEL, U. (1997): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung. 6. Beitrag. - Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **2**: 63-68.
- WÖLK, P. (1996): Avifaunistische Untersuchungen im Bereich Alte Elbe-Treuel-Rogätzer Auwiesen. - Haldenslebener Vogelkd. Info. **14**: 47-60.
- WOLTERDORF, W. (1992): Die Wollhandkrabbenplage. - Zwischen Havel und Elbe : Heimath. Kr. Havelberg **12**: 51-52.
- WOLTERSTORFF, W. (1888): Vorläufiges Verzeichnis der Reptilien und Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete. - Z. Naturwiss. **61**: 1-38.
- WOLTERSTORFF, W. (1890): Verbreitung der Feuerkröte (*Bombinator igneus*). - Jahresber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg: 318-320.
- WOLTERSTORFF, W. (1893): Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. - Commissionsverlag Walter Niemann, Magdeburg.
- WOLTERSTORFF, W. (1913): Zur Verbreitung der Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis* L.). - Bl. Aquarien- u. Terrarienk. **XXIV**: 229.
- WOLTERSTORFF, W. (1925): Katalog der Amphibien-Sammlung im Museum für Natur- und Heimatkunde zu Magdeburg. Erster Teil: Apoda, Caudata. - Abh. Ber. Mus. Natur- Heimatk. Magdeburg **4**: 155-234.
- WOLTERSTORFF, W. (1928): Zur Amphibien- und Reptilienfauna der Altmark. - Montagsblatt : Wiss. Beilage Magdeburgische Zeitung **70**: 86-87.
- WÜSTEMANN, O. (1991): Erste Ergebnisse der Fischartenkartierung im Landkreis Havelberg, unter besonderer Berücksichtigung des FIB Untere Havel. - Bezirksregierung Magdeburg, Magdeburg.
- ZACHER, F. (1917): Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. - Gustav Fischer Verlag, Jena.
- ZAHN, S. (1994): Die Entwicklung der Makrozoobenthon-Besiedlung in der Mittel-elbe. - Dt. Ges. Limnologie, Poster, Erw. Zus. Jahrestagung 1994, Hamburg: 632-636.
- ZAHN, S. (1998): Übersicht über das vorgefundene Makrozoobenthon in der mittleren Stromelbe 1993/1994 und 1995/1996. - In: GELLER, W. et al. (Hrsg.): 8. Magdeburger Gewässerschutzseminar „Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe“, Poster: 213.
- ZAHN, S. & KNÖSCHE, R. (1996): Die Entwicklung der Makrozoobenthon-Besiedlung in der Mittel-elbe und ihre Beziehung zur fischereilichen Ertragsfähigkeit. - Dt. Ges. Limnologie, Tagungsber. Jahrestagung 1995, Berlin: 440-445.
- ZEIBLER, H. (1984): Mollusken im Biberschutzgebiet Steckby (Bezirk Magdeburg). - Malakol. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **10**: 19-28.
- ZENKER, E. (1991): Schwimmfarnbestand auf dem Altwasser am Kuper im Naturschutzgebiet „Untere Mulde“. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **6**: Zum Titelbild.
- ZENKER, E. & HÄNSCHKE, J. (1992): Sammlung des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte von Dessau. I. Botanische Sammlung, Herbarien. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **7**: 163-169.
- ZENKER, E. & HELD, K. (1994): Nachweis von *Lemna turionifera* LANDOLT 1975 (Arales, Lemnaceae) in Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **8**: 160.
- ZIEBARTH, R. (1967): Bruten der Spießente bei Wittenberg. - Apus **1**, **3**: 141-142.
- ZIEGLER, J. (1984): Raupenfliegen aus der Umgebung von Dessau (Dipt., Tachinidae). - Dt. Entomol. Z., N. F. **31**: 41-68.
- ZIEGLER, J. (1993): Raupenfliegen aus der Umgebung von Magdeburg (Diptera, Tachinidae). - Beitr. Entomol. **43**: 393-415.
- ZIEGLER, W. (1986): Die Schwimmkäfer (Hygrobiidae, Halipilidae, Dytiscidae und Gyrinidae) des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. - Verh. Ver. Naturwiss. Heimatforsch. Hamburg **39**: 99-109.
- ZILICH, A. (1962): 1. Ergänzungen und Berichtigungen zur Nomenklatur und Systematik in P. EHRMANN's Bearbeitung. - In: BROHMER, P., EHRMANN, P. & ULMER, G. (Hrsg.): Die Tierwelt Mitteleuropas II. - Leipzig.
- ZOBEL, A. (1905): Verzeichnis der im Herzogtume Anhalt und in dessen näherer Umgegend beobachteten Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Teil I. - Druck von H. S. Art'l, Dessau.
- ZOBEL, A. (1907): Verzeichnis der im Herzogtume Anhalt und in dessen näherer Umgegend beobachteten Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Teil II. - Druck von H. S. Art'l, Dessau.
- ZOBEL, A. (1909): Verzeichnis der im Herzogtume Anhalt und in dessen näherer Umgegend beobachteten Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Teil III. - Druck von H. S. Art'l, Dessau.
- ZOBEL, A. (1920): Verzeichnis der im Herzogtume Anhalt und in dessen näherer Umgegend beobachteten Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Teil IV. - Druck G. Zichäü, Dessau.
- ZOBEL, A. (1929/30): Die Eichen und Ahorne in Anhalt und in dessen näherer Umgebung. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **2**: 16-28.
- ZOBEL, A. (1929/30): Zur Flora des mittleren Elbtals. - Ber. Naturwiss. Ver. Dessau **2**: 30-39.
- ZOBEL, A. (1975): Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt. Teil 5. - Hercynia, N. F. **12**: 432-476.
- ZOBEL, A. (1976): Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt. Teil 6. - Hercynia, N. F. **13**: 93-132.
- ZOBEL, A. (1977): Nachtrag zu Zobel's „Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt“ (Teil I-III, 1905-1909). - Mitt. Flor. Kart. Halle **3**: 27-49.
- ZOERNER, G. (1968): Bemerkenswerte Libellenfunde im Mittelbegebiet. - Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden **2**: 121-124.

- ZOERNER, H. (1969): Zur Kenntnis der Blattminen der Naturschutzgebiete des Mittelbegebietes (Blattminenfunde im Mittelbegebiet, 1. Beitrag). - Entomol. Ber. **1**: 17-24.
- ZOERNER, H. (1981): Die Käferfauna von Dessau und Umgebung : 1. Allgemeiner Teil. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **2**: 21-34.
- ZÖRNER, G. (1977): Zur Verhaltensweise eines junggeführten Brandganspaares in der Elbtalniederung. - Apus **4**, **1**: 4-5.
- ZÖRNER, G. J. (1987): Zum Kranichdurchzug über der Ohre-Elbe-Aue und der Magdeburger Börde. - Apus **6**, **6**: 283.
- ZSCHACKE, H. (1900): Beiträge zur Flora Anhaltina. VII. 1.-3. Stück. - Dt. Bot. Monatsschr. **18**: 20-22, 80-83, 107-109.
- ZSCHACKE, H. (1901): Beiträge zur Flora Anhaltina. VIII. 1.-4. Stück. - Dt. Bot. Monatsschr. **19**: 23-25, 72-74, 108-109, 131-133.
- ZSCHACKE, H. (1901): Beiträge zur Moosflora Anhalts. I. - Dt. Bot. Monatsschr. **19**: 29-30, 58-60.
- ZSCHACKE, H. (1902a): Neue Moosfunde aus Anhalt. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **42**: 112-118.
- ZSCHACKE, H. (1902b): Beiträge zur Moosflora Anhalts. 2. Stück. - Dt. Bot. Monatsschr. **20**: 9-13.
- ZSCHACKE, H. (1904): Weitere Moosfunde aus Anhalt. - Dt. Bot. Monatsschr. **22**: 3-6.
- ZSCHACKE, H. (1912): Vorarbeiten zu einer Moosflora des Herzogtums Anhalt. III. Die Moose des Tieflandes. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **53**: 280-308.
- ZUPPKE, H. (1993): Untersuchungen zum Vorkommen und zur Lebensweise des Großen Heldbockes (*Cerambyx cerdo* L.) in der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **30**, **2**: 31-36.
- ZUPPKE, U. (1968): Die Spießente (*Anas acuta*) als Brutvogel bei Wittenberg. - Beitr. Vogelkd. **14**: 86-89.
- ZUPPKE, U. (1971): Heringsmöwen an der Mittelbe. - Apus **2**, **4**: 195-196.
- ZUPPKE, U. (1972): Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg. - Der Falke **19**: 192-195.
- ZUPPKE, U. (1972): Überwinternde Greifvögel in der Elbaue bei Wittenberg (Schluß). - Der Falke **19**: 242-245.
- ZUPPKE, U. (1978): Fische im Kreis Wittenberg. - Schr.-R. Mus. Natur- Völkerkd. „Julius Riemer“ Wittenberg **2**.
- ZUPPKE, U. (1979): Die avifaunistische Bedeutung des Landschaftsschutzgebietes „Mittelbe“ im Kreis Wittenberg. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **16**: 41-53.
- ZUPPKE, U. (1979): Ein Silberreiher im Auengebiet der Mittelbe. - Apus **4**, **3**: 138-139.
- ZUPPKE, U. (1979): Zum Vorkommen des Kormorans an der Mittelbe bei Wittenberg. - Apus **4**, **3**: 135-137.
- ZUPPKE, U. (1982): Der Bestand des Weißstorches, *Ciconia ciconia*, im Kreis Wittenberg (Bezirk Halle) von 1976 bis 1980. - Beitr. Vogelkd. **28**: 175-187.
- ZUPPKE, U. (1983): Der Einfluß der Intensivierung der Produktionsmethoden in der Graslandwirtschaft auf die Avifauna des Landschaftsschutzgebietes „Mittelbe“ im Kreis Wittenberg/Bezirk Halle. - Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle.
- ZUPPKE, U. (1984): Der Einfluß der Intensivierung der Graslandwirtschaft auf die wiesenbewohnenden Vogelarten des Landschaftsschutzgebietes „Mittelbe“. - Hercynia, N. F. **21**: 354-387.
- ZUPPKE, U. (1985): Ansiedlungsversuch des Seeadlers im Mittelbegebiet. - Apus **6**, **2**: 93-95.
- ZUPPKE, U. (1985): Das Mittelbegebiet als Rastgebiet für durchziehende Gastvögel. - Hercynia, N. F. **22**: 412-429.
- ZUPPKE, U. (1986): Die faunistische Bedeutung des Landschaftsschutzgebietes „Mittlere Elbe“. - Arch. Nat.schutz Landsch.forsch. **26**: 253-265.
- ZUPPKE, U. (1988): Zum Durchzug des Schwarzstorchs im Mittelbegebiet des Kreises Wittenberg. - Apus **7**, **1**: 3-8.
- ZUPPKE, U. (1989): Besiedlungstendenzen des Elbebibers, *Castor fiber albus* MATSCHIE, 1907, im Kreis Wittenberg (Bez. Halle). - Hercynia, N. F. **26**: 351-361.
- ZUPPKE, U. (1992): Die Fischfauna der Mittleren Elbe. - Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Naturschutz im Elbegebiet) **5**: 54-56.
- ZUPPKE, U. (1992): Die mittlere Elbe als Fischgewässer. - Welche Folgen zieht ein möglicher Staustufenbau nach sich? - wwt Wasserwirtschaft - Wassertechnik **42**: 86-87.
- ZUPPKE, U. (1993): Der Bestand des Weißstorchs *Ciconia ciconia* (L., 1758) im ehemaligen Bezirk Halle und notwendige Schutzmaßnahmen. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **30**, **1**: 3-7.
- ZUPPKE, U. (1993): Vorkommen und Verbreitung der Fischarten im südlichen Sachsen-Anhalt und ihre Schutzsituation. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **30**, **2**: 3-22.
- ZUPPKE, U. (1994a): Die aktuelle Situation der Fischfauna der Stadt Dessau. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **8**: 23-78.
- ZUPPKE, U. (1994b): Zum Vorkommen des Steinbeißers (*Cobitis taenia* L.) im Mittelbegebiet. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **31**, **2**: 54-56.
- ZUPPKE, U. (1997): Die Kriechtiere, Lurche und Fische des Kühnauer Sees. - Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau **SH**: 72-77.
- ZUPPKE, U. (1998): Fund eines Lachsfisches an der Elbe. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **35**, **1**: 42-43.
- ZUPPKE, U. (2000): Neue Fischart für Sachsen-Anhalt. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **37**, **1**: 52-53.
- ZUPPKE, U. & HENNIG, R. (1993): Der Schuppenschwanz *Lepidurus apus* (L.) im Mittelbegebiet. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **30**, **2**: 48-49.
- ZUPPKE, U. & JURGEIT, F. (1997): Muldeae in Sachsen-Anhalt. Tierwelt der Muldeae. - Nat.schutz Land Sachsen-Anhalt **34**, **SH**: 17-24.
- ZUPPKE, U., GRAFF, H. & HIRSCHFELD, H. (1979): Der Bestand des Weißstorches im Bezirk Halle im Jahr 1977. - Nat.schutz naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdebg. **16**: 41-50.
- ZWFD (Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland)/ DDA (Dachverband Deutscher Avifaunisten) (Hrsg.) (1994): Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung (RAMSAR-Gebiet) „Niederung der Unteren Havel/Gölper See“. - Sep. Forsch.ber. Potsdam: 1-48.