


<b>Nr. des Indikators</b>	<b>C1</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bodentemperatur</b>
<b>Themenfeld</b>	<b>Boden</b>
Räumliche Gliederung	Magdeburg
Bearbeitungsstand	10.04.2026

Definition und Berechnungsvorschrift	<p>Für eine Bodentiefe von 10 cm wird bestimmt, an welchem Tag des Jahres die Temperatur im Frühjahr die 5 °C-Marke manifest überschreitet und wann sie diese im Herbst unterschreitet. Dies geschieht einerseits als Referenz gemittelt für die Zeiträume 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 andererseits gemittelt für den Zeitraum 2001 bis zum aktuellen Jahr bis der nächste 30-jährige Zeitraum 2030 abgeschlossen ist. Danach setzt die Berechnung neu an mit dem Jahr 2011, um den dann folgenden 30-Jahres-Zeitraum (2011 bis 2040) zu bearbeiten.</p> <p>Grundlage sind die Tagesmittelwerte der Temperatur in unbewachsenem Boden in einer Bodentiefe von 10 cm.</p>
Datenquelle, Aufbereitung	DWD
Bedeutung	<p>Für den Beginn, die Dauer und das Ende von Wachstumsprozessen landwirtschaftlicher Kulturpflanzenarten und die Mobilisierung von Nährstoffen im Boden muss die Temperatur im Erdboden über 5 °C liegen. Mit Hilfe der zeitlichen Entwicklung des Indikators kann abgeschätzt werden, ob die Wachstumsprozesse und die Nährstoffmobilisierungsprozesse im Boden zeitlichen Veränderungen unterliegen, die Auswirkungen auf die Durchführung landwirtschaftlicher Tätigkeiten haben.</p>
Intervall der Zeitreihe	01.01.1961 bis 31.12.2025
Aktualisierung	jährlich, jeweils zum Ende des ersten Quartals
Kommentierung des Indikatorverlaufs	<p>Die Bodentemperatur folgt aufgrund der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität von Luft und Boden mit einem geringen Zeitversatz der Lufttemperatur. So können die oberen Bodenschichten eine größere Schwankungsbreite als die Lufttemperatur aufweisen. Im Vergleich der Perioden 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 überschreitet die Bodentemperatur die Marke von 5 °C in 10 cm Tiefe im Frühjahr um 8 Tage früher und liegt dann im Mittel schon vor Mitte März, während die gebremste herbstliche Abkühlung ein späteres Unterschreiten der 5 °C-Marke um 7 Tage im Vergleich der beiden Perioden auslöst. Damit stehen im Durchschnitt 15 Tage im Jahr mehr für Wachstums- und Nährstoffmobilisierungsprozesse zur Verfügung. Vergleicht man den Zeitraum 1961 bis 1990 mit der aktuellsten Periode von 2001 bis 2025 dann überschreitet im Frühjahr die Bodentemperatur die 5 °C in 10 cm Tiefe bereits um 11 Tage früher und bleibt im Herbst 10 Tage länger über diesem Wert. Somit stehen im Durchschnitt sogar 21 Tage im Jahr zusätzlich für Vegetationsprozesse zur Verfügung.</p>
Maßeinheit	<b>Tag seit Beginn des Jahres</b>



**Datentabelle Tag seit Jahresbeginn der Über- bzw. Unterschreitung einer Bodentemperatur von 5 °C in 10 cm Bodentiefe**

	1961 bis 1990	1991 bis 2020	2001 bis aktuell
<b>Überschreitung 5 °C</b>	79	71	68
<b>Unterschreitung 5 °C</b>	319	326	329
<b>Dauer</b>	240 Tage	255 Tage	261 Tage